




11. HOLLAND  
11. BERGOMINI  
11. L. V.




BOSTON MEDICAL LIBRARY  
in the Francis A. Countway  
Library of Medicine ~ Boston





Longacre




IN HOC VOLV MINE HAEC  
CONTINENTVR.

AVRELII CORNELII CELSI MEDICINAE  
LIBRI. VIII. QVAM EMENDATISSIMI,  
GRAECIS ETIAM OMNIBVS  
DICTIONIBVS RESTI-  
TVTIS.

QVINTI SERENI LIBER DE MEDICINA  
ET IPSE CASTIGATISS.

ACCEDIT INDEX IN CELSV M, ET SERE-  
NV M SANE QVAM COPIOSVS.



¶ Venetorum decreto, ne quis aliquo in loco venetæ ditionis  
hos libros imprimat, impressos ne alibi  
vendat, cautum est.

~~Handwritten signature~~  
Nunc. Jo. Fr. Guiderius, 1655 -  
D. C. Verfari

AMPLISSIMO, ET MERITISSIMO HERCV-  
LI GONZAGAE .SS. ROMANAE SEDIS  
CARDINALI IOANNES BAPTI-  
STA EGNATIVS VENETVS.

c Vm multa, & ampla sunt ea, quæ Principes viros, tuîq;  
 similes illustrare maxime solent: tum nihil maius aut  
 honestius, quàm cum bonarum artium studiosos homines  
 exornant: & bonas literas omni studio, atq; opera in lu-  
 cem prodire contendunt siue q is semper literarum Genius fuit, ut  
 augustissimus merito iudicetur: siue q si doctorum hominum discipuli=  
 nam negligas: ueluti solem de cælo sustuleris, omnis hominum uita  
 in tenebris sit futura. Fecit hoc ipsum patrum nostrorum memoria  
 summa sua cum laude senior Alphonsus, qui cum propria uirtute re=  
 gnum Neapolitanum armis sibi quæisset, ad pacis studia conuersus,  
 omnes eius ætatis uiros, qui doctrinæ aliquod specimen præferret,  
 mirû in modum est complexus. Eandem propensionem literas fouen-  
 di secutus nõ multo post Nicolaus Quintus Pont. Max. est. ut incredi-  
 bile dictu sit quatum breui licet eius Põtificatu profecerint bonæ lite-  
 ræ: ut si uerû fateri uelis, huic uni plus debeamus Põtifici, q̃ omnibus  
 alijs, qui aut multis ante illû floruerint annis: aut qui ad huc diẽ uixe-  
 re in Barionæ sede Pontificibus. Cæterum obscurauit penè hanc cla-  
 rissimorum Principum beneficentiam Laurentius Medices perpetuus  
 Florentinæ Reip. dictator. qui uitam, paternamq; laudem emula-  
 tus prouehendi ueteres disciplinas, & artes, magno studio, & im-  
 pensa primû bibliothecam copiosissimam comparandam iussit: quã  
 do sine mutis hisce magistris, qd̃ aiût, aut parû, aut certe nihil profici-  
 mus: tum doctissimos uiros quotquot tera Italia id tẽpestatis alebat,  
 ad sese euocandos curauit. quos et præmijs longe maximis inuitaret:  
 & ad ocium hoc literarium ita inflammaret, ut nihil omnino his  
 deesse pateretur. Et quoniam Principum, ac Regum exempla pluri-  
 mum in utranq; partem ualent: non defuit eadem tempestate Prin-  
 ceps bellicæ gloria clarissimus Fridericus Vrbînâs, qui Laurêtij splẽ-  
 dore uicini, et amicissimî Princîpis cum exarsisset: eandem emulatus  
 laudem, nõ parnam librorum copiam, & præcipue qui ad sacrã rẽ  
 spectant, comparauit: & à sole, puluereq; martio sepe in spacia, atq;  
 ambulacra philosophorum diuerterit. Vt quicquid illi à bellicis arti-  
 bus erat ocij, id totum familiaribus doctorum hominum sermonibus  
 libenter impederet. Sed enim nec Gonzagæ tui minus operæ semper  
 huic uni dedere rei, quàm bellicis rebus, quibus maxime florere. Nã



sub initia renaſcentium literarum, quæ ſexceſſimum iacuerant  
 annum in terra Italia, Victorinum Feltenſem ſibi adſciuerẽ. cuius  
 doctrinam regij aduſcentes ueſtri iam tum à primis annis imbibere-  
 rent. Tu uero ut uideo cum alijs artibus maiorum tuorum adæquas  
 laudem: tum hac una literarũ, & doctorũ hominum exornandi cura  
 ſuperare contendis. qui ſummo ſtudio iam ab annis adoleſcentiæ do-  
 tiſſimum quenq; in familiam adſciuiſti tuam: magniſq; ſemper  
 præmijs ornatiſti. Nam ut omittam Furnium merito abſ te ſemper ho-  
 neſtatum: Remulum certe ſic complexus ab initio es, ut non prius  
 deſiſteris, q̃ illum ſtudiorum tibi perpetuum aſciueris comitem. quæ  
 laus eò maior eſt, q̃ & temporum hæc iniquitas etiam oſioſiſſimos  
 homines ab literis auocat: & Remulus cum honeſtiſſime Bononiæ pro-  
 fiteretur, maluit tamen te ſequi: & tecum, ut cum optimo Principe,  
 conqueſcere. non dubitans quin ingraueſcens eius ætas ſub te Prin-  
 cipe uiro effloreſcere etiam poſſit. ſed quid ego dicam quanto ſtudio  
 Franciſcum Aſulanum tibi addictiſſimum feceris? qui hæreditariam  
 Aldi laudem ſecutus, nihil nõ egit ut bonæ literæ cum græcæ, tum la-  
 tine in dies maiorem recipiant cultum. Et ille quidem cum noctes  
 ac dies hanc curam animo coqueret: acceſſit mox authoritas, ampli-  
 tudoq; tua: quæ currentem, quod aiunt, equum fortius ad curſum ex-  
 citaret. Nam cum alia in tui unius gratiam ſuſcepit: tum Celfi Cor-  
 nelij de medicina libros longe utiliſſimos, & elegantiſſimos inuulgan-  
 dos recepit. quod eo libentius ſuſcepit, q̃ abſ te imprimis codicẽ ſane,  
 caſtigatũ ſtatim acceperit. id oneris ut ſcilicet Celfus q̃ emendatiſſimus  
 publicum acceperet: non quod ego unus omnium doctiſſimus, ſed q̃  
 Franciſco, & familiæ, & Aldi præſertim nomini maxime ſemper ſa-  
 ui: ſuſcepi non inuitus: idq; , uti ſpero, non atris auibus præſtiſſe me  
 confido: ut docti etiam homines libenter hoſce Celfi libros legant: in-  
 docti non aſpernentur. Quod opus tui unius auſpicij in lucem cum  
 prodeat, tuum patrociniũ merito expoſcit. huic addidimus. Q. Se-  
 reni poëma non inutile: in quo nates ille non infeliçiſſimus et morbos  
 aliquot, & morborum remedia complexus eſt. hoc ipſum cum lege-  
 uix poſſet, legent hodie ni fallor, docti hoies & perlibenter, & iucun-  
 de. Ego uero quicquid opellæ in Celſo emendando impendi, id ipſum  
 tibi nuncupo: qui uirtutis tuæ ampliſicator, oẽm meam induſtriã uni  
 tibi ppetuo antea dicarã. Teſtatũ tamẽ apud te relinquens, q̃ ſi plus  
 ocij datũ mihi eſſet, i magnis occupatiõibus proſitẽdi uerſanti, efficaſ-  
 ſem ut Cornelius nõ dicã nitidior, certe amabilior cibus prodiret. quã  
 do breues notulas uocabulorũ, ſenſuum etiam obſcuriorũ, græcarum  
 etiã dictionum interpretamẽta inſtituerã. Quin et ex Galeno, Hip-

pocrateq; multa adtexere decreuerat: ut nostrates medici cum Hippo-  
cratem intelligerent penè à Cornelio in linguam latinam uersum, li-  
bentius multo illum legerent. Cornelij Celsi Fabius, quod sciam, ex  
ueteribus tantum meminit, laudās hominis industriam, q̃ cum Lenato  
rhetorice multo q̃ ante illum alij accuratius explicauit. sed & idem  
sceptios imitatus, non parum multa summo cum nitore, & cultu scri-  
psit. artē quoq; militarē, & disciplinas ferè græcas omnes ample-  
xus, eas latine loqui docuit & ex his medicinam omnium nostratum  
princeps ita absoluit: ut æmulari potius multi, q̃ assequi parem laudē  
possint. Bene, ac feliciter vale.

QVAE TOTO OPERE CONTINENTVR.

Proœmium.	pagina.	I	De notis, quas aliquis in singu-	
Quemadmodũ sanos agere			lus morborum generibus ha-	
conueniat.		5	bere possit.	15
Quæ stomacho imbecilli ser-			Quæ notæ in quoq; morbi gene-	
uanda sint.		6	re, uel spem, uel pericula o-	
Observationes quædã prout res			stendant.	17
nouæ accidunt: Et prout corpo-			De morborum curationibus.	10
rum genera, Et sexus, Et æta-			De sanguinis detractiōe per	
tes, Et tempora anni sunt.		6	uenas.	10
De his, qui aliqua parte corporis			De sanguinis detractiōe per	
laborant: Et primum de his,			cucurbitulas.	11
quibus caput infirmum est.		9	De deiectione.	11
De his qui lippitudine, grauēdi-			De uomitu.	11
ne, destillatione, tonsillisq; la-			De frictiōe.	11
borant.		9	De gestatione.	13
Ad solutam aluum remedia.		9	De abstinentia.	14
Remedia ad colī dolorem.		9	De sudore.	14
Quæ agenda sint stomacho			Qui cibi, potiones uē, aut ualen-	
laborantibus.		10	tis, aut mediæ, aut imbecillæ	
Quid obseruandum sit dolore			materiæ sint.	15
neruorum laborantibus.		10	Quæ natura, ac proprietas cu-	
Observatio in pestilentia.		10	iusq; rei sit, qua uestimur.	16
			Quæ res boni succi sint.	16
			Quæ res mali succi sint.	16
			Quæ res lenes, quæ uē acres	
			sint.	16
			Quæ res crassiores, quæ uē te-	
			nuuiorem pituitam faciunt.	16
			Quæ res stomacho idoneæ	
			sunt.	16
			Quæ res alienæ stomacho	
			sunt.	17
			Quæ inflant, aut inflationem	
			leuant.	17
			Quæ res aut calefaciunt, aut	
			refrigerant.	17
			Quæ res intus facile uitiuntur,	
			uel minime corrumpuntur.	17



Quæ res aluum mouent.	27	Curatio tertianæ febris.	37
Quæ res aluum astringant.	27	Curatio quartanæ febris.	37
Quæ res urinam mouent.	28	Curatio duarū quartanarū.	37
Quæ res somnum mouet, aut sensus exaltant.	28	Curatio cotidianæ febris, quæ ex quartana facta sit.	38
Quæ res corpus aut erodāt, aut reprimant, aut refrigerent, aut calefaciant, aut durent, aut emolliant.	28	De tribus insanix generibus: et primo de eius curatione, quæ à græcis phrenitis dicitur.	38
		Cardiaci morbi curatio.	40
		De lethargo, et eius curatio=	

### LIBER TERTIVS.

De morborum generibus.	29	De aqua inter cutem, hoc est hydropico morbo.	41
Quomodo morbi cognoscantur: et an increſcant, an conſiſtant, an minuantur: et qua ratione ab initio qui languere incipit, curari debeat.	29	De tæbe, et eius speciebus, et curationibus.	42
De febrium generibus.	30	De comitialis morbi curationibus.	44
De curationum diuerſis generibus.	30	De regij morbi curatione.	44
De febrium speciebus, et ſingularum curationibus, et primo quando cibus febricitantibus dandus ſit.	32	De elephantix curatione.	45
		De attonitis, et eorum curatione.	45
		De reſolutione neruorum: quæ apopleſia, uel paralyſis dicitur.	45

### LIBER QVARTVS.

Quado potiones febricitantibus dari expediat.	33	De humani corporis interioribus ſedibus.	47
Quando peſtilentes febres curari debeant.	34	De curationibus morborū, qui naſcuntur à capite: et primo de eius dolore: deinde de morbo, qui circa faciē naſcitur: tum de lin=	
Curatio ſemitercianæ febris, quæ hemitritæos dicitur.	35	quæ reſolutio: poſtremo de deſtillatione, ac grauedine.	48
Curatio lentarum febrium.	35	De morbo, qui circa faciē naſcitur: quem græci cynicum ſpaſmum uocant.	48
Remedia in febribus ad capitis dolorē, et præcordiorum inflammationem, et ariditatem, et ſcabritiem lingue.	35	De reſolutione lingue.	49
Remedia contra frigus, quod febrem præcedit.	36	De deſtillatione, ac grauedine.	49
Curatio horroris in febribus.	36	De cernicis morbis, curationi=	
Curatio cotidianæ febris.	37		



busq;. 50  
 De faucium morbis, ac curationi-  
 bus, et primum de angina, de-  
 inde de difficultate spirandi,  
 ultimo de tussi. 50  
 De difficultate spirandi. 51  
 De tussi. 51  
 De stomachi morbis, & cura-  
 tionibus. 52  
 De laterum doloribus. 53  
 De viscerum morbis: et primo de  
 pulmone, deinde de iocinere, tum  
 de liene, postremo de renibus. 54  
 De iocineris morbo, & cura-  
 tione. 55  
 De lienis morbo, et curatione. 55  
 De renum morbis, et curatio-  
 nibus. 55  
 De intestinorum morbis, &  
 primo de cholera. 56  
 De cœliaco uentriculi morbo. 56  
 De tenuioris intestini morbo. 57  
 De morbo intestini plenioris. 57  
 De torminibus. i. dysenteria. 57  
 De leuitate intestinorum. 58  
 De lumbricis aluum occupan-  
 tibus. 58  
 De tœnaso intestinorū morbo. 58  
 De uentris fluxu, et curatione. 59  
 De uulue morbo, & curatio-  
 nibus. 59  
 De nimia profusione seminis  
 ex naturalibus. 60  
 De coxarum morbis, & cura-  
 tionibus. 60  
 De genuū doloribus, et cura. 60  
 De articulorum doloribus in  
 manibus, pedibusq;. 61

# LIBER QUINTVS.

De simplicibus facultatibus qua-  
 runq; rerum, ex quibus me-  
 dicamēta fiunt: et primo de his,  
 quæ sanguinē supprimunt. 62  
 Quæ uulnus glutinant. 62  
 Quæ cōcoquunt, et mouēt pus. 62  
 Quæ aperiunt uulnera. 62  
 Quæ purgant. 62  
 Quæ rodunt. 62  
 Quæ exedunt corpus. 63  
 Quæ adurunt. 63  
 Quæ crustas ulceribus inducūt.  
 Quæ crustas ulceribus resoluūt.  
 Quæ discutiant ea, quæ in ali-  
 qua parte corporis coierunt. 63  
 Quæ euocant, & educunt. 63  
 Quæ exasperata leniunt. 63  
 Quæ carnem nutriunt, &  
 ulcus implent. 63  
 Quæ molliunt. 63  
 Quæ autem purgant. 63  
 De mixturis simplicium rerum,  
 & de ratione ponderum, &  
 quid malagma, & emplastrū,  
 et pastillus inter se differāt. 63  
 De malagmatis. 64  
 Malagma ad materiam extra-  
 hendam. 64  
 Malagma ad iecur dolens. 64  
 Malagma ad lienem. 64  
 Malagma ad laterū dolores. 64  
 Malagmata ad resoluenda quæ  
 astricta sunt: et mollienda quæ  
 dura sunt: et digerenda quæ  
 coeunt. 65  
 Aliud malagma ad eadem. 65  
 Malagma moschi ad mollien-  
 dum. 65

Malagma medi ad digerenda quæ coeunt.	65	malagma, & strumam.	66
Malagma Panthemi ad eadem.	65	Malagma Aristonis aduersus podagras, et recentia phymata, & omnis dolores.	67
Malagma ad strumas.	65	Theoni malagma ad pedum dolores.	67
Aliud malagma ad id ualens.	65	Numenij malagma ad podagrâ cæter. s; articulos induratos.	67
Malagma ad strumam, & phymata.	65	Dexij malagma si quando callus in articulis increuit.	67
Malagma ad strumam, & tubera, & carcinodas.	65	De emplastris.	67
Malagma protarchi ad parotidas, & faum, & mala ulcera.	65	Barbarum emplastrum nigrum, quod cruentis protinus uulneribus iniicitur.	67
Malagma aduersus panum, & phymata.	65	Coacon emplastrum nigrum ad idem ualens.	67
Malagma aduersus phymata.	66	Basilicon emplastrum nigrum ad idem.	67
Malagma ad supprimendum omne quod abscedit.	66	Smaragdinum emplastrum ad idem.	67
Malagma ad sanguinem supprimendum, & phymata.	66	Emplastrum ruffum ad idem.	67
Malagma ad carcinodas, & phymata lenienda.	66	Paracollepticum emplastrum ad idem.	67
Malagma ad liuorem faciei contuse.	66	Cephalicum emplastrum Philotæ capiti conueniens.	68
Malagmata stomachica ad aperiendum.	66	Emplastrum uiride ad idem ualens.	68
Niconis malagma ad resoluendum, aperiendumq; ac purgandum.	66	τρίσπολον uanor emplastrum ad pus mouendum.	68
Malagma ad ossa, & neruos.	66	Enneapharmacum emplastrum ad pus mouendum, & ad purgandum ualens.	68
Malagma Euthylei ad articulos, & ad omnem dolorem.	66	Attalum emplastrum ad uulnera.	68
Malagma Sagogoræ ad dolores articulorum.	66	Iudæi emplastrum fracto capiti acomodatum.	68
Chrysippi malagma ad idem ualens.	66	Diadaphnidon emplastrum ad extrahendum.	68
Clesipontis malagma ad idem ualens, & ad parotidas, et phymata.			

Aliud

Aliud *διὰ δαφνιδίων* ad extrahendum, & pus mouendum. 68  
 Philocratis emplastrum ad extrahendum, & pus mouendum. 68  
*ἰπποκράτης* emplastrum ad extrahendum. 68  
 Emplastrum Hecatei ad extrahendum. 69  
 Alexandrinum emplastrum uiride ad extrahendum. 69  
 De emplastris exedentibus. 69  
 Emplastrum quod exest corpus, & ossa resoluit: & super crescentem carnem coerct. 69  
 Emplastrum aduersus morsus, & alia recentiora uulnera. 69  
*ἰμπίριον* emplastrum rubrum ad idem ualens. 69  
 Aliud emplastrum ad idem ualens. 69  
*λαυρά* emplastra non grauibz uulneribus accommodata, et maxime senilibz. 69  
 Elephantinum emplastrum. 69  
 Lenia emplastra. 69  
 Emplastrum lene. 69  
 Archagathi emplastrum lene. 69  
 Emplastra eiusdem generis ad leniendum apta. 70  
 De pastillis, & primo de his, qui ad recentia uulnera glutinanda, sanandaq; apti sunt. 70  
 Alius pastillus ad glutinanda uulnera. 70  
 De sphragide pastillo, quem Polybus conficit, ad glutinandum uulnus. 70  
 Pastillus ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, ob-

scenis partibus, inflammatio nesq; eorum. 70  
 Pastillus andronis ad unam inflammata, ad naturalia sordida etiā cancro laborantia. 70  
 Pastillus ad fissa ani, uel ora uenarum fundentia sanguinem, uel cancerum. 70  
 Pastillus ad expellendum calculum cum urina. 70  
 De pessis. 70  
 Ad sanguinem euocandum. 70  
 Ad uulnam molliendam. 70  
 Alia pessi compositio ad idem ualens. 71  
 Ad inflammationes uulue Numenij, Pessus. 71  
 Ad eiciendum ē uulua infan-tem mortuum. 71  
 Simulier uitio locorum conadit, qua curatione utendū sit. 71  
 De medicamentis quibus aridus utimur, ad carnem supercrescentem exedendam. 71  
 Ad putrē carnem continendam ne ultra serpat: eamq; leniter exedendam plures compositiones. 71  
 Hier e compositio. 71  
 Iudæi compositio. 71  
 Iolæ compositio. 71  
 Ad sanguinis profluvia, uel ex membrana cerebri, uel alijs locis & ad cancerum, & ad inducendam cicatricem, & ad coer- cendam carnem crescentem. 71  
 Timi compositio ad ignem facrum, uel cancerum. 72  
 Ad sternutamenta excitanda. 72  
 Gargariationes quibus fieri de-



beant.	71	quæ maxime per tela infe-	
De antidotis, & quibus malis		runtur.	74
opitulentur.	72	Quæ vulnera isanabilia sint.	74
Compositio antidoti.	72	Quæ vulnera difficilem cu-	
Aliud antidotum Ambrosia no-		rationem habeant.	75
minatum, quod Zopyrus Ito-		Quæ vulnera tutiorem cu-	
lemæo regi composuit.	72	rationem habeant.	75
Antidotum Mithridatis.	72	Observationes quædam & æta-	
De acopis.	72	tis, & corporis, & uitæ, &	
Acopum dñs dñs nervis utile.	72	temporis in vulneribus.	75
Ex Xerisæ ad ulcera purganda,		Signa percussæ cordis.	75
& implenda.	73	Signa pulmonis icti.	75
Ad sacrum ignem.	73	Signa iocineris vulnerati.	75
De catapotijs.	73	Signa percussorum renium.	75
Catapotiũ ualentis ad somnũ.	73	Signa vulnerati lienis.	75
Catapotium ad plurimos dolores		Signa percussæ uulnæ.	75
per somnum leniendos.	73	Signa percussæ cerebri, uel mem-	
Catapotium aliud ad multa		branæ eius.	76
uolens.	73	Signa percussæ stomachi.	76
Catapotiũ ad inducendũ somnũ:		Signa ieiunii intestini, & uentri-	
quod uulua dolens prohibuit.	73	culi vulnerati, & aliorum	
Ad iecur sanandum.	73	intestinarum.	76
Ad finiendos dolores lateris.	73	Signa percussæ medullæ, quæ	
Ad thoracis dolores finiendos.	73	in spina est.	76
Catapotium Athenicis ad		Signa septi transversi passæ.	76
tussim.	74	Signa uesicæ uulneratæ.	76
Catapotium Heraclidis tarenti-		De sanguine, & sanie, & pure, et	
ni ad tussim, & somnũ.	74	eorum speciebus quando ue me-	
Catapotium ad purganda ulcera		liora, deteriora uel sint.	76
in faucibus tussientibus.	74	Curatio aduersus profusionem	
Collice cassij medica.	74	sanguinis in uulneribus.	76
Ad infantem mortuum, aut se-		Curationes aduersus uulnerum	
cundas expellendas.	74	inflammationem.	77
Laborantibus ex partu quid		De glutinatione uulnerum.	77
dari debeat.	74	Quomodo uulnus ligari con-	
Ad adiuvandam uocem.	74	ueniat.	78
Aduersus difficultatẽ urinae.	74	De ratione uictus, & notis uul-	
Arteriaces cõpositio quò fiat.	74	nerũ, curationibusq; eorũ.	78
De quinq; generibus noxarũ cor-		Curatiões propriæ articularũ.	78
poris, & primo de uulneribus,		Vulnus quomodo purgandũ est.	79



Quo vulnus implendū est. 79  
 De vulneribus, curationibusq;  
 eorum. 79  
 Curatio ulceris. 79  
 Curatio erysipelarum. 80  
 Curatio Gangrenæ. 80  
 Quomodo catarrix vulnere indu-  
 cenda, purgandāq; sit. 81  
 De vulneribus, quæ p morsus in-  
 feruntur, eorūq; curationibus. 81  
 Curatio aduersus rabiosi canis  
 morsum. 81  
 Curationes communes aduersus  
 omnes morsus serpentium. 81  
 Speciales curationes aduersus  
 ictus serpentium, et primo aduer-  
 sus ictum Aspidis. 82  
 Aduersus ictum scorpionis. 82  
 Aduersus aranei, & scorio-  
 nis ictum. 82  
 Aduersus Cerastris, & Dipsæ, &  
 Hemorrhoidis ictum. 82  
 Aduersus Chersydri ictum, &  
 cerastris. 82  
 Aduersus Phalangii ictum. 82  
 Aduersus ictus italorum anguū, q  
 minus terribiles pegris sunt. 82  
 Remedium generale aduersus  
 omnia uenena. 83  
 Specialia remedia aduersus quæ-  
 dam uenena, & primo ad-  
 uersus cantharidas. 83  
 Aduersus cicutam. 83  
 Aduersus hyoscyamum. 83  
 Aduersus cerussam. 83  
 Aduersus sanguisugam si epota  
 est, & lac quod intus coijt. 83  
 Aduersus fungos inutiles. 83  
 De adustis corporis locis, & quo-  
 modo curari debeant. 83

De carbunculo, et eius curatione. 83  
 De carcinomate, et eius cura. 84  
 De Theriomate, et eius cura. 84  
 De sacro igne, & eius cura. 85  
 De Chironeo ulcere, et eius cu- 85  
 De ulceribus, quæ ex frigore in  
 pedibus, & manibus oriuntur,  
 & eorum curationibus. 85  
 De struma, & eius curatione. 86  
 De furunculo, et eius curatione. 86  
 De phymate, & eius cura. 86  
 De phygitilo, & eius curatione. 86  
 De fistulis, & earum generibus,  
 & curationibus. 87  
 De melicera. 88  
 De Acrochordone, et Thymio, et  
 Myrmecio, & Clauo, curationi-  
 busq; eorum. 88  
 De pustularum generibus, &  
 earum curationibus. 89  
 De scabie, & eius curatione. 89  
 De impetignis speciebus, &  
 curationibus. 90  
 De papulis, et earū curatione. 90  
 De vitiliginis speciebus, idest de  
 Alphi, & Mela, et leuce, &  
 earum curatione. 90

# LIBER SEXTVS.

De capillis fluentibus. 91  
 De porrigine, et eius curatione. 91  
 De syphi, & eius curatione. 91  
 De Areis, et earū curationibus. 91  
 De Varis, & Lenticulis, et Ephe-  
 lide, & eorū curationibus. 91  
 De oculorum morbis, curationi-  
 busq; eorum: & primo de his  
 morbis, qui lenibus medicamen-  
 tis curantur. 92

catarrhon

morbis

De diuersis oculorū collirijs.	93	curationibus.	96
Philonis collirium.	93	Hermonis collirium.	96
Dionysij collirium.	93	De catriabus oculorum, quæ ex	
Cleonis collirium.	93	ulceribus factæ sunt: & quomo	
Theodoti collirium, Archari-		do curari debeant: & de Aſcle	
ſtum apellatum.	93	pia, & Canopie, & Pyxino	
Cythion, uel tephriion colliriū.	93	collirijs.	96
Euelpidis collirium, trygodes		De alio genere inflammatio-	
nominatum.	93	nis oculorum,	96
Nilei collirium omnium opti-		Cæſarianum collirium.	97
mum.	94	Hieracis collirium.	97
De carbunculis oculorum, &		De Xerophthalmia.	97
eorum curatione.	94	Rhinion collirium.	97
De puſtulis oculorum, & cu-		Ad oculos ſcabros colliria.	97
ratione earum.	94	Ad caligationem oculorum, quæ	
παλαλβους collirium ad pu-		propter lippitudinem oritur	
ſtulas oculorum.	95	remedia, & colliria.	97
De ulceribus oculorum, & eorū		Δια κρόκου collirium.	97
curatione, & de δια βαλάνου		Ad caligationem oculorum, quæ	
collirio.	95	propter ſenectutem, aut alia	
Curatio oculorum aliquo ca-		imbecillitatem fit.	98
ſu imminutorum.	95	De ſuſſuſione oculorum.	98
De pediculis palpebrarū.	95	De reſolutione oculorum, quæ	
De oculorum grauioribus mor-		paralyſis dicitur.	98
bis, qui ex inflammationibus oriū		De mydriaſi oculorum.	98
tur: & uel dioribus medicamen-		De imbecillitate oculorum.	98
tis curantur, & de Andreae col-		Ad oculos qui extrinſecus offen-	
lirio, & de δια νέματος.	95	duntur: cum ſanguine ſuſſu-	
Memigmenon Euelpidis colli-		ſi ſunt.	98
rium.	95	De aurium morbis, & cura-	
De oculorum ulceribus ſupercre-		tionibus.	99
ſcentibus, ſordidis, canis, ueteri-		Aduerſus aurium uermes.	100
bis, & de curationibus ſingu-		Ad compreſſa aurium fora-	
lorum.	96	mina.	100
μαλαιο collirium.	96	Ad grauem audium.	100
Phynon collirium Euelpidis.	96	Ad ſonitum aurium intra ſe	
Sphæriion collirium Euelpi-		ipſas.	100
dis.	96	Ad ea, quæ in aurem inciderunt	
Liquidum Euelpidis colliriū.	96	extrahenda.	100
De canis oculorum ulceribus, &		De narium morbis, & curatio-	

De dentium dolore, & curationibus. 101

De tonsillis, & earū cura. 102

De oris ulceribus, & curationibus, & quæ antheræ sint. 102

De gingivarum ulceribus. 103

De unæ morbo, et curatione. 103

De cancro oris. 104

De parotibus, quæ sub auribus oriuntur. 104

De umbilici prominentis curatione. 104

De obsecnarum partium uicij, et curationibus. 104

De colis morbis, & curationibus. 104

De canceri, qui in colle nascitur, curatione. 105

De phagedænæ in cole nascentis curatione. 106

De carbunculo, qui in cole nascitur. 106

De testiculorū morbis, & eorum curatione. 106

De rhagadijs, & Condylomate, & hemorrhoidibus, alijsq; ani morbis, & curationibus eorū, & primo de rhagadijs. 106

De condylomate. 106

De hemorrhoidibus. 107.

Si anus, uel os uulue procidit, qua curatione utendū sit. 107

De ulcere fungo simili i ano. 107

De digitorum ulceribus. 107

De chirurgiæ, & qui in ea clauerint: & qualis esse chirurgicus debeat: & quid in hoc libro describatur. 108

De luxatis. 108

De his, quæ per se intumescent quomodo excidenda, & curanda sunt. 108

De bonis, malis'ue signis exulceratorum. 109

De fistulis. 109

De ani fistulis. 110

De telis e corpore extrahendis. 110

De ganglijs, & meliceride, & atheromate, & steatomate capitibus tuberculis. 111

De oculorum uicij quæ scalpello, & manu curantur. 112

De crithe tuberculo palpebrarum. 112

De chalaſia palpebrarū. 112

De ungue oculorum, quod mēpū nov a græcis vocatur. 112

De enchanti tuberculo. 113

De ancyloblepharo oculorum uicio. 113

De ægylopa fistula oculorū. 113

De pilis palpebrarum oculum irritantibus. 113

De lagophthalmo oculorum. 114

De ectropio. 114

De staphylomate oculi. 114

De clauis oculorum. 115

De natura oculorum, & eorum suffusione. 115

De pituita oculorum. 116

De aurium morbis, qui manus, et scalpello curantur. 116



Cura in auribus, labrisq; ac na-  
 ribus, quomodo sarari, & cura-  
 ri possint. 117  
 De polypi curatione p ferru. 117  
 De ozena. 117  
 De ore uicijs, quæ manu, & fer-  
 ro curantur. 118  
 De dentibus. 118  
 De uua. 118  
 De lingua. 118  
 De abscessu sub lingua. 119  
 De labris. 119  
 De ceruicis uicijs, et curatione. 119  
 De umbilici uicijs. 119  
 Quomodo aqua hydropicis  
 emittatur. 120  
 De intestinorum uulneratorum  
 curationibus. 120  
 De interiore parte abdominis ru-  
 pta, & qua ratione curanda  
 sit. 121  
 De uariabus uentris. 121  
 De testiculorum natura, & mor-  
 bis eorum. 121  
 De testiculorū curationibus cōibus,  
 & primo de incisione, & cura-  
 tione inguinis, uel scroti. 122  
 De intestini curatione. 123  
 De omēti curatione. 124  
 De ramicis curatione. 124  
 De carne, quæ iter tunicas testicu-  
 lorum conuenit: & de neruo  
 indurato. 125  
 De ramice inguinis. 125  
 Ad tegendam glādem colis si nu-  
 da est. 125  
 Quomodo glans penis contracta  
 aperiri possit. 125  
 Infibulandi ratio. 125  
 De urinae reddendæ difficultate,

& de calculo, curationibusq;  
 eorum. 125  
 Que curatio calculosis adhi-  
 beatur. 126  
 Signa calculorum, uel harenoso-  
 rum, uel mollium. 127  
 De calculis foeminarum. 127  
 Quæ curatio calculo emulso ha-  
 benda sit. 128  
 De cancro qui excisa uesica nasci-  
 tur, et qua cura uti deceat. 128  
 Si naturalia foeminarum concu-  
 bitum non admittunt, quomo-  
 do curari conueniat. 129  
 Qua curatione partus emortuus  
 ex utero excutitur. 130  
 De ani uicijs, & eorum cura-  
 tione. 130  
 De condylomatū curatione. 131  
 De uaricum curatione. 131  
 Curatio digitorū coherētū. 131  
 De cangrenæ curatione. 132

## LIBER OCTAVVS.

De positu, & figura totius huma-  
 ni corporis. 132  
 Ossā uiciata, & corrupta quibus  
 signis cognoscantur: & qua  
 ratione curentur. 134  
 Quomodo os exadatur, et de mo-  
 diolo, & terebra ferramentis  
 ad id paratis. 135  
 De caluarie curatione. 136  
 De narium fracturarū curatione. 138  
 De auriū fracturū curatione. 138  
 De maxillæ fracturæ curatione:  
 deq; quibusdam ad omnia ossa  
 pertinentibus. 138



De iuguli fracti curatione.	139
De costarum fractarum curatione.	139
De spinæ curatione.	140
De humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fractorum, uel emulсорum, communibus curationibus.	140
De fracti humeri curatione.	141
De brachij fracti curatione.	141
De crurum, femorumq; fractorum curatione.	142
De fracti digiti curatione.	142
Comunes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitosq; confractos pertinentia.	142
De luxatis ossibus.	143
De maxillæ luxatæ curatione.	144
De capite luxato.	144
De spina luxata.	144
De humero luxato.	144
De cubiti luxati curatione.	145
De manu luxata.	145
De palma.	145
De digitis.	146
De femore.	146
De genu.	146
De talo.	146
De planta.	147
De digitis.	147

## INDEX QUINTI SERENI.

Capiti medendo.	149
Hemiceraneo medendo.	149
Porrigni depellendæ.	149
Capillo tingendo.	149
Phthiriasi arcendæ.	149
Prurigni, papulis, & scabiei arcendis.	150
Frenesi, ac capiti purgando.	150
Fluori capillorum, & maculis capitis tollendis.	150
Frigori sedando.	150
Elephantiasi propellendæ.	150
Cutis, & faciei uitij propellendis.	150
Aurium uitij suauitrendis.	151
Oculorum dolori mitigando.	151
Dentium uitio, & oris foetori medendo.	152
Vulvæ faucibus, & quæ mollienda sunt medendis.	152
De rigore cervicis.	152
Tussi, & coleribus medendis.	152
Digestioni, & stomacho.	153
Felli uomitu, uel phthisi arcendis.	153
Mammis sanandis, uel stringendis.	153
Reiectioni cibi, aut sanguinis abstinendæ.	153
Iecoris, & lateris uitij medendis.	154
Spleni curando.	154
Præcordijs sanandis.	154
Lûbis, & renibus sanandis.	154
Ventris dolori mitigando.	155
Hydropisi depellendæ.	155
Ventri molliendo.	155

Solutioni uentris, & dysenteriae compescendae.	156	Comitiali morbo medendo.	162
Lumbricis, & tineis purgan- dis.	156	Regio morbo expellendo.	162
Colo sedando.	156	Dentibus, uel strigis inquietatis infantibus.	162
Vesicae, & calculo purgando: & urinae prouocandae.	156	Combusturis igne, uel frigore factis.	162
De conceptione, & partu.	157	Venenis prohibendis.	162
Profluvio cuiusq; sanguinis, & matrici.	157	Venenis datis.	162
Pilis quibuscunq; internecandis, quae oculos impediunt.	157	Vulneribus, & rei dubiae cu- randis.	163
Omnibus obsecenis medendis.	157	Verrucis tollendis.	163
Scies, & articulari morbo.	158	Haemorrhoidis medendis.	163
Furunculo medendo.	158	Paralysi depellendae. primo die ita agendum.	163
Carboni medendo.	158	Secunda ita medendum est.	163
Pani, uomicae, & strumae depel- lendis.	158	Tertia die ita curandum est.	163
Igni sacro medendo.	159	Quid quarta die, & reliquis peragendum sit.	164
Podagrae depellendae.	159		
Vulneribus ferro, aut uerberi- bus factis.	159		
Vulneribus quibuscunq; casibus actis.	159		
Ab homine, uel simia morsus	159		
Serpentum morsibus, & uenenis pellendis.	159		
Ictibus scorpj, & morsibus mu- ris caeci, uel aranei.	160		
Subitaneo dolori, feбри, atq; ostho- copo.	160		
Ad Typum quartanae.	160		
Ad Typum tertianae.	161		
Ad Typum quotidianae.	161		
Hemitritaeo depellendo.	161		
Fracturis, & luxis sanandis.	161		
Nervis incisis, & dolentibus, atq; contractis.	161		
Aegris somno asciscendo.	161		
Lethargiae expellendae.	162		

*Long. Jo. Fran. Guion  
Reg. Cesario P. P.*

I  
A VRELIJ CORNELII CELSI ARTIVM  
LIBER SEXTVS, IDEM MEDI-  
CINAE LIBER PRIMVS.

*T* alimenta sanis corporibus agricultura, sic  
sanitatem ægris medicina promittit. hæc qui-  
dem nusquam non est. siquidem etiam im-  
peritissimæ gentes herbas, aliq; prompta in  
auxilium vulnerum, morborumq; nouerunt.  
Veruntamen apud Græcos aliquanto magis,  
quàm in cæteris nationibus excolta est. ac ne  
apud hos quidem à prima origine, sed paucis ante nos sæculis: ut po-  
te cū uetustissimus auctor Aesculapius celebretur. qui quoniam adhuc  
rudem, & uulgarem hanc scientiam paulo subtilius excoluit, in deo-  
rum numerum receptus est. huius deinde duo filij Podalirius, & Ma-  
chaon bello troiano ducem Agamemnonem secuti, non mediocrē opẽ  
commilitonibus suis attulerunt. quos tamen Homerus non in pestilen-  
tia, neq; in uarijs generibus morborum aliquid attulisse auxilij: sed  
vulneribus tantummodo ferro, & medicamentis uideri solitos esse pro-  
posuit. ex quo apparet has partes medicinæ solas ab his esse tentatas:  
easq; esse uetustissimas. Eodemq; authore disci potest morbos tum ad  
iram deorum immortalium relatos esse: & ab iisdem opem posci so-  
litam. ueriq; simile est inter nonnulla auxilia aduersæ ualetudinis,  
plerumq; tamen eam bonam contigisse ob bonos mores, quos neq; des-  
idia, neq; luxuria tentarant. si quidem hæc duo, corpora prius in Græ-  
cia, deinde apud nos affligerunt. Ideoq; multiplex ista medicina neq;  
olim apud Græcos, neq; apud alias gentes necessaria, uix aliquos ex  
bonis ad senectutis principia perduat. Ergo etiam post eos, de quibus  
retuli, nonnulli clari uiri medicinam exerceuerunt, donec maiore stu-  
dio literarum disciplina agitari cœpit. quæ ut animo præcipue omnium  
necessaria, sic corpori inimica est. Primoq; medendi scientia sapientiæ  
pars habebatur. ut & morborū curatio, & rerum naturæ contem-  
platio sub iisdem authoribus nata sit. scilicet his hanc maxime requi-  
rentibus, qui corporū suorū robora quieta cogitatione, nocturnaq; ui-  
gilia minuerant. Ideoq; multos ex sapientiæ professoribus peritos, eius  
fuisse accepimus. clarissimos uero ex his Pythagorā, et Empedoclem,  
& Democritum. huius autem, ut quidā crediderunt, discipulus Hip-  
pocrates Cus: primus quidē ex omnibus memoria dignus, ab studio  
sapientiæ disciplinam hanc separauit: uir & arte, & sciendia insi-  
gnis. Post quem Diocles Carystus, deinde Traxagoras, et Chrysippus,  
Aurelij Cor.



tum Herophilus, et Erasistratus sic artem hanc exercuerunt, ut etiā  
 in diuersas curandi vias processerint. Iisdemq; temporibus in tres  
 partes medicina diducta est, ut una esset quæ uictu, altera quæ me-  
 dicamentis, tertia quæ manu mederetur. Primā διατριβήν, secundā  
 φαρμακωτικήν, tertiam χειρουργικήν Græci nominauerunt. Eius autē  
 quæ uictu morbos curat longe clarissimi authores etiam altius quæ-  
 dam agitare conati, rerum quoq; naturæ sibi cognitionem uendicau-  
 erunt, tanquam sine ea trunca, et debilis medicina esset. Post quos Se-  
 rapion primus omnium nihil hanc rationalem disciplinam perti-  
 nere ad medicinā professus, in usu tantum, et experimentis eam po-  
 suit. quem Apollonius, et Glaucias, et aliquanto post Heraclides Ta-  
 rentinus, et aliqui non mediocres uiri secuti, ex ipsa professione se ἐμ-  
 περιούς appellauerunt. Sic in duas partes ea quoq; quæ uictu cu-  
 rat, medicina diuisa est: alijs rationalem artem, alijs usum tantum sibi  
 uendicantibus. nullo uero quicq; post eos, qui supra comprehēsi sunt,  
 agitante, nisi quod acceperat: donec Asclepiades mudendi rationē ex  
 magna parte mutauit. Ex cuius successoribus Themison nuper ipse  
 quoq; quedam in senectute deflexit. Et per hos quidem maxime ui-  
 ros salutaris ista nobis professio increuit. Quoniam autem ex tribus  
 medicinæ partibus ut difficillima, sic etiam clarissima est ea, quæ  
 morbis medetur: ante omnia de hac dicendum est. Et quia prima in  
 ea dissensio est, quod alij sibi experimentorum tantummodo notitiam  
 necessariam esse contendunt: alij nisi corporum, rerumq; ratione com-  
 perta, non satis potentem usum esse proponunt: indicandum est quæ  
 maxime ex utraq; parte dicantur: quo facilius nostra quoq; opinio  
 interponi possit. Igitur hi qui rationalem medicinā profitentur, hæc ne-  
 cessaria esse proponunt. abditarum, et morbos continentium causarū  
 notitiam, deinde euidentium post hæc etiam naturalium actionum  
 nouissime partium interiorū. Abditas causas uocant in quibus requiritur  
 ex quibus principijs nostra corpora sint: quid secundam, quid aduer-  
 sam ualeitudinem faciat. Neq; enim credunt posse eum scire quomodo  
 morbos curare conueniat, qui unde hi sint, ignoret. Neq; esse dubiū,  
 quin alia curatione opus sit, si ex quatuor principijs uel superans  
 aliquid, uel deficiens aduersam ualeitudinem creat: ut quidam ex sa-  
 pientiarū professoribus dixerunt. Alia si in humidis omne uitium est,  
 ut Herophilo uisum est. alia si in spiritu, ut Hippocrati. alia si san-  
 guis in eas uenas, quæ spiritui accommodatæ sunt, transfunditur: et  
 inflammationem quam Græci πλεγμασμός nominant, excitat: eaq; in-  
 flammatio talem motum efficit, qualis in febre est: ut Erasistrato pla-  
 cuit. alia si manantia corpuscula per inuisibilia foramina subsisten-



do iter claudunt: ut Aesclepiades contēdit. Eum uero recte curaturū, quem prima origo causae non sefellerit. Neque uero insciantur experi-  
 menta quoque esse necessaria. sed ne ad hanc quidē adiutum fieri potuisse,  
 nisi ab aliqua ratione contendunt. Non. n. quilibet antiquiores viros  
 agris inuicasse: sed cognasse quod maxime conueniret: et id usu explo-  
 rasse, quod ante coniectura aliqua duxisset. neque interesse an initia ple-  
 raque explorata sint, si à consilio tamen coeperunt. et id quidē in mul-  
 tis ita se habere. Saepē uero ēt noua inuadere genera morborū, in qui-  
 bus nihil adhuc usus ostenderit. et ideo necessariū sit animaduvertere  
 unde ea coeperint, sine quo nemo mortalium reperire possit, cur hoc,  
 quā illo potius uatatur. et ob hanc quidē in obscuro positas causas per-  
 sequuntur. Euidentes uero has appellant, in quibus querunt initium mor-  
 bi calor attulerit, an frigus. fames, an satietas. et quae similia sunt. Oc-  
 cursurū enim uitio dicunt eum, qui originē non ignorari. Naturales  
 uero corporis actiones appellāt, per quas spiritum trahimus, et emitti-  
 mus cibum: potionemque, et assumimus, et concoquimus. Itaque per quas  
 eadē hanc in omnes membrorum partes digeruntur: tum requirunt et  
 quare uenae nostrae modo submittant sese: modo attollant. quae ratio  
 somni, quae uigilia sit. sine quorum notitia neminem putant uel occurrere,  
 uel mederi morbis, inter haec nascentibus, posse. Ex quibus quia  
 quā maxime pertinere ad rem concoctio uidetur. Huic potissimum in se-  
 stunt: et ducē alij Erasistrato atteri cibū in uentre contendunt. alij Pli-  
 stonico Praxagorae discipulo putrescere. alij credunt Hippocrati per  
 calorem cibos concoqui. Acceduntque Aesclepiades amuli, quod omnia ista ua-  
 na, et superuacua esse proponunt. Nihil enim concoqui, sed crudā mate-  
 riā, sicut assumpta est, in corpus omne diduci. Et hanc quidē inter eos  
 parū constant. Illud uero cōuenit, alium dandū cibum laborātibus, si  
 hoc: alium si illud uerū est. Nam si teritur intus, eum querendū esse,  
 qui facillime teri possit. si putrescit, eū in quo hoc expeditissimū est.  
 si calor concoquit, eū qui maxime calorem moueat. At nihil ex his cō-  
 querendū, si nihil concoquitur. Ea uero sumenda, quae maxime manēt,  
 qualia assumpta sunt. Eadēque ratione cū spiritus grauis est, cū seminus  
 aut uigilia urget, eū mederi posse arbitrantur: quod prius illa in sa, quali-  
 ter eueniam, peperit. Prater hanc cū in interioribus partibus et dolores,  
 et morborū uaria genera nascantur, neminē putant his adhibere posse  
 remedia, quae ipse ignoret. Necessariū ergo esse inuadere corpora mor-  
 tuorum: eorumque uiscera, atque interna scrutari. Longeque optime fuisse uero  
 philum, et Erasistratū, quod nocētes homines à regibus ex carcere acceptos,  
 uiuos inuaderint: cōsiderarintque et spiritu manente, ea quae natura an-  
 te clausisset: eorumque positurā, colorem, figurā, magnitudinē, ordinem,

*his anax  
 mica a p  
 fuerit in  
 non*

duritiem, molliem, leuorem, contactum: processus deinde singulorū,  
 & recessus: & siue quid inscribitur alteri: siue quid partē alterius in  
 se recipit. Neq; enim cum dolor intus incipit, scire quid doleat eum,  
 qui qua parte quodq; viscus intestinumue sit, non cognouerit. Neq; cu  
 rari id quod aegrū est, posse ab eo, qui quid sit, ignoret. Et cum p mul  
 tus alius viscera patefacta sunt, eum, qui sanæ cuiusq; colorē par  
 tis ignoret, nescire quid integrū, quid corruptum sit. Ita ne succurre  
 re quidem posse corruptis, aptiusq; extrinsecus imponi remedia, cō  
 pertis interiorum, & sedibus, & figuris. Cognitaq; eorū magnitudi  
 ne, similesq; omnia, quæ posita sunt, rationes habere. Neq; esse crude  
 le, sicut pleriq; proponunt, hominū nocentium: & horum quoq; pau  
 corum supplicis remedia populis in nocentibus seculorum omnium quæ  
 ri. Contra hi, qui se e præcipuis ab experientia nominant: euidentes  
 quidē causas ut necessariis amplectuntur. Obscurarū uero causarum,  
 & naturalium actionum questionem ideo supernam esse conten  
 dunt, quoniam incōprehensibilis natura sit. non posse uero cōprehē  
 di, patere ex eorum, qui de his disputarunt, discordia: cum de ista re,  
 neq; inter sapientiæ professores, neq; inter ipsos medicos conueniit. Cur  
 enim potius aliquis Hippocrati credat, q̃ Herophilo? Cur huic potius,  
 q̃ Asclepiadi? si rationes sequi uelit, omnium posse uideri non impro  
 bables. si curationes, ab omnibus his ægros perductos esse ad sanitatē.  
 Ita neq; disputationi, neq; auctoritati cuiusq; fidē derogari oportuisse.  
 Etiam sapientiæ studiosos maximo: medicos esse, si ratio natio hoc fa  
 ceret. nunc illis uerba superesse, deesse medendi scientiam. Differre  
 quoq; pro natura locorū ge uera medicinæ: & aliud opus esse Romæ:  
 aliud in Aegypto: aliud in Gallia. Quod si morbos eadem causæ fac  
 rent ubiq; remedia quoq; ubiq; eadē esse debuissent. sæpe ēt causas ap  
 parere: ut puta lippitudinis, uulneris, neq; ex his patere medicinam.  
 Quod si scientiā hanc non subiiciat euidentis causa, multo minus eam  
 posse subijcere, quæ in dubio est. Cū igitur illa incerta incōprehēsi  
 bilisq; sit, a certis potius, et exploratis petendū esse præsidium. i. his, quæ  
 experiētia in ipsis curationibus docuerit, sicut in cæteris omnibus ar  
 tibus. Nam ne agricolam quidem, aut gubernatorem disputatione, sed  
 usu fieri. ac nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere. Eo quoq;  
 disci, quod qui diuersa de his scripserint, ad eandē tamen sanitatē ho  
 mines perduxerint. id enim fecisse, q̃ a nō ab obscuris causis, neq; a na  
 turalibus actionibus, quæ apud eos diuersæ erant: sed ab experimen  
 tis pro ut cuiq; responderant, medendi uias traxerint: ne inter initia  
 quidē ab istis questionibus deductā esse medicinam, sed ab experi  
 mentis. Aegrorum enim, qui sine medicis erāt, alios propter auiditatē



primis diebus protinus cibum assumpsisse: alios propter festi diu absti-  
nuisse: lenatumq; magis eorū morbum esse, qui abstinnerant. Itemq;  
alios in ipsa febre aliquid edisse: alios paulo ante eā: alios post remissio-  
nem eius. optime deinde his cessasse, qui post finē febris id fecerint. Ea  
dēq; rationē alios inter principia protinus usos esse cibo pleniore: alios  
exiguo: grauiorēq; eos factos, qui se implerent. Hæc similiaq; cū coti-  
die inciderent, diligentes homines notasse, quæ plerumq; melius respon-  
derent: deinde ægotatibus ea præcipere cœpisse. sic medicinam ortā,  
subinde aliorū salute, aliorū interitu: perniciosa discernentē à salutari-  
bus. Repertis deinde medicine remedijs, hoies de rationibus corū dis-  
cere cœpisse: nec post rationē medicinam esse inuentam, sed post inue-  
tam medicinā rationē esse quæsitam. Requiritur et si ratio idē doceat  
quod experientia, an aliud. Si idē, superuacua esse. si aliud, et con-  
trariam. Primo tamen remedia explorāda summa cura fuisse. nunc  
uero iam explorata esse: neq; ulla, aut noua genera morborū reperiri,  
aut nouam desiderari medicinā. Quod si iā incidat mali genus ali-  
quod ignotū: non ideo tamen fore medico de rebus cogitandū obscu-  
ris: sed eū protinus uisurū, cui morbo id proximū sit: tentaturūq; re-  
media similia illis, quæ uicino malo sæpe succurrerint. Et per eius sē-  
militudinē opem reperiturū. Neq; n. se dicere consilio medicū non ege-  
re: Et irrationale animal hanc artē posse præstare. sed has latentū  
rerū coniecturas ad rē non pertinere: quia non intersit, quid morbi  
ficiat, sed quid tollat. Neq; ad rē pertineat quomodo, sed qd optime  
digeratur: siue hac de causa cōcoctio incidat, siue de illa. Et siue cō-  
coctio sit illa, siue tantū digestio. Neq; quædū esse quomodo spiremus:  
sed quid graue, tardumq; spiritū expediat. neq; quid uenas moueat:  
sed quid quaq; motus genera significant. Hæc aut cognosci experimē-  
tis, Et in omnibus eiusmodi cogitationibus in utrāq; partē differi pos-  
se. Itaq; ingeniū Et faciundiam uincere: morbos aut non eloquentia,  
sed remedijs curari. Quæ si quis elinguis usu discreta bene norit: hūc  
aliquanto maiorē medicum futurū: q̄ si sine usu linguā suā excolue-  
rit. Atq; ea quidē, de quibus est dictū, superuacua esse tantummodo.  
Id uero quod restat et crudele: uiuorū hominum aliuū, atq; præcor-  
dia incidū: Et salutis humanæ præsidē artem non solū pestem alicui,  
sed hanc et atrocissimam inferre: cū præsertim ex his, quæ tanta uio-  
lentia quærantur, alia non possint omnino cognosci: alia possint et  
sine scelere. nā colorem, laucorē, mollitiem, duritiem, similiaq; omnia  
nō esse ita in eo corpore, qualia integro fuerint. q̄ cū corporibus in-  
uiolatis, hæc tamen metu, dolore, inedia, cruditate, lassitudine, mille alijs  
mediocribus affectibus sæpe mutantur: multo magis uerisimile est inte-

primis in  
medicinis  
hinc u  
uone in  
robata

morbi n  
eloque  
tia sed  
remedy  
inuenta

riora, quibus maior mollities lux ipsa nona sit, sub grauissimis ulneribus et ipsa truncatione mutari: neque quicquam esse stultius, quam quale quod uiuo homine est, tale existimare esse moriente, immo iam mortuo. Nam utrum quidem, qui minus ad rem pertineat, spirante homine posse diduci? simulatque uero ferrum ad praecordia accessit: et discissum transuersum septum est: quod membrana quadam superiores partes ab inferioribus diducit, (ἀσπασμαux græci uocant) hominem protinus animam amittere. Ita denum mortui praecordia, et uiscus omne in conspectum latrocinantis medici dari: quod necesse sit tale esse, quale mortui sit: non quale uiui fuit. Itaque consequi medicum ut hominem crudeliter iugulet: non ut sciat qualia uiui uiscera habeamus. Si quid tamen sit, quod adhuc spirante homine conspectui subiiciatur, id saepe casum offerre curantibus. Interdum enim gladiatorem in harena, uel militem in acie, uel uiatorem a latronibus exceptum, sic uulnerari: ut eius interior aliqua pars aperiatur: et in alio alia sita: sedē, positum, ordinem: figurā: similiaque alia cognoscere prudentem medicum non cadere, sed sanitatem molientem: idque per misericordiam discere, quod alij dira crudelitate cognouerint. Ob hæc ne mortuorum quidem lacerationem necessariam esse: quæ et si non crudelis, in fœda sit: cum aliter pleraque in mortuis se habeant. Quatum uero in uiuis cognosci potest, ipsa curatio ostendat. Cum hæc per multa uolumina, per quæ magnæ cōtentionis disputationes, a medicis saepe tractata sint, atque tractentur: subiiciendum est, quæ proxima uero uideri possint: ea neque addictæ alterutri opinioni sunt: neque ab utraque nimium abhorrentia, media quodammodo inter diuersas sententias. Quod in plurimis cōtentionibus deprehendere licet sine ambitione uerum scrutantibus: ut in hac ipsa re. Nam quæ demum causæ uel secundā ualitudinem present: uel morbos exciēt: quomodo spiritus, aut cibus uel detrahatur, uel digeratur: ne sapiētiae quidem professores scientia cōprehendunt: sed cōiectura persequuntur. cuius aut rei non est certa notitia, eius opinio certum reperire remedium non potest. Verumque est ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre, quam experientiam. Quamquam igitur multa sint ad ipsas artes proprie non pertinentia: tamen eas adiunat excitando artificis ingenium. Itaque ista quoque naturæ rerum cōtēplatio quous non faciat medicum aptiorem, tamen medicinæ reddit perfectum. Verumque simile est et Hippocratem, et Erasistratum, et quicumque alij non cōtenti febres et ulcera agitare, rerum quoque naturam ex aliqua parte scrutati sint: non ideo quidem medicos fuisse: uerum ideo quoque maiores medicos extitisse. Ratione uero opus est ipsi medicinæ, et si non inter obscuras causas, neque inter naturales actiones, in sepe. Est enim hæc ars cōiecturalis: neque respondet ei plerumque non solum cōiectura,



sed etiam experientia. et interdum non febris, non abus, non somnus subsequitur sicut assuevit. Rarius, sed aliquando tamen morbus quoque ipse nouus est, quem non incidere, manifeste falsum est: cum ætate nostra quædam ex naturalibus partibus carne prolapsa, et arente, intra paucas horas expirauerit: sic ut nobilissimi medici neque genus mali, neque remedium inuenerint: quos ego nihil ideo tentasse iudico: quia nemo in splendida persona periclitari coniectura sua ueluerit: ne occidisse, nisi seruasset, uideretur. Veri tamen simile est, potuisse aliquid cogitare detracta tali uerecundia: Et fortasse responsurum fuisse id quod aliquis esset expertus. Ad quod medicinæ genus neque semper similitudo aliquid confert: Et si quando confert: tamen id ipsum rationale est inter multa similia genera et morborum, et remedium cogitare, quo potissimum medicamento sit utendum. Cum igitur talis res incidit: medicus aliquid oportet inueniat: quod non utique fortasse, sed sæpius tamen etiam respondeat. Petet autem nouum quoque consilium non ab rebus latentibus (istæ enim dubiæ, et incertæ sunt) sed ab his quæ explorari possunt: id est euidentibus causis. Interest enim fatigatio morbum: an sitis, an frigus, an calor, an uigilia, an fames fecerit: an cibi, uinique abundantia: an intemperantia libidinibus: neque ignorare hunc oportet, quæ sit ægri natura, humidum magis, an magis siccum corpus eius sit: ualidi nerui, an infirmi: frequens aduersa ualetudo, an rara, ea, quæ cum est, uehemens esse soleat: an leuis. breuis, an longa. Quod is uitæ genus sit secutus, laboriosum, an quietum, cum luxu, an cum frugalitate. ex his enim, similibusque sæpe currendi noua ratio ducenda est. Quamuis ne hæc quidem sic præteriri debent, quasi nullam controuersiam recipiant. Nam et Erasistratus non ex his fieri morbos dixit: quoniam et alij, et ipse alijs post ista non febri citarent: Et quidam medici sæculi nostri sub authore (ut ipsi uideri uolunt) Themisone, cõtendunt nullius causæ notitiam quicquam ad curationes pertinere: satisque esse quædam cõia morborum intueri. si quidem horum tria genera esse, unum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum. Nam modo parum excernere ægros, modo nimium: modo alia parte parum, alia nimium. Hæc autem genera morborum modo acuta esse, modo longa: Et modo incrementum, modo consistere: modo minui consueuerunt. Cognito igitur eo quod ex his est, si corpus adstrictum est, digerendum esse: si profusio laborat, continendum. si mixtum uitium habet, currendum subinde uehementiori malo. et aliter acutis morbis medendum, aliter uehementibus. aliter incrementibus, aliter sustentibus. aliter iam ad sanitatem inclinantibus. Horum observationem medicinam esse: quam ita finiunt, ut quasi uiam quandam quæ uicodorus greci nominant: eorumque quæ in

morbis cōia sunt, contemplatiuē esse contendunt: ac neq; rationalibus  
 se, neq; experimētū tantum spectatibus annumerari uolunt: cū ab illis  
 eo nomine dissentiant, quod in cōiectura rerū latentū nolunt esse me-  
 dicinā: ab his eo quod parū artis esse in obseruatione experimētōrū  
 credunt. Quod ad Erasistratū pertinet, primū ipsa euidentia eius  
 opinioni repugnat: ga raro nisi post horū aliquid morbus uenit. De-  
 inde non sequitur, ut quod aliū non affiat, aut eundē aliās: id ne al-  
 teri quidē, aut eidem tempore alio noceat. Possunt enim quædā subesse  
 corpori, uel ex infirmitate eius, uel ex aliquo affectu: quæ uel i alio nō  
 sunt: uel in hoc aliās nō fuerunt. eaq; p se non tanta ui concitant mor-  
 bum: tamen obnoxiiū magis alijs iniurijs corpus efficiunt. Quod si cō-  
 tēplationem rerū naturæ, quā temere medici sibi uendicant: satis cō-  
 prehēdisset: et illud scisset: nihil omnino ob unā causam fieri, sed id pro  
 causa apprehendi: quod cōtulisse plurimū uidetur. Potest aut id dū so-  
 lum est, nō mouere: quod iunctū alijs maxime mouet. Accedit ad hæc,  
 quod ne ipse quidē Erasistratus, qui trāsffuso in arterias sanguine, fe-  
 brem fieri dicit: idq; nimis repleto corpore incidere repperit: air ex  
 duobus æque repletis, alter in morbū inciderit: alter omni periculo  
 uacuit: quod cotidie fieri apparet, nō discreuerit. Ex quo disci pōt, ut  
 uera sit illa trāsffusio, tamen illā non p se, cum plenū corpus est, fieri:  
 sed cū horū aliquid accesserit. Themisonis uero æmuli, si ppetua quæ  
 promittunt, habent: magis et q̄ ulli rationales sunt. Neq; n. si quis nō  
 omnia tenet, quæ rationalis alius probat: protinus alio nouo nomine  
 artis indiget. Si modo, quod primū est: non memoriæ soli, sed rationi  
 quoq; insitit. Si quod uero propius est, uix ulla perpetua præcepta  
 medicinalis ars recipit: ijdē sunt, quod hi, quos experimēta sola susti-  
 nent. Eo magis qm si cōpresserit aliquē morbus, an fuderit: quilibet  
 et imperitissimus uidet. Quid aut cōpressum corpus resoluat: quid so-  
 lutū teneat: si à ratione tractū est, rationalis est medicus. Si ut ei, qui  
 se rationale negat, cōfiteri necesse est: ab experiētia empiricus est. Ita  
 apud eū morbi cognitio extra artē, medicina intra usum ē. Neq; ad-  
 iectum quicq; empiricorū professioni, sed demptum est: qm illi multa  
 circūspiciunt: hi tantum facillima et non plusq; uulgaria. Nā et hi  
 qui pecoribus ac iumentis medentur, cū propria cuiusq; ex multis ani-  
 malibus nosse non possint: cōibus tantummodo insistant. Et exteræ gē-  
 tes, cum subtilē medicinæ rationē non nouerint: cōia tantum uident.  
 Et qui ample ualitudinarios nutriunt, quia singulis summa cura cō-  
 sulere non subsistent: ad cōia ista confugunt. Neq; Hercules istud, et  
 antiqui medici nescierunt: sed his contenti non fuerunt. Ergo et uetu-  
 tissimus author Hippocrates dixit mederi oportere et cōia, et pro-



pria inueniēte. Ac ne isti quidē ipsi intra suam professionem consistere ullo modo possunt. si quidē & cōpressorum, & fluentium morborum genera diuersa sunt: faciliusq; id in his quæ fluunt, inspicia pōt. Aliud est. n. sanguine, aliud bilem, aliud cibū uomere: aliud deiectionibus, aliud torminibus laborare: aliud sudore digeri: aliud tabe cōsumi. Atq; in partes quoq; humor erumpit, ut in oculos, auresq;: quo piculo nullum humanū membrum uacat: nihil aut horū sic, ut aliud cōratur. Ita protinus in his à cōi fluentis morbi cōtēplatione ad propriam medicina descendit. Atq; in hac quoq; rursus alia proprietatis noticiā sepe necessaria est: quia non eadē omnibus ēt in similibus casibus opitulantur. si quidē certæ quædā res sunt, quæ in pluribus uētre aut astringunt, aut resolunt: inueniuntur tñ in quibus aliter, atq; in cæteris idem eueniat. In his ergo cōmuniū inspectio contraria est: propriorū tantū salutaris: et causæ quoq; æstimatio sepe morbum soluit. Ergo ēt ingeniosissimus sæculi nostri medicus, quem uisper uidimus, Cassius febricitanti quidam, & magna siti affecto, cum post ebrietatem eū premi cœpisse cognosceret: aquam frigidā ingessit: quæ ille epotā, cum uini uim miscendo fregisset, protinus febrem omno & sudore discussit. Quod auxilium medicus opportune prouidit, nō ex eo, quod aut strictum corpus erat, aut fluebat: sed ex causā, quæ ante præcesserat. Estq; etiam proprium aliquid & loci, & temporis istis quoq; authoribus: qui cum disputant quemadmodum sanis hominibus agendum sit, præcipiunt ut grauib; aut locis, aut temporibus magis uitetur frigus, æstus, facietas, labor, libido: magisq; ut conquescat hisdem aut locis aut temporibus, si quis grauitatem corporis sentit: ac neq; uomitu stomachum, neq; purgatione aluum sollicitet. Quæ uera quidem sunt: à communibus tamen ad quædam propria descendunt. nisi persuadere nobis uolunt, sanus quidem considerandum esse: quod cælum, quod tempus anni sit, ægris uero non esse: quibus tanto magis omnis obseruatio necessaria est, quanto magis obnoxia offensis infirmitas est. Quin etiam morborum in hisdem hominibus aliæ, atq; aliæ proprietates sunt: & qui secundis aliquando frustra curatus est: contrarijs sepe restituitur. Plurimaq; in dando cibo discrimina reperiuntur: ex quibus contentus uno ero. nam famem facilius fert adulescens, quàm puer: facilius in densō cælo, quàm in tenui: facilius in hyeme, quàm æstate: facilius uno cibo, quàm prandio quoq; assuetus: facilius inexercitatus, quàm exercitatus homo sustinet. Sepe autem in eo magis necessaria aibi festinatio est, qui minus in diem tolerat. Ob quæ competit eum qui propria non nouit, communia tantum intueri debere: eumq; qui nosse propria potest, illa quidem non oportere negli-



gere, sed his quoq; insistere. Ideoq; cum par scientia sit, utilioremen ta-  
men medicum esse amicum, q̄ extraneū. Igitur ut ad propositum meū  
redeam, rationalem quidem puto medianam esse debere: instrui vero  
ab evidentibus causis, obscuris omnibus non à cogitatione artificis, sed  
ab ipsa arte reiectis. Incidere autem uiuorum corpora, & crudele, et  
superuacuum est: mortuorum corpora discantibus necessarium. Nam  
positum, & ordinem nosse debent, quæ cadauera melius, quam ui-  
uus & uulneratus homo representant: sed & cætera quæ modo in  
uiuis cognosci possunt, in ipsis curationibus uulneratorum paulo tar-  
dius, sed aliquando mitius usus ipse monstrauit. His propositis, pri-  
mum dicam quemadmodum sanos agere conueniat: tum ad ea tran-  
sibo, quæ ad morbos, curationesq; eorum pertinebunt.

Caput primum quemadmodum sanos agere conueniat.

Annus homo qui et bene ualet, & suæ spontis est, nul-  
lis obligare se legibus debet: ac neq; medico, neq; ia-  
tropa egere. Huc oportet uariū habere uitæ genus:  
modo ruri esse, modo in urbe: sepiusq; in agro. nauiga-  
re, uenari, q̄scere interdū: sed frequentius se exerce-  
re. Siquidem ignauia corpus hebetat: labor firmat. illa maturam se  
nectutem: hic longam adolescentiam reddit. Prodest etiam interdum  
balneo, interdum aquis frigidis uti. modo ungi, modo id ipsum negli-  
gere. nullum tibi genus fugere, quo populus utatur. interdum in conui-  
uio esse: interdum ab eo se retrahere. modo plus iusto, modo non am-  
plius assumere. bis die potius, quàm semel cibum capere, & semper  
quam plurimū, dummodo hunc concoquat. sed ut huius generis exer-  
citationes, cibiq; necessarij sunt, sic athletici superuacui: nam & inter-  
missus propter ciuiles aliquas necessitates ordo exercitationis corpus  
affligit: & ea corpora, quæ more eorum repleta sunt, celerrime, &  
senescunt, & ægrotant. Concubitus uero neq; nimis concupiscendus,  
neq; nimis pertimescendus est. Rarus corpus excitat: frequens soluit.  
Cum aut frequens non numero sit, sed natura: ratione ætatis & cor-  
poris: scire licet eum non inutilem esse, quem corporis neq; languor,  
neq; dolor sequitur. Idem interdum peior est, nocturnus tutior. ita tamen se  
neq; illum abus, neq; hunc cum uigilia labor statim sequitur. Hæc fir-  
mis seruanda sunt: cauendumq; ne in secunda ualitudine aduersæ  
presidia consumantur.

Quæ stomacho imbecilli seruanda sint, Caput secundum.

T imbecillis stomacho, quo in numero magna pars  
urbanorum, omnesq; penè cupidi literarum sunt: ob-  
a seruatio maior necessaria est. ut quod uel corporis, uel  
loci, uel studij ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur  
tur q; bene cõcoxit, mane tuto surget. qui parũ, quiescere debet. Et si  
mane surgendi necessitas fuerit, redormire. Qui nõ concokit, ex toto  
conquiescere: ac neq; labori se, neq; exercitationi, neq; negotio credere.  
Qui crudũ sine præcordiorum dolore ructat, is ex intervallo aquã  
frigidam bibere: Et se nihilominus continere. Habitare uero ædifi-  
cio lucido per flatum æstiuum hibernum solem habente. cauere meri-  
dianum solem: matutinum, Et uespertinum frigus: itemq; auras flu-  
minum, atq; stagnorum: minimeq; nubilo cælo soli aperiendi se com-  
mittere: ne modo frigus, modo calor moueat. quæ res maxime gra-  
uedines, distillationesq; concitat. Magis uero grauibus locis ista seruanda  
sunt: in quibus et pestilentiam faciunt. Sare aut licet integrum cor-  
pus esse, cum cotidie mane urina alba, dein ruffa est. illud cõcoquere,  
hoc concokisse significat. Vbi expectectus est aliquis, paulum inter-  
mittere: deinde nisi hyems est, fouere os multa aqua frigida debet. Iō-  
gis diebus meridiari potius ante cibum, sin minus, post eum. per hye-  
mem potissimum totis noctibus conquiescere. Sin lucubrandum est, nõ  
post cibum id facere, sed post concoctionem. Quem interdum uel do-  
mestica, uel ciuilia officia tenuerunt: huic tempus aliquod seruandum  
curationi corporis sui est. Prima autem eius curatio exercitatio est:  
quæ semper antecedere cibum debet: in eo qui minus laborauit, Et  
bene concokit, amplior. in eo qui fatigatus est, Et minus concokit, re-  
missior. Commode uero exercent clara lectio, arma, pila, cursus, am-  
bulatio: atq; hæc non utiq; plana commodior est. si quidem melius  
ascensus quoq; Et descensus cum quadam uarietate corpus moueat:  
nisi tamen id perquam imbecillum est. melior autem est sub diuo,  
quàm in porticu. melior si caput patitur, in sole, quàm in umbra. me-  
lior in umbra, quam parietes, aut uiridaria efficiunt, quàm quæ tecto  
subest. melior recta, quàm flexuosa. exercitationis autem plerumq; fi-  
nis esse debet sudor: aut certe lassitudo, quæ citra fationem sit: idq;  
ipsum modo minus, modo magis faciendum est. Ac ne his quidem  
athletarum exemplo, uel certa esse lex, uel immodicus esse labor  
debet. Exercitationem recte sequitur modo unctio uel in sole, uel ad  
ignem: modo balneũ, sed conclauĩ quam maxime, Et alto, Et lucido, et  
spacioso. Ex his uero neutrũ sæpe fieri oportet: sed sæpius alterutrum

Debita

Stomachum

quidam

Lotos

umbra

studium po

cutionem

Debit fieri

Exercitatio

est melior

sub diuo

sub porticu



pro corporis natura. Post hæc paulum conuiescere opus est. ubi ad cibum uentum est: nunquam utilis est nimia sacietas. Sæpe etiam inutilis nimia abstinentia. Sæpe si qua intemperantia subest: tutior est in potione quàm in esca. Cibus à salsamentis, oleribus, similibusq; rebus melius incipit. Tum caro assumenda est, quæ assa optima, aut elixa est. Conditæ omnia duabus de causis inutilia sunt. quoniam & plus propter dulcedinem assumitur: et quod modo par est, tamen ægrius concoquitur. Secunda mensa bono stomacho nihil nocet: in imbecillo coarcescit. si quis itaq; hoc parum ualet, palmulas, pomaq; et similia melius primo cibo assumit. Post multas potiones, quæ aliquantum sitim excesserunt, nihil edendū est. post sacietatem, nihil agendum. Vbi expletus est aliquis, facilius concoquit: si quicqd assumpsit, potione aquæ frigida includit: tum paulisper inuigilat: deinde bene dormit. Si quis interdum se implebit: post alium neq; frigori, neq; æstui, neq; labori se debet committere. neq; enim tam facile hæc inani corpore, quàm repleto nocet. Si quibus de causis futura inedia est: labor omnis uitandus est.

Observationes quædam prout res nouæ accidunt: & prout corporū genera, & sexus, & ætates, & tempora anni sunt. Caput tertium.

*intra loci*  
*infra notat*  
*in uetustate*  
*et uetustate*  
Itq; hæc quidem penè perpetua sunt. Quasdam autem observationes desiderant & nouæ res, et corporū genera, & sexus, et ætates, & tempora anni. Nam neq; ex salubri loco in grauem, neq; ex graui in salubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in grauem prima hyeme, ex graui in eum, qui salubris est, prima astate transire melius est. Neq; uero ex multa fame nimia sacietas: neq; ex nimia sacietate famēs idonea est. Periclitaturq; & qui semel, & qui bis die cibum incontinenter contra consuetudinem assumit. Item neq; ex nimio labore subitum otium: neq; ex nimio ocio subitus labor sine graui noxa est. Ergo cum quis mutare aliquid uolet, paulatim debet assuescere. Omnem etiam laborem facilius uel puer, uel senex, quam insuetus homo sustinet. Atq; ideo quoq; nimis ociosa uita utilis non est, quia potest incidere laboris necessitas. Si quando tamen insuetus aliquis laborauit, aut multo plus quàm solet, etiam si qui assueuit, huic ieiunio dormiendum est: multo magis si etiam os aruarum est: uel oculi caligant: aut uenter perturbatur. Tum enim non dormiendum tantummodo ieiunio est, sed etiam in posterum diem permanendum: nisi cito id quies sustulit. Quod si factum est: surgere oportet, & lente paululum ambulare. At si somni necessitas non fuit, quia modice magis



aliquis laborauit, tamen ingredi aliquid eodē modo debet. Cōmunia  
 deinde omnibus sunt post fatigationem alium sumpturis, ubi paulum  
 ambulauerunt, si balneum nō est, calido loco uel in sole, uel ad ignem  
 ungi: atq; sudare. si est, ante omnia intrepidario residere. Deinde ubi  
 paulum conqueuerunt, intrare, et descendere in solium. tum multo oleo  
 ungi, leniterq; perfricari: iterum in solium descendere. Post hæc os  
 aqua calida fouere, deinde frigida. Balneum his feruens idoneū non  
 est. Ergo si nimium alicui fatigato penē febris est, huic abunde est loco  
 tepido demittere se in quinibus tenus in aquam calidam, cui paulū olei  
 adiectum: deinde totum quidē corpus, maxime tamen eas partes, quæ  
 in aqua fuerunt, leniter perfricare ex oleo, cui uinum, et paulum con  
 triti salis sit adiectum. Post hæc omnibus fatigatis, aptum est cibum  
 sumere, eoq; humido uti. aqua, uel certe diluta potione esse contentos, ma  
 ximēq; ea, quæ moueat urinam. Illud quoq; nosse oportet, quod ex la  
 bore sudanti frigida potio perniciosissima est. atq; etiam cum sudor se  
 remisit, itinere fatigatis inutilis. A balneo quoq; uenientibus Asclepia  
 des inutilem eam iudicauit. quod in his uerum est, quibus alius fa  
 cile nec tuto resoluitur: quiq; facile inhorrescant. perpetuū in omnibus  
 non est, cum potius naturale sit potione æstuantem stomachum refri  
 gerari: frigentem calefieri. quod ita præcipio, ut tamen fatear ne ex  
 hac quidem causa sudanti adhuc frigidum bibendum esse. Solet etiā  
 prodesse post uariū cibum, frequentesq; dilutas potiones, uomitus, et  
 postero die longa quies, deinde modica exercitatio. Si assidua fatigatio  
 urget, inuicem modo aqua, modo uinum bibendum est: raroq; balneo  
 utendum. Leu atq; lassitudinem etiam laboris mutatio: cumq; quem  
 nouum genus: eiusdem laboris pressit, id quod in consuetudine est, re  
 fricit. Fatigato cotidianum cubile turissimū est: insolitum contra lassat.  
 quod enim contra consuetudinem est, nocet, seu molle, seu durum est.  
 proprie quedam ad eum pertinent, qui ambulando fatigatur. Hunc  
 reficit in ipso quoq; itinere frequens frictio: post iter, primum sedile,  
 deinde unctio: tum calida aqua in balneo magis superiores partes, q̃  
 inferiores foueat. si quis uero exustus in sole est, huic in balneum pro  
 tinus eundem est: perfundendumq; oleo corpus, et caput. deinde in  
 solium bene calidum descendendum est. tum multa aqua per caput in  
 fundenda prius calida, deinde frigida. At ei qui perfruxit, opus est in  
 balneo primi inuoluto sedere, donec insudet: tum ungi, deinde lau  
 ri. cibum modicum, deinde potiones meras assumere. Is uero qui na  
 uigauit, et nausea pressus est, si multam bilem euomit, uel abstinere  
 cibo debet: uel paulum aliquid assumere. Si pituitam acidam effu  
 dit, utiq; sumere cibum: sed assueto leniorem. Si sine uomitu nausea

*Stomachum  
 ante opus  
 refrigeratio  
 refrigerant  
 calefacere*

fuit, uel abstinere, uel post aliu uomere. Qui uero toto die, uel in uchi-  
 culo, uel in spectaculo sedet, huic nihil currendum, sed lente ambulan-  
 dum est. Lenta quoq; in balneo mora, dein cena exigua prodisse con-  
 suenerunt. Si quis in balneo astat, reficit nunc ore exceptum, & in  
 eo retentum acetum. si id non est, eodem modo frigida aqua assump-  
 ta. Ante omnia autem norit quisq; naturā sui corporis: quoniam alij  
 graues, alij obesi sunt. alij calidi, alij frigidiores. alij humidi, alij sic-  
 ci. alios astricta, alios resoluta aluus exercet. raro quisquam non ali-  
 quam partem corporis imbecillam habet. Tenuis uero homo imple-  
 re se debet: plenus extenuare: calidus refrigerare: frigidus caleface-  
 re: madens siccare: siatus madefacere. itemq; aluum firmare is, cui  
 fusa soluere uis, cui astricta est. Succurrendumq; semper parti maxi-  
 me laboranti est. Implet autem corpus modica exeratio, frequen-  
 tior quies, unctio. & si post prandium est balneum, contracta aluus,  
 modicum frigus hyeme, somnus & plenus, & non nimis longus.  
 molle cubile, animi securitas, assumpta per cibos, & potior maxime  
 dulcia & pingua cibus & frequentior, & quantus plenissimus po-  
 test concoqui. extenuat corpus aqua calida, si quis in eam descendit,  
 magisq; si salsa est. in ieiunio balneū, inurēs sol, et omnis calor, cura,  
 uigilia, somnus nimium uel breuis, uel longus lectus per astatem ter-  
 ra, hyeme durum cubile. cursus, multa ambulatio, omnisq; uehemens  
 exeratio, uomitus, deiectio, acida res et austera, & semel die assump-  
 ta epula, & uini non perfrigidi, ieiunio potio in consuetudinem ad-  
 ducta. Cum uero inter extenuantia posuerim uomitum, & deiectio-  
 nem, de his quoq; proprie quaedam dicenda sunt. Eiectum esse ab  
 Asclepiade uomitum in eo uolumine, quod de tuenda sanitate com-  
 posuit, uideo. neq; reprehendo, si offensus eorum est consuetudine, qui  
 cotidie eiicendo uorandi facultatem moluntur. paulo etiam longius  
 processit, idem purgationes quoq; eodem uolumine expulit. & sunt  
 hæc perniciose, si nimis ualentius medicamentis fiunt. Sed hæc tamen  
 salutanda esse, non est perpetuum. quia corporum, temporumq; ra-  
 tio potest ea facere necessaria, dū & modo, & non nisi cum cūsus est,  
 adhibeantur. Ergo ille queq; se, si quid iam corruptum esset, expelli  
 debere confessus est. Ita non ex titores condemnanda est. sed esse eius  
 etiam plures causæ possunt. siq; in ea quaedam paulo subtilior elser-  
 uatio adhibenda. Vomitus utilior est hyeme, quam aestate. Nam tum  
 & pituita plus, & capitis grauitas maior subest. inutilis est grad-  
 libus, & imbecillum stomachum halentibus. utilis est plenus & bi-  
 liosis omnibus, si uel nimium se repleant: uel parum contulerint.  
 nam siue plus est, quam quod concoqui possit, periclitari ne corrup-

plenus  
 corpus  
 exeratio  
 modica  
 et corpus  
 extenuantia  
 uomitus  
 deiectio  
 paulo  
 etiam longius  
 processit  
 sunt  
 salutanda  
 esse  
 non est  
 perpetuum  
 quia  
 corporum  
 temporumq;  
 ratio  
 potest  
 ea  
 facere  
 necessaria  
 dum  
 et  
 modo  
 et  
 non  
 nisi  
 cum  
 cūsus  
 est  
 adhibeantur  
 Ergo  
 ille  
 queq;  
 se  
 si  
 quid  
 iam  
 corruptum  
 esset  
 expelli  
 debere  
 confessus  
 est  
 Ita  
 non  
 ex  
 titores  
 condemnanda  
 est  
 sed  
 esse  
 eius  
 etiam  
 plures  
 causæ  
 possunt  
 siq;  
 in  
 ea  
 quaedam  
 paulo  
 subtilior  
 elser  
 uatio  
 adhibenda  
 Vomitus  
 utilior  
 est  
 hyeme  
 quam  
 aestate  
 Nam  
 tum  
 &  
 pituita  
 plus  
 &  
 capitis  
 grauitas  
 maior  
 subest  
 inutilis  
 est  
 grad-  
 libus  
 &  
 imbecillum  
 stomachum  
 halentibus  
 utilis  
 est  
 plenus  
 &  
 bi-  
 liosis  
 omnibus  
 si  
 uel  
 nimium  
 se  
 repleant  
 uel  
 parum  
 contulerint  
 nam  
 siue  
 plus  
 est  
 quam  
 quod  
 concoqui  
 possit  
 periclitari  
 ne  
 corrup-



patur, non oportet. Si uero corruptum est, nihil commodius est, quam id, qua uia primum expelli potest, eijcere. Itaq; ubi amari ructus cū dolore, & grauitate præcordiorum sunt, ad hunc protinus confugendum est. Itē prodest ei, cui pectus aestuat, & frequens salina uel nausea est: aut cui sonant aures: aut madent oculi: aut os amarum est. Similiterq; ei, qui uel coelum, uel locum mutat: huiusq; quibus, si per plures dies non uomuerunt, dolor præcordia infestat. Neq; ignoro inter hæc præcipi quietem. quæ non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus: nec in omnibus idem facit. Itaq; istud luxuriæ causa fieri non oportere confiteor. interdum ualitudinis causa recte fieri experimentis credo. Commoneo tamen ne quis, qui ualere et senescere uolet, hoc cotidianum habeat. Qui uomere post cibum uolet, si ex facili facit, aquam tantum tepidam ante debet assumere. si difficilius, aqua, uel salis, uel mellis paulum adijcere. At qui mane uomiturus est, ante bibere mulsam, uel hyssopum, aut esse radicula debet. deinde aquam tepidam, ut supra scriptum est, bibere. Cætera quæ antiqui medici præceperunt, stomachum omnia infestant. Post uomitum, si stomachus infirmus est, paulum cibi sed huius idonei, gustandum: et aquæ frigide cyathi tres bibendi sunt. Si autem uomitus fauces exasperauit, q̄ uomuit, si mane id fecit, ambulare debet: tum unḡ, deinde cœnare. si post cœnam, postero die lauari: & in balneo sudare: hinc proximus abus, medio: rus utilior est: usq; esse debet cum pane hesterno, uino austero meraco, & carne assa, abisq; omnibus quam siccissimis. Qui uomere bis in mense uult, melius consulet, si biduo continuarit, quam si post quintum decimum diem uomuerit: nisi hæc mora grauitatem pectori faciat. deiectio autem medicamen-to quoq; petenda est, ubi uenter suppressus parum reddit. ex eoq; inflammationes, caligines, capitis dolores, aliaq; superioris partis mala incrementum. Quid enim inter hæc adiungere possunt quies, & inedia quæ per illas maxime eueniunt? Qui eijcere uolet, primum cibis, uinisq; utetur his, quæ hoc præstant. dehinc si parum illa proficiant, aloen sumat. Sed purgationes quoq; ut interdum necessarie sunt, sic ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescat. n. non ali corpus: & ob hoc infirmum erit, cum omnibus morbis obnoxia maxime infirmitas sit. Calefacit autem unctio, aqua salsa, magniq; si acida est. omnia salsa, amara, carnosâ. si post cibum est balneum, uinum austerrum. Refrigerat in ieiunio & balneum, & somnus nisi nimis longus est: & omnia acida, aqua q̄ frigidissima, oleum si aquæ miscetur. Humidū autem corpus efficit labor maior q̄ ex consuetudine, frequens balneum, abus plenior, multa potio, post hac ambulatio

Scientis q  
uenerunt

Purgatione  
frequentis  
periculosæ

Humidum  
corpus qu  
efficiant



Et uigilia. Per se quoque ambulatio multa, et uehemens, et matutina  
 exercitatio, et non protinus cibis adiectus, ea genera escae quae ue-  
 niunt ex locis frigidis, et pluuijs, et irriguis. Contra fiat modica  
 exercitatio, fames, unctio sine aqua, calor, sol modicus, frigida aqua, ci-  
 bus exercitationi statim subiectus, et is ipse ex siccis, et aestuosis locis  
 ueniens. Alium astringit labor, sedile, creta singularis corpori illita, ci-  
 bus imminutus, et is ipse semel die assumptus ab eo, qui bis solet. exi-  
 gua potio, neque adhibita nisi cum cibi quis quantum assumpturus est, ce-  
 pit. post cibum quies. Contra soluit aucta ambulatio, atque esca post mo-  
 tus, qui post cibum est. subinde potiones cibo immixtae. Illud quoque scire  
 oportet, quod uentre uomitus solutum comprimit: compressum soluit.  
 Itemque comprimit is uomitus, qui statim post cibum est: soluit is qui tar-  
 de superuenit. Quod ad aetates uero pertinet, in ediam facillime susti-  
 nent mediae aetates: minus iuuenes: minime pueri, et senectute conse-  
 cti. quod minus fert facile quisque, eo saepius debet cibum assumere: ma-  
 ximeque eo eget, qui increscit. Calida lauatio et pueris, et senibus  
 apta est. Vinum dilutius pueris, senibus meracius. neutri aetati quae  
 inflationes mouent. Iuuenum minus quae assumant, et quomodo cu-  
 rentur, interest. quibus iuuenibus fluxit aluus, plerumque in senectute  
 contrahitur. Quibus in adolescentia fuit astricta, saepe in senectute  
 soluitur. Melior est autem in iuvene fusior: in sene astrictior. Tempus  
 quoque anni considerare oportet. hyeme plus esse conuenit. minus, sed  
 meracius bilere. multo pane uti. carne potius elixa. modice oleribus. se-  
 mel die cibum capere: nisi si nimis uenter astrictus est. si prandet ali-  
 quis, utilius est exiguum aliquid, et ipsum siccum sine carne, sine po-  
 tione sumere. Eo tempore anni calidis omnibus potius utendum est,  
 uel calorem mouentibus. Venus tum non aequae perniciosa est. At uere  
 paulum cibo demendum, adiiciendumque potioni: sed dilutius tamen bi-  
 bendum est. magis carne utendum. magis oleribus. transeundum pau-  
 latim ad assa ab elixis. Venus eo tempore anni tutissima est. Aestate  
 uero et potione, et cibo corpus saepius eget. ideo prandere quoque con-  
 modum est. Eo tempore aptissima sunt et caro, et olus. potio quamdi-  
 lutissima, ut et sitim tollat: nec corpus incēdat. Frigida lauatio, caro  
 assa, frigidi cibi, uel qui refrigerent. ut saepius autem cibo utendum,  
 sic exiguo est. Per autumnum propter caeli uarietatem periculum ma-  
 ximum est. Itaque neque sine ueste, neque sine calciamentis prodire oportet,  
 praecipueque diebus frigidioribus. neque sub diuino nocte dormire: aut  
 certe bene operiri. Cibo uero iam paulo pleniore uti licet. minus, sed  
 meracius bibere. Poma nocere quidam putant, quae immodice toto die  
 plerumque sic assumuntur, ne quid ex densiore cibo remittatur. Ita non  
 haec, sed

hæc, sed consumatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamē minusq̃ in his noxæ est. Sed his uti non sæpius quàm alio cibo conuenit. Deniq; aliquid densiori cibo, cum id accedit, necessarium est demi. Neq; æstate uero, neq; autumno utilis uenus est: tolerabilior tamen per autunnum: æstate uero & toto (si fieri potest) abstinentum.

De his, qui aliqua parte corporis laborant: et primum de his, quibus caput infirmum est. Caput. iij.

**P**roximū est ut de his dicā, qui partem aliquas corporis imbecillas habent, cui caput infirmum est: is si bene concoxerit, leniter perfricare id mane manibus suis debet. nūquam id, si fieri potest, ueste uelare: aut ad cutem tonderi. Vtileq; lunam uitare, maximeq; ante ipsum lunæ, solusq; concursus. sed nusquam post cibum progredi. si cui capilli sunt, eos cotidie pectere: multum ambulare. sed si licet, neq; sub tecto, neq; in sole. Vbiq; autem uitare solis ardorem, maximeq; post cibum, & uinum. potius ungi, q̃ lauari. nunq̃ ad flammam ungi: interdum ad prunam. Si in balneum uenit: sub ueste primum paulum in tepidario insudare: ibi ungi: tum trāsire in calidarium: ubi sudabit, in solium non descendere: sed multa calida aqua per caput se totū perfundere: tum tepida uti, dein frigida: diutiusq; ea caput, quàm cæteras partes perfundere: deinde id aliquādiu perfricare: nouissime detergere, & ungere. Capiti nihil æque prodest atq; aqua frigida. Itaq; is, cui hoc infirmum est, per æstatem id bene largo canali cotidie debet aliquandiu subijcere. Semper autem etiam si sine balneo unctus est, neq; totum corpus refrigerare sustinet: caput tamen aqua frigida perfundere. sed cum cæteras partes attingi nolit: dimittere id ne ad cervices aqua descendat: eamq; ne quid oculis, alijs uel partibus noceat, defluentem subinde manibus ad os regere. huic modicus cibus necessarius est, quem facile concoquat. isq; si ieiunio caput læditur, assumendus etiam medio die est. si non læditur, semel potius. Bibere huic assidue uinum dilutum, leue, quàm aquam magis expedit: ut cum caput grauius esse coeperit, sit quò confugiat: eiq; ex toto neq; uinum, neq; aqua semper utilia sunt. medicamentum utrumq; est, cum inuicem assumitur. Scribere, legere, uoce contendere, huic opus non est utiq; post coenam: post quam ne cogitatio quidem ei satis tuta est: maxime tamen uomitus alienus est.

Aurelij Cor.

6

n Eq; uero his solus, quos capitis imbecillitas torquet, usus  
 aquae frigidae prodest: sed his etiā, quos assidue lip=  
 pitudines, grauedines, desillationes, tonsillaeq; male  
 habent. his autem non caput tantum cotidie persun=  
 dendum est: sed os quoq; multa frigida aqua fuen=  
 dum est. praecipueq; omnibus, quibus hoc utile auxilium est: eo uten=  
 dum est, ubi grauius coelum Austri reddiderunt. cumq; omnibus  
 inutilis sit post cibum aut contentio, aut cogitatio animi: tum his praeci=  
 pue, qui uel capitis, uel arteriae dolores habere consuerunt, uel quosli=  
 bet alios oris affectus. Vitari etiā grauedines, desillationesq; possunt:  
 si quamminime eum, qui his opportunus est, aerem, uel loca, aquasq;  
 mutet. si caput in sole protegit, ne incendatur: ne uel subitum ex repen=  
 tino nubilo frigus id moueat. si post concoctionem ieiunus caput ra=  
 dit. si post cibum neq; legit, neq; scribit.

## Ad solutam aluum remedia.

## Caput VI.

q Vem uero frequenter citata aluus exerceat, huic opus  
 est pila, similibusq; superiores partes exercere: dum  
 ieiunus est, ambulare: uitare solis nimium ardorem,  
 continua balnea, ungi citra sudorem: non uti cibis ua=  
 rijs, minimeq; iurulentis, aut leguminibus, oleribus ue  
 his, quae celeriter descendunt: omnia deniq; fugere, quae tarde concoquun=  
 tur. Venatio, duriq; pisces, & ex domesticis animalibus assa caro ma=  
 xime inuuant. Nunquam uinum salsum bibere expedit: ne tenue qui=  
 dem, aut dulce, sed austerum, & plenius, neq; id ipsum perueniet. Si  
 mulso uti uolet, id ex decocto melle faciendum est. Si frigidae portiones  
 uentrem eius non turbant, his utendum potissimum est. Si quid offen=  
 sae in coena sensit, uomere debet: idq; postero quoq; die facere. tertio  
 modici ponderis panem ex uino esse, adiecta uina, uel olea, uel ex  
 defruto, similibusq; alijs: deinde ad consuetudinem redire. Semper au=  
 tem post cibum conuiescere: ac neq; intendere animum: neq; ambu=  
 latione quamuis leui dimoueri.

## Remedia ad coli dolorem. Caput VII.

a T si laxius intestinum dolere consuevit, quod κωλον  
 nominant: cum id nihil nisi genus inflationis sit:  
 id agendum est, ut concoquat aliquis, ut lectione et alijs ge=  
 neribus exerceatur: utatur balneo calido: cibis quoq;  
 & potionibus calidis: deniq; omnimodo frigus euitet.  
 item dulcia omnia, leguminaq; & quicquid inflare consuevit.



Quæ agenda sint stomacho laborantibus.

Caput octauum.

I quis uero stomacho laborat, legere clare debet: post lectionem ambulare, tum pila, uel armis, alio'ue quo genere, quo superior pars mouetur, exerceri. Non aquam, sed uinum calidum bibere ieiunus. Tum cibum bis die assumere: sic tamen ut facile cōcoquat. Vti uino tenui, & austero: & post cibum frigidis potionibus potius. Stomachum autem infirmum indicant pallor, macies, præcordiorum dolor, nausea, & uolentium uomitus. in ieiunio dolor capitis: quæ in quo non sunt, is firmi stomachi est. Neq; credendum utiq; nostris est: qui cum in aduersa ualetudine uinum, aut frigidam aquam concupierunt, deliciarum patrocinium in accusationem non merentis stomachi habent. At qui tarde concoquunt, & quorum ideo præcordia instantur, quæ propter ardorem aliquem noctu sitire consuerunt, antequam conquiescant, duos tres'ue cyathos per tenuem fistulā bibant: Prodest et aduersus tardam concoctionem clare legere: deinde ambulare: tum uel ungi, uel lauari assidue: uinum frigidū bibere: et post cibum magnam potionem, sed, ut supra dixi, per syphonem. deinde omnes potiones aqua frigida includere. Cui uero cibus accrescit, is ante eum bibere aqua egelidam debet, et uomere. At his, cui ex hoc frequēs deiectio incidit, quotiens aluus ei constiterit, frigida potione potissimū utatur.

Quid obseruandū sit dolore nervorū laborantibus. Caput nonum.

I cui uero dolere nervi solent, quod in podagra, chiroagra uel esse consuevit, huic quantū fieri potest, exercendum id est quod affectum est: obijciendumq; labori, & frigori, nisi cum dolor increuit. Sub diuino quies optima est. Venus semper inimica est. Concoctio, sicuti in omnibus corporis affectibus, necessaria est. Cruditas enī id maxime lædit: & quotiens offensum corpus est, uiciosa pars maxime sentit. Ut concoctio autem omnibus uitij occurrat: sic rursus alijs frigus, alijs calor. Quæ sequi quisq; pro habitu corporis sui debet. Frigus inimicū est seni, tenui, uulneri, præcordijs, intestinis, uescicæ, auribus, coxis, scapulis, naturalibus, ossibus, dentibus, nervus, uulnæ, cerebro. Idē summam cutem facit pallidam, aridam, durā, nigram. ex hoc horrores, tremoresq; nascuntur. At prodest iuuenibus, & omnibus plenis. et etiorq; mens est, & melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed attenuetur. A qua uero frigida infusa præter quam capiti, etiam stomacho

prodest. Item articulis, doloribusq; qui sunt sine ulceribus. item rubicundis nimis hominibus, si dolore uacant. Calor aut adiuuat omnia, quæ frigus infestat. ite lippietes: si nec dolor, nec lachrymæ sunt. Neros quoq; q contrahuntur, præcipueq; ea ulcera, quæ ex frigore sunt. Idem corporis colorem bonum facit: urinam mouet. si nimius est, corpus effœminat: nervos emollit: stomachum soluit. Minime uero aut frigus, aut calor tuta sunt: ubi subita insuetis sunt. Nam frigus lateris dolores, aliq; uitia, frigida aqua strumas excitat. Calor cōcoctionem prohibet: somnum aufert: sudorem digerit: obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit.

### Observatio in pestilentia. caput. x.

St etiā observatio necessaria, quæ quis in pestilentia utatur adhuc integer: cum in securus esse non possit. Tum igitur oportet peregrinari: nauigare. Vbi id nō licet, gestari: ambulare sub diuo ante æstum leniter: eodemq; modo ungi: Et ut supra cōprehensum est, uitare fætigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem: multoq; magis se continere, si qua grauitas in corpore est. Tū neq; mane surgendum, neq; pedibus nudis ambulandum est. minimeq; post cibum aut balneum. neq; ieiuno, neq; cœnato uomendum est. neq; mouenda aliuis: atq; etiam si per se mota est, cōprimenda est. Abstnendum potius si plenius corpus est. Itemq; uitandum balneum, sudor, meridianus somnus utiq; , si cibus quoq; antecessit: qui tamen semel die tunc commodius assumitur: insuper etiā modicus, ne cruditatem moueat. Alternis diebus inuicem modo aqua, modo uinum bibendum est. quibus seruatis, ex reliqua uictus cōsuetudine quàm minimum mutari debet. Cum uero hæc in omni pestilentia facienda sint: tum in ea maxime, quam Austri excitariunt. Atq; etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt, ubi graui tempore anni discesserunt ex suis sedibus: uel ubi in graues regiones uenerunt. Ac si cætera res aliqua prohibebit: utiq; abstnere debebit. Atq; ita à uino ad aquam, ab hac ad uinum eo, qui supra positus est modo, transitus ei esse.

i

Nstantis autem aduersæ ualitudinis signa complura sunt: in quibus explicandis non dubitabo authoritate antiquorum uirorum uti, maximeq; Hippocratis: cum recentiores quoq; medici, quamuis quædam in curationibus mutarint: tamen hæc illum optime præfagisse fateantur.

Sed antequam dico quibus præcedentibus morborum timor subsit: non alienum uidetur exponere, quæ tempora anni, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora maxime tuta, uel periculis opportuna sint: quod genus aduersæ ualitudinis in quoq; timeri maxime possit. Non quo non omni tempore, in omni tempestatum genere, omnis ætatis, omnis habitus hominum per omnia genera morborum & ægrotent, & moriantur: sed quod frequentius, tamen quædam eueniant. Ideoq; utile est scire unūquenq; quid, & quando maxime caueat.

Quæ anni tempora, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora uel tuta, uel morbis oportuna sunt: & quod ualitudinis genus in quoq; timeri possit. Caput. I.

i

Citur saluberrimum uer est: proxima deinde ab hoc hyems: periculosior æstas. autumnus longe periculosissimus. Ex tempestatibus uero optimæ æquales sunt, siue frigidæ, siue calidæ: pessimæ, quæ uariant maxime. quo fit ut autumnus plurimos opprimat.

am ferè meridianis temporibus calor: nocturnis atq; matutinis, simulq; etiam uestertinis frigus est. Corpus ergo & æstate, & subinde meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur. Sed ut eo tempore id maxime fit: sic quodcumq; euenit, noxium est. Vbi æqualitas aut est: tamen saluberrimi sunt sereni dies: meliores pluuij, quam tantum nebulosi, aut nubili: optimiq; hyeme, q̄ omni uento uacant: æstate, quibus Favonij perflant. Si genus aliud uentorū est, salubriores septentrionales, q̄ subsolani, uel austri sunt. sic tamē ut hæc interdum regionum sorte mutantur. Nam ferè uentus ubiq; à mediterraneis regionibus ueniens salubris, à mari grauis est. Neq; solū in bono tempestatum habitu certior ualitudo est: sed priores morbi quoq; si qui inciderunt, leniores sunt: & promptius finiuntur. Pessimum ergo cælū est, q̄ ægrum fecit: adeo ut in id quoq; genus, quod natura peius est in

Aurelij Cor.

b iij



hoc statu, salubris mutatio sit. At ætas media tutissima est: quæ neq;  
 iuuentæ calore, neq; senectutis frigore infestatur. Longus morbis se=  
 nectus, acutis adolescentia magis patet. Corpus autem habilissimum  
 quadratum est, neq; gracile, neq; obesum. Nam longa statura ut in iu=  
 uenta decora est: sic matura senectute conficitur. gracile corpus,  
 infirmum, obesum, hebes est. Vere tamen maxime quæcunq; humoris  
 motu nouantur, in metu esse consuerunt. ergo tum lippitudines, pustu=  
 læ, profusio sanguinis, abscessus corporis, quæ ἀποσμήματα græci nomi=  
 nant: bilis atra, quam μίλαν χολήν appellant: insania, morbus comi=  
 tialis, angina, grauedines, desillationes oriri solent. hi quoq; morbi, q;  
 in articulis, neruisq; modo urgent, modo quiescunt: tum maxime &  
 inchoantur, & repetunt. At æstas non quidem uacat plerisq; ab his  
 morbis: sed adiçat febres, uel continuas, uel ardentes, uel tertianas, uo=  
 mitus, alui deiectiones, auricularum dolores, ulcera oris, cancri, et in  
 cæteris quidem partibus, sed maxime obscenis: & quicquid sudore  
 hominem resoluit. uix quicquam ex his in autumnum non incidit:  
 sed oriuntur eo quoq; tempore febres incertæ: lienis dolor, aqua in=  
 ter cutem, tabes, quam græci ποίσιον nominant: urinae difficultas, quam  
 σπασμὸν πύων appellant: tenuioris intestini morbus, quem ἰλεὸν nomi=  
 nant. Fit item lenitas intestinorum, quæ λενιτερία uocatur: coxæ dolo=  
 res: morbi comitiales. Idemq; tempus, & diutinis malis fatigatos, &  
 ab æstate tantum proxima pressos interimit: & alijs nouis morbis  
 conficit: & quosdam longissimis implicat, maximèq; quartanis: quæ  
 per hyemem quoq; exerçant. Neq; aliud magis tempus pestilentia  
 patet: cuiuscunq; ea generis est, quantum uarijs rationibus nocet. Hyems  
 autem capitis dolores, tussim, & quicquid in faucibus, in lateribus, in  
 uisceribus mali contrahitur, irritat. Ex tempestatibus Aquilo tussim  
 mouet: fauces exasperat: uentrem astringit: urinam suppressit: hor=  
 rores excitat: item dolores lateris, & pectoris. Sanum tamen corpus  
 spissat, & mobilius, atq; expeditius reddit. Auster aures hebetat: sen=  
 sus tardat: capitis dolores mouet: aluum soluit: totum corpus efficit he=  
 bes, humidum, languidum. Cæteri uenti quo uel huic, uel illi propio=  
 res sunt: eo magis uicinos his, illis uel affectus faciunt. Deniq; omnis ca=  
 lor, & iecur, & lienem inflammat: mentem hebetat: ut anima defi=  
 ciat, ut sanguis prorumpat, efficit. Frigus, modo neruorum dissentio=  
 nem, modo rigorem infert. Illud σπασμὸς, hoc τίταρος græce nomi=  
 natur: nigritiem in ulceribus, horrorem in febribus excitat. In siccita=  
 tibus acutæ febres, lippitudines, tormina, urinae difficultas, articulo=  
 rum dolores oriuntur. Per imbres longæ febres, alui deiectiones,  
 angina, cancri, morbi comitiales, resolutio neruorum, quam παραλυ=

etiv græci nominant. Neq; solum interest quales dies sint: sed etiam  
 quales ante præcesserint. Si hyems sicut septentrionales uentos ha-  
 buit, uer autem austros, et pluias exhibet: fere subeunt lippitudi-  
 nes, tormina, febres, maximeq; in mollioribus corporibus: ideoq;  
 præcipue in mulieribus. Si uero Austri, pluiæq; hyemem occupa-  
 runt: uer autem frigidum, et siccum est: grauidæ quidem fœmi-  
 næ, quibus tum adest partus, abortu periculantur. hæ uero quæ  
 gignunt, imbecillos, uixq; uitales edunt. cæteros lippitudo arida,  
 et si seniores sunt, grauedines, atq; destillationes male habent. At  
 si à prima hyeme Austri ad ultimum uer continuauerunt: laterum do-  
 lores, et insania febricitantium, quam *περιτις* appellant, quam ce-  
 lerrime rapiunt. Vbi primo calor à primo uere orsus, æstatem quoq;  
 similem exhibet, necesse est multum sudorem in febribus subsequi. At  
 si sicut æstas Aquilones habuit: autumnus uero imbres, Austriq; sunt:  
 tota hyeme, quæ proxima est, tussis, destillatio, raucatas, in quibus-  
 dam etiam tabes oriuntur. Sin autem autumnus quoq; æq; sicut  
 hisdem Aquilonibus perflatur: omnibus quidem mollioribus corpo-  
 ribus, inter quæ muliebria esse proposui: secunda ualetudo contin-  
 git. durioribus uero instare possunt et arida lippitudines, et fe-  
 bres partim acutæ, partim longæ, et hi morbi: qui ex atra bile na-  
 scuntur. Quod ad ætates uero pertinet: pueri, proximiq; his, uere op-  
 time ualent: et æstate prima tutissimi sunt. Senes æstate, et autumnus  
 prima parte: iuuenes hyeme: quicq; inter iuuetam, senectutemq; sunt.  
 inimicior senibus hyems: æstas adolescentibus est. Tum si qua imbe-  
 cillitas oritur, proximum est ut infantes, tenerosq; adhuc pueros ser-  
 pentia ulcera oris, quæ *αῖσθας* græci nominant, uomitus, nocturnæ uir-  
 giliæ, aurium humor, circa umbilicum inflammationes exerçant.  
 Propria etiam dentientium, gingivarumq; exulcerationes, distintio-  
 nes neuorum, febriculæ interdum, alui deiectiones, maxillæq; caninis  
 dentibus orientibus male habent. quæ pericula plenissimi cuiusq; sunt:  
 et cui maxime uenter astrictus est. At ubi ætas paulum proæssit:  
 glandulæ, et uertebrearum, quæ in spina sunt: aliquæ inclinationes,  
 struma, uerrucarum quedam genera dolentia, (*ἀποχρόσας* græ-  
 ci appellant) et plura alia tubercula oriuntur. Incipiente uero iam  
 pube ex hisdem multæ, et longæ febres: sanguinis ex naribus cur-  
 sus. maximeq; omnis pueritia primum circa quadragesimum diem,  
 deinde septimo mense, tum septimo anno, postea circa pubertatem  
 periculatur. Si qua etiam genera morborum in infantem incide-  
 runt: ac neq; pubertate, neque primis coitibus, neq; in fœmina pri-

mis menstruis finita sunt: ferè longa sunt. Sæpius tamen morbi pueriles, q̃ diutius manserunt: terminantur. Adolescentia morbis acutis, itē comitialibus, tabiq; maxime obiecta est: ferèq; iuvenes sunt, qui sanguinem expiunt. Post hanc ætatem laterum, & pulmonis dolores, leithargus, cholera, insania, sanguinis per quædam etiam uelut ora uenarum (αἱμορροΐδας græci appellant) profusio. In senectute spiritus, & urinae difficultas: grauedo articularum, & renum dolores: neruorum resolutiones: malus corporis habitus (ναρξία græci appellant): nocturnæ uigiliæ: uitia longiora aurium, oculorum, etiam narium, præcipuq; soluta aliis: et quæ sequuntur hæc tormina: uel leuitas intestinorum, cæteraq; fusi uetris mala. Præter hæc graciles: tabes, deiectiones, destillationes, item uiscerū, & laterum dolores fatigant. Obesi plerunq; acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur: subitoq; sæpe moriuntur. quod in corpore tenuiore uix euenit.

De notis aduersæ uoletudinis futuræ. Caput. II.

Nte aduersam autem uoletudinē, ut supra dixi, quædam notæ oriuntur, quarū omnium commune est, aliter se corpus habere, atq; consueuit: neq; in peius tantum, sed etiam in melius. Ergo si plenior aliquis, & speciosior, & coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet. quæ quia neq; in eodem habitu subsistere, neq; ultra progredi possunt: ferè retro quasi ruina quadam reuoluuntur. Peius tamen signum est ubi aliquis contra consuetudinem emacruit, & colorem, decoremq; amisit. quoniam in his quæ superant, est quod morbus demat: in his quæ desunt, non est quod ipsum morbum ferat. Præter hæc protinus timeri debet, si grauiora membra sunt: si crebra ulcera oriuntur: si corpus supra consuetudinem incaluit: si grauior somnus preffit: si tumultuosa somnia fuerunt: si sæpius expergitur aliquis q̃ assueuit: deinde iterū soporatur. si corpus dormientis circa partem aliquam contra consuetudinē insudat: maximeq; circa pectus, aut ceruices, aut crura, uel genua, uel coxas. Itē si marcet animus: si loqui, & moueri piget. si corpus torpet: si dolor præcordiorū est, aut totius pectoris: aut qui in plurimis euenit capitis: si saliuæ plenum est os: si oculi cum dolore uertuntur: si tēpora astricta sunt: si membra inhorrescunt: si spiritus grauior est: si circa frontem intentæ uenæ mouentur: si frequentes oscitationes: si genua quasi fatigata sunt: totum uel corpus lassitudinē sentit. Ex quibus sæpe plura, nunq̃ non aliqua fe=



brem antecedunt. In primis tamen illud considerandū est, nunquid sæpius horum aliquid eueniat: ac ideo neq; corporis ulla difficultas subsequatur. Sunt enim quædam proprietates hominum, sine quarū notitia non facile quicquam in futurum præagiri potest: Facile itaq; securus est in his aliquis, quæ sæpe sine piculo euasit. Ille sollicitari debet, cui hæc noua sunt: aut q̄ ista nunq̄ sine custodia sui, tuta habuit.

Quæ bona in ægotantibus signa sint. Caput III.

Bi uero febris aliquem occupat: scire licet non periclitari, si in latus, aut dextrum, aut sinistrum, ut ipsi uisum est, cubat: cruribus paulū reductis: qui ferè sani quoq; iacentis habitus est: si facile conuertitur: si nocte dormit: si interdum uigilat: si ex facili spirat: si nō cōfluctatur: si circa umbilicum, & pubem cutis plana est: si præcordia eius sine ullo sensu doloris æqualiter mollia in utraq; pte sunt. quod si paulo humidiora sunt: sed tamen digitis cedunt, & nō dolent: hæc ualetudo, ut spacium aliquod habebit: sic tuta erit. Corpus quoq; quod æqualiter molle, & calidum est: quodq; æqualiter totum insudat: & cuius febricula eo sudore finitur: securitatem pollicetur: quando iam ad sanitatem uenit corpus. Sternutamentum etiā inter bona indicia est. Et cupiditas cibi uel à primo seruata, uel etiam post fastidium orta: neq; terrere debet ea febris, quæ eodem die finita est: ac ne ea quidē, quæ quamuis longiore tempore euauuit: tamen ante alterā accessio- nem ex toto quieuit sic, ut & corpus integrum, quod ei in priuē græci uocant, fieret. Si quis aut̄ incidit uomitus, mixtus esse et bile, & pituita debet: & in urina subsidere album: leue, æquale sic, ut etiam si quæ quasi nubeculæ innatarint: in inum deferantur. At uenter ei qui à periculo tutus est, reddit modo mollia figurata eodē ferè tempore, quo secunda ualetudine assueuit: modo conuenientia his quæ assumuntur. peior cita alius est. Sed ne hæc quidem terrere protinus debet: si matutinis temporibus coacta magis est: aut si procedente tempore paulatim contrahitur, & ruffa est: neq; foeditate odoris similem aluum sani hominis excedit. Ac lumbricos quoq; aliquos sub fine morbi descendisse nihil nocet. Si inflammatio in superioribus partibus dolorē, tumoremq; fecit, bonum signum est. sonus uentris inde ad inferiores partes euolutus, magisq; etiam si sine difficultate cum stercore excessit.

Contra grauis morbi periculum est: ubi supinus aeger  
 iacet porrectis manibus, & cruribus. ubi residere  
 c. uult in ipso acuti morbi impetu, præcipueq; pulmo  
 nibus laborantibus. ubi nocturna uigilia premitur:  
 etiam si interdiu somnus accedit. Ex quo tamen peior  
 est, qui inter quartam horam, & noctem: q̄ qui matutino tempore ad  
 quartam. Pessimum tamen est si somnus neq; noctu, neq; interdiu acce-  
 dit. id enim ferè sine continuo dolore esse non potest. Aeq; uero signū  
 malum est etiam somno ultra debitum urgeri: peiusq; quo magis se  
 sopor interdiu, noctuq; continuat. Mali etiam morbi testimonium est  
 uehementer, & crebro spirare: à sexto die cœpisse inhorrescere: plus  
 expuere: uix excreare: dolorē habere continuū: difficulter ferre mor-  
 bum: iactare brachia, & crura: sine uoluntate lachrymare: habere  
 humorem glutinosum dentibus inhaerentem: cutē circa umbilicum, et  
 pubem macram: præcordia inflammata, dolentia, dura, tumida, inten-  
 ta: magisq; si hæc dextra parte, q̄ sinistra sunt: periculosissimum ta-  
 men est: si uenæ quoq; ibi uehementer agitantur. Mali ē morbi signū  
 est, uimus celeriter emacrescere: caput, et pedes, manusq; calidas habe-  
 re: uentre, & lateribus frigentibus, aut frigidis extremas partes ac-  
 to morbo urgente: aut post sudorem inhorrescere: aut post uomitū sin-  
 gultum esse: uel rubere oculos: aut post cupiditatē cibi, post ue longas fe-  
 bres hūc fistidire: aut multū sudare, maximeq; frigido sudore: aut ha-  
 bere sudores non per totum corpus æquales, quiq; febrem non fini-  
 ant: & eas febres, quæ cotidie tempore eodē reuertantur: quæ ue sem-  
 per pares accessiones habeant: neq; tertio quoq; die leuentur, quæ ue  
 continent, ut per accessiones incrementum: per dissensiones tantum mol-  
 liantur: nec unquam integrum corpus dimittant. Pessimum est si ne le-  
 uatur quidem febris: sed æque concitata continuat. Periculosum est  
 etiam post arquantum morbū febrem oriri, utiq; si præcordia dextra  
 parte dura manserunt: ac dolentibus his leua. Nulla acuta febris leui-  
 ter terrere nos debet. neq; unquam in acuta febre, aut à somno non  
 est terribilis neruorum dissentio. timere ēt ex somno, mali morbi est.  
 Itemq; in prima febre protinus mentem esse turbatam: membrum ue  
 aliquid esse resolutum. ex quo casu quamuis uita redditur: tamen id  
 ferè membrum debilitatur. Vomitus etiam periculosus est sinceræ pi-  
 tuitæ uel bilis: peiorq; si uiridis, aut niger est. At mala urina est, in  
 qua subsidunt uel rubra, aut liuida, deterior, in qua quasi fila quædā  
 tenuia, atq; alba. pessima ex his, si tanq̄ ex furfuribus factas nubeculæ

*las* representat. diluta quoq; atq; alba vitiosa ē: sed in phreniticis maxime. Alius aut mala est ex toto suppressa. Periculosa etiā quæ inter febres fluens, conuiescere hominem in cubili non patitur: utiq; si quod descendit est perliquidum, aut albidum, aut pallidum, aut spumans. Præter hæc periculum ostendit id quod exærnitur, si est exiguum, glutinosum, leue, album, idemq; subpallidum: uel si est aut liuidum, aut biliosum, aut cruentum, aut peioris odoris, quàm ex consuetudine. Malum est etiam, quod post longas febres sincerum est.

De signis longæ ualitudinis. Caput. V.

Ost hæc inditia notum est longum morbum fieri. sic enim  
 p necesse est: nisi occidit. Nequella alia spes in malis magnis est: q̃ ut impetum morbi trahendo, aliquis effugiat: porrigaturq; in id tempus, quod curationi locum præstet. protinus in signa quedam sunt: ex quibus colligere possumus morbum & si non interemerit: longius in tempus habiturum. Vbi frigidus sudor inter febres non acuitur circa caput tantum, & ceruices oritur: aut ubi febre non quiescente corpus insudat: aut ubi corpus modo frigidum, modo calidum est, & color alius ex alio fit: aut ubi quod inter febres aliqua parte abscessit, ad sanitatē nō peruenit: aut ubi æger pro spacio parum emacrescit. Itē si urina modo liquida, et pura est: modo habet quedā subsidentia: si leuia, atq; alba, rubræ uel sunt, quæ in ea subsidunt: aut si quasdā quasi maculas representat: aut si bullulas excitat.

De indicijis mortis. Caput. VI.

Ed inter hæc quidem proposito metu spes tamen superest. Ad ultima uero iam uentum esse, testantur nares acutæ, collapsa tempora, oculi conuulsi, frigida, languidaq; aures, & in his partibus leniter uersæ: cutis circa frontem dura, et intenta: color aut niger, aut per pallidus: multoq; magis si ita hæc sunt: ut neq; uigilia præsserit, neq; uentris resolutio, neq; inedia. Ex quibus causis interdum hæc spes oritur: sed uno die finitur. Itaq; diutius durans, mortis index est. Si uero in morbo uetere iam triduo talis est: in propinquo mors est: magisq; si præter hæc oculi quoq; lumen refugiunt et illachrymant: quæq; in his alba esse debent, rubescunt: atq; in hisdem uenulæ pallēt: pituitaq; in his innatās nouissime angulis inhærescit: alterq; ex his minor est: nūq; aut uehementer subfederunt: aut facti tumidiore sunt.



perq; somnum palpebræ non cōmittuntur: sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet: neq; id fluens alius expressit: eademq; palpebræ pallent: & idem pallor labra, et nares decolorat. eademq; labra, & nares, oculiq; et palpebræ, et supercilia, aliquaue ex his peruertuntur: isq; propter imbecillitatem iam non audit: aut non uidet eadem: mors denuntiatur. Vbi ægri supini cubant: huiusq; genua contrahita sunt: ubi deorsum ad pedes subinde delabitur: ubi brachia, & crura nudat, & inæquabiliter dispergit: neq; his calor subest: ubi hiat: ubi assidue dormit: ubi his qui mentis suæ non est: neq; id facere sanus solet: dentibus stridet: ubi ulcus quod aut ante, aut in ipso morbo natum est: aridum, & aut pallidum, aut lividum factum est. Illa quoq; mortis indicia sunt: ungues, digitiq; pallidi: frigidus spiritus: aut si manibus quis in febre, & acuto morbo uel in sania, pulmonis uel dolore, uel capitis, in ueste floccos legit: fimbrias uel diducit: uel in adiuncto pariete si qua minuta eminent: carpit. Dolores etiam circa coxas, et inferiores partes orti, si ad uiscera transierunt: subitoq; desierunt: mortē subesse testantur: magisq; si alia quoq; signa accesserunt. Neq; is seruari potest, qui sine ullo tumore febricitans, subito stragulatur: aut deuorare saluam suam non potest. Cui uel in eodem febris, corporisq; habitu cernix conuertitur: sic ut deuorare æque nihil possit: aut cui simul & continua febris, & ultima corporis infirmitas est: aut cui febre non quiescente exterior pars frigit: interior sic calet: ut etiam sitim faciat: aut qui febre æquæ non quiescente: simul & delirio, & spirandi difficultate uexatur: aut qui epoto ueratro exaptus distentione neruorum est: aut qui ebrius obmutuit: is enim febre, adiecta neruorum distentione consumitur: nisi aut febris accessit, aut eo tempore, quo ebrietas solui debeat, loqui cepit. Mulier quoq; grauida acuto morbo facile cōsumitur: & is, cui somnus dolorem auget: & cui protinus in recenti morbo bilis atra, uel infra, uel supra se ostendit: cui uel alterutrum modo se prompsit: cum iam longo morbo corpus eius esset extenuatum, et affectum. sputum et biliosum, & purulentum, siue separatim ista, siue mixta proueniunt: interitus periculū ostendunt. Ac si circa septimum diē tale esse cōspici proximum est ut is circa quartumdecimum diem de cadat: nisi alia signa meliora, peiora uel accesserint. quæ quo leuiora, grauiora uel subsecuta sunt: eo uel ferio rem mortem, uel maturiorem denunciant. Sudor quoq; frigidus in acuta febre pestiferus est. atq; in omni morbo uomitus: qui uariis, & multorum colorum est: præcipueq; si malus in hoc odor est. Ac sanguinē quoq; in febre uomuisse pestiferum est. Urina uero rubra, & tenuis in magna cruditate esse cōsuevit: & sæpe antequam spacio

matureſcat, hominem rapit. Itaq; ſi talis diutius permanet, periculū  
 mortis oſtendit. Peſſima tamen eſt, præcipueq; mortifera, nigra, craſſa,  
 mali odoris: atq; in uiris quidem, & mulieribus talis deterrima eſt.  
 In pueris uero, quæ tenuis, & diluta eſt. Alius quoq; uaria peſtifera  
 eſt: quæ ſtrigmentū, ſanguinem, bilem uiridem, aliquid modo diuerſis  
 temporibus, modo ſimul: & in mixtura quadam diſcreta tamen re=  
 preſentat. Sed hæc quidem poteſt paulo diutius trahere. In præcipiti  
 uero iam eſſe denunciat quæ liquida: eademq; uel nigra, uel pallida,  
 uel pinguis eſt: utiq; ſi magna fœditas odoris acceſſit. Illud interroga=  
 ri me poſſe ab aliquo ſcio, ſi certa futuræ mortis indicia ſunt: quomo=  
 do interdum deſerti à medicis conualeſcant: quosdamq; fama prodi=  
 derit in ipsis funeribus reuiſiſſe. Quinetiam uir iure magni nomi=  
 nis Democritus, ne finitæ quidē uitæ ſatis certas notas eſſe propoſuit,  
 quibus medici credidiſſent: adeo illud non reliquit, ut certa aliqua ſi=  
 gna futuræ mortis eſſent: aduerſus quos, ne dicam illud quidem, quod  
 in uicino ſepe quædam notæ poſitæ non bonos, ſed imperitos medi=  
 cos decipiunt: quod Aſclepiades funeri obuius intellexit eum uiuere,  
 qui eſſerebatur: ne protinus crimen artis eſſet, ſi quod profeſſoris ſui:  
 illa tamen moderatius ſubiiciam. Coniecturalē artem eſſe medicinam,  
 rationemq; coniecturæ talem eſſe: ut cum ſæpius aliquando reſponde=  
 rit, interdum in fallat nos. Si quid itaq; uix in milleſimo corpore ali=  
 quādo decipit: id notā nō habet, cum per innumerabiles homines re=  
 ſpondeat. Idq; non in his tantum, quæ peſtifera ſunt, dico: ſed in his  
 quoq; quæ ſalutaria. Si quidem etiam ſpes interdum fruſtratur: &  
 moritur aliquis, de quō medicus ſecurus primo fuit. Quæq; medendi  
 cauſa reperta ſunt, non nunquam in peius aliquid conuertunt. Neq;  
 id euitare humana imbecillitas in tanta uarietate corporum poteſt.  
 Sed eſt tamen medicinæ fides, quæ multo ſæpius, perq; multo plures  
 ægros prodeſt. Neq; tamen ignorare oportet in acutis morbis fallaces  
 magis notas eſſe & ſalutis, & mortis.

De notis, quas aliquis in ſingulis morborum generibus habere poſſit.

Caput ſecundum. *vv*

*S* Ed cum propoſuerim ſigna quæ in omnia aduerſa ua=  
 litudine cōia eſſe conſuerunt: ea quoq; trāſibo, ut quas  
 aliquis in ſingulis morborū generibus habere poſſit  
 notas, indicē. Quædā aut ſunt, quæ añ febres, quæ=  
 dam, quæ inter eas quid aut intus ſit, aut uenturum  
 ſit, oſtendunt. Ante febres, ſi caput graue eſt: aut ex ſomno oculi cali=

*ſpes fruſtratur in p  
 mortis*

gant: aut frequētia sternutamenta sunt: circa caput aliquis pituita im-  
petus timeri potest. Si sanguis, aut calor abundat: proximum est, ut ali-  
qua parte profusum sanguinis fiat. Si sine causa quis emacrescit:  
ne in malum habitum corpus eius recadat, metus est. Si prae cordia do-  
lent: aut inflammatio grauis est: aut non toto die concocta fertur urina:  
cruditate esse manifestum est. Quibus diu color sine morbo regio ma-  
lus est: hi uel capitis doloribus cōsistuntur: uel terrā edunt. Qui diu  
habent faciem pallidam, & tumidam: aut capite, aut uisceribus, aut  
alio laborant. Si in cōtinua febre puero ueter nihil reddit, mutatur q̄s  
ei color: nec somnus accedit: ploratq̄: is assidue metuenda nervorū di-  
stentio est. Frequens aut destillatio in corpore tenui, longoq̄: talem ti-  
mendam esse testatur. Vbi pluribus diebus non descendit aluus, docet  
aut subitam deiectionē, aut febriculam instare. Vbi pedes turgent, lon-  
gae deiectiones sunt. Vbi dolor in imo uentre et icōxis est, aqua inter-  
cutis instat. sed hoc morbi genus ab ilibus oriri solet. Idem propositū  
periculum est his, quibus uoluntas desidendi est: uenter nihil reddit,  
nisi & aegre, & durū: tumor in pedibus est. idemq̄: modo dextra,  
modo sinistra parte uentris inuicē oritur, atq̄: finitur. sed à icinore  
id malum proficisci uidetur. eiusdem morbi nota est. Vbi circa um-  
bilicum intestina torquentur (σπόρον græci nominant) coxæq̄: dolores  
manent: eaq̄: neq̄: tempore, neq̄: remedijs soluantur. Dolor aut arti-  
culorum, pro ut in pedibus, manibus'ue, aut alia qualibet parte sic  
est, ut eo loco nervi contrahantur: aut si id membrum ex leui causa  
fatigatum, eaq̄: frigido, calidoq̄: offenditur: podagrā, chiram'ue, uel  
eius articuli, in quo id sentitur, morbū futurum esse denuntiat. Qui-  
bus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desit: hi uel ca-  
pitis doloribus consistuntur necesse est: uel in articulis aliquas exulce-  
rationes graues habeant: uel aliquo morbo etiam debilitentur. Qui-  
bus faeminis menstrua non proueniunt, necesse est capitis acerbissimi  
dolores sint: uel qualibet alia pars morbo infestetur. Eademq̄: his  
pericula sunt, quibus articulorum uitia dolores, tumoresq̄: sine poda-  
gra, similibusq̄: morbis oriuntur, & desinunt. Vtiq̄: si saepe tempora  
his dem dolent: noctūq̄: corpora insudant: si frons prurit, lippitudi-  
nis metus est. Si mulier à partu uehementes dolores habet: neq̄: alia  
præter ea signa mala sunt: circa uigesimum diem aut sanguis per na-  
res erumpet, aut in inferioribus partibus aliquid abscedet. Quicūq̄:  
etiam dolorem ingentem circa tempora, & frontem habebit: is alte-  
rutra ratione eum finiet, magisq̄: si iuuenis erit, per sanguinis pro-  
fusionem: si senior, per suppurationem. Febris aut quæ subito sine ra-  
tione sine bonis signis finita est, ferè reuertitur. Cui fauces sanguine, et



interdiu, & noctu replentur sic, ut neq; capitis dolores, neq; præcordiorum, neq; tussis, neq; uomitus, neq; febricula præcesserit: huius aut in naribus, aut in faucibus ulcus reperietur. Si mulieri ex inguine febricula orta est: neq; causa apparet, ulcus in uulua est. Vrina autem crassa, ex qua quod desidet, album est: significat circa articulos, aut circa uiscera dolorem, metumq; morbi esse. Eadem uiridis, aut uiscerum dolorem, tumoremq; cum aliquo periculo subesse: aut certe corpus integrum non esse testatur. At si sanguis, aut pus in urina est: uel uesica, uel renes exulcerati sunt. Si hæc crassa carunculas quasdam exiguis quasi capillos habet: aut si bullat, aut si male olet: & interdum quasi harenam, interdum quasi sanguinem trahit: dolent autem coxæ: quæq; inter has, superq; pubem sunt: & accedunt frequentes ructus: interdum uomitus biliosus, extremæq; partes frigesunt: urina crebra cupiditas, sed magna difficultas est: & quod inde excretum est, aquæ simile uel ruffum, uel pallidum est: paulum tamen in eo leuamenti est: alius uero cum multo spiritu redditur: utiq; in renibus uitium est. Aut si paulatim desillat: uel si sanguis per hanc editur, & in eo quædam cruenta concreta sunt, idq; ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent, in eadem uesica uitium est. Calculosi uero his indicij cognoscuntur. Difficiliter urina redditur: paulatimq; interdum etiam sine uoluntate desillat. Eadem harenosa est: nonnunq; aut sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excernitur. Eamq; quidam promptius recti, quidam resupinati: maximeq; hi qui grandes calculos habent: quidam etiam inclinati reddunt: colemq; extendendo, dolorem leuant. Grauitatis quoq; cuiusdam in ea parte sensus est: atq; ea cursu, omniq; motu augentur. Quidam etiam cum torquentur, pedes inter se subinde mutatis uicibus implicant. Fœminæ uero oras naturalium suorum manibus admotis scilpere crebro coguntur. Nonnunquam si digitum admouerunt, ubi uesicæ cervicem is urget, calculum sentiunt. At qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone uicium est. Mulieri grauidæ sine modo fusa alius elidere partu potest. Eidem si lac ex māmīs profluit, imbecillum est, quod intus gerit. diuinae mammae sanum illud esse testantur. Frequens singultus, & præter consuetudinem continuus iecur inflammatum esse significat. Si tumores super ulcera subito esse desierunt, idq; à tergo incidit: uel distentio neruorū, uel rigor timeri potest. At si à priore parte id euenit: uel lateris acutus dolor, uel insana expectanda est. Interdum etiam huiusmodi casum, quæ tutissima inter hæc est, profusio alui sequitur. Si ora uenarū sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt: aut aqua

*intercutis aut tabes sequitur: eadem tabes subit, si in lateris dolore orta suppuratio, intra quadraginta dies purgari nō potuit. At si longa tristitia cum longo timore, & uigilia est: atræ bilis morbus subest. Quibus sæpe ex naribus fluit sanguis, his aut lienis tumet: aut capitis dolores sunt: quos sequitur, ut quædam ante oculos tanquam imagines obuersentur. At quibus magni lienes sunt, his gingivæ malæ sunt: et os olet: aut sanguis aliqua parte prorumpit. quorum si nihil euenit, necesse est in cruribus mala ulcera, & ex his nigra cicatrices fiant.*  
*Quibus causa doloris neq; sensus eius est, his mens labat. Si in uentrē sanguis confluit: ibi in pus uertitur. Si a coxis, et ab inferioribus partibus dolor in pectus transit: neq; ullum signum malum accessit: suppurationis eo loco periculum est. Quibus sine febre aliqua ex parte dolor, aut prurigo cū rubore, aut calore est: ibi aliquid suppurat. Vrina quoq; quæ in homine sano parum liquida est, circa aures futuram aliquam suppurationē esse denunciat. Hæc uero cum sine febre quoq; uel latentium, uel futurarum rerū notas habeant, multo certiora sunt, ubi febris accessit: atq; etiam aliorū morborum tum signa nascuntur.*  
*Ergo protinus insania timenda est: ubi expeditior alicuius, q̃ sani fuit sermo est: subitq; loquacitas orta est: & hæc ipsa solito audacior. aut ubi raro quis, & uehementer spirat: uenasq; concitatas habet, præcordiis duris, & tumentibus. Oculorū quoq; frequens motus, & in capitis dolore offusæ oculis tenebræ: uel nullo dolore substante somnus eruptus, continuataq; nocte, & die uigilia: uel prostratum contra consuetudinem corpus in uentrem sic, ut ipsius alui dolor id non coegerit.*  
*Item robusto adhuc corpore insolitus dentium stridor, insaniæ signa sunt. Siquid etiam abscessit: & anteq̃ suppuraret, manente adhuc corpore insolita febre subsedit, periculū affert primum furoris, deinde interitus: auris quoq; dolor acutus cū febre continua, uehementiq; sæpe mentem turbat: & ex eo casu iuniores interdum intra septimum diē moriuntur: seniores tardius. quoniam neq; æque magnas febres experiuntur: neq; æque insaniunt: ita sustinent, dum his affectus intus uersatur. Suffusæ quoq; sanguine mulieris mammæ, furorem uenturum esse testantur. Quibus autē longæ febres sunt: his aut abscessus aliqui, aut articularum dolores erunt. Quorum faucibus in febre eliditur spiritus, instat his neruorū distentio. Si angina subito finita est, in pulmonem id malum transit: idq; sæpe intra septimum diem occidit: quod nisi inadat, sequitur, ut aliqua parte suppuret. Deinde post alui longam resolutionē, tormina. Post hæc intestinorum leuitas oritur. Post nimias defillationes, tabes. post lateris dolores, uitia pulmonum. post hæc, insania. Post magnos feruores corporis, neruorum rigor, aut distentio. Vbi*



distentio. ubi caput vulneratum est, delirium. ubi uigilia torset, neruorum distentio. ubi uehementer uenæ super ulcera mouentur: sanguinis profluvium erit. suppuratio uero pluribus morbis excitatur. Nā si longæ febres sine dolore, sine manifesta causa remanent: in aliquā partem id malum incumbit, in iunioribus tamen: nam in senioribus ex eiusmodi morbo quartana ferè nascitur. Eadem suppuratio fit, si præcordia dura dolentia ante uigesimum diem hominē non sustulerunt: neq; sanguis ex naribus fluxit, maximeq; in adolescentibus. utiq; si inter principia aut oculorum caligo, aut capitis dolores fuerunt: sed cum inferioribus partibus aliquid abscessit. aut si præcordia tumorem mollem habent: neq; habere intra sexaginta dies desinunt: hæretq; per omne id tempus febris. Sed tum in superioribus partibus fit abscessus: ac si inter ipsa ulcera nō fuit: circa aures erumpit. Cumq; omnis longus tumor ad suppurationem ferè spectet: magis se tendit is, qui in præcordijs, q̃ is qui est in uentre: & is qui supra umbilicū, q̃ is qui infra est. Si lassitudinis etiam sensus in febre est: uel in maxillis, uel in articulis aliquid abscedit. Interdum quoq; urina tenuis, et cruda sic diu fertur: ut alia salutaria signa sint. Ex quo eo casu plerumq; infra transversum septum, quod *διαφραγμα* græci uocant, fit abscessus. Dolor autem pulmonis si neq; per sputa, neq; per cucurbitulas, neq; per sanguinis detractionem, neq; per uictus rationem finitus est, uomica aliquas intus excitat aut circa uigesimum diem, aut circa xxx: nonnunq̃ etiam circa sexagesimum. numerabimus autem ab eo die, quo primū febricitauit aliquis, aut inhorruit, aut grauitatem eius partis sensit. sed hæ uomicæ modo à pulmone, modo à contraria parte nascuntur. Quod suppurat ab ea parte, quam afficit: dolorem, inflātionemq; concitat, ipsum calidius est: et si in partem sanam aliquis decubuit: onerare eam ex pondere aliquo uidetur. Omnis etiā suppuratio quæ nondum oculis patet, sic deprehendi potest. Si febris nō dimittit: eaq; interdum leuior est: noctu increscit: multus si odor oritur: cupiditas tussiedi est: et penè nihil in tussi excreatur: oculi caui sunt: malæ rubent: uenæ sub lingua inalbescunt: in manibus fiunt adunci ungues, digiti, maximeq; summi pallēt: in pedibus tumores sunt: spiritus difficilius trahitur: abi fastidium est: pustula toto corpore oriuntur. Quod si protinus initio dolor & tussis fuit, & spiritus difficultas: uomica uel ante, uel circa uigesimum diem erumpet. si serius ista coeperint: necesse est quidem increscant. sed quo minus cito affecterint: eo tardius soluentur. Solent etiam in graui morbo pedes cum digitis, unguibusq; nigrescere. quod si non est mors consecuta, & reliquum corpus inualuit: pedes tamen decidunt.



Quæ notæ in quoq; morbi genere, uel spem, uel pericula ostendant.

Caput.

VII.

Equitur ut in quoq; morbi genere proprias notas explicem: quæ uel spem, uel periculum ostendant. Ex uesciâ do-  
 lente si purulenta urina processit: inq; ea leue, & album  
 subsedit: metû detrahât. In pulmonis morbo si sputo ipse  
 leuatur dolor: quauis id purulentum est: tamen æger facile spirat: fa-  
 cile excreat: morbum ipsum non difficulter fert: potest ei secunda ua-  
 letudo contingere. Neq; inter initia terreri conuenit: si protinus sputum  
 mixtum est ruffo quodam, & sanguine, dummodo statim edatur. La-  
 terum dolores suppuratione facta, deinde intra quadragesimum diē  
 purgata finiuntur. Si in iecinore nomica est, & ex ea fertur pus pu-  
 rum, & album: salus ei facilis. Id enim malum in tunica est. Ex sup-  
 purationibus uero hæ tolerabiles sunt: quæ in exteriorem partem fe-  
 runtur, et acuiuntur. Et ex his quæ intus procedunt, hæ leuiiores: quæ  
 contra se cutem non afficiunt: eamq; & sine dolore esse, & eiusdem  
 coloris, citius reliquæ partes sunt, sinunt esse. Pus quoq; quacunq; par-  
 te erumpit: si est leue, album, & unius coloris, sine ullo metu est: &  
 quo effuso febris protinus conuiuit: desieruntq; urgere cibi fistidiū,  
 & potionis desiderium. si quando etiam suppuratio descendit in cru-  
 ra: sputumq; eiusdem factum pro ruffo purulentum est: periculi mi-  
 nus est. At in tabe eius, qui saluus futurus est: sputum esse debet albū,  
 æquale totum: eiusdemq; coloris sine pituita: eiq; etiā simile esse opor-  
 tet si quid in nares à capite destillat. Longe optimum est febrem omni-  
 no non esse. secundum est tantulum esse: ut neq; cibum impediat, neq;  
 crebram sitim faciat. Alius in hac ualetudine ea tutus est: quæ cotidie  
 coacta: eaq; conuenientia his quæ assumuntur, reddit. Corpus, id quod  
 minime tenue, maximeq; lati pectoris, atq; setosi est: cuiusq; cartilago  
 exigua, & arnosa est. Super tabem si mulieri quoq; suppressa men-  
 strua fuerunt: et arca pectus, atq; scapulas dolor mansit: subitoq; san-  
 guis erupit: leuari morbus solet. Nā & tussis minuitur: et sitis atq; fe-  
 bricula desinūt. sed iisdē ferē nisi reedit sanguis, nomica erumpit: quæ  
 quo cruentior, eo melior est. A qua autem inter cutem minime terribi-  
 lis est: quæ nullo antecedente morbo cœpit. deinde quæ longo morbo  
 superuenit. Vtiq; si firma uiscera sunt: si spiritus facili: si nullus do-  
 lor: si sine calore corpus est: æqualiterq; in extremis partibus macriū  
 est: si uenter mollis: si nulla tussis: nulla sitis: si lingua ne per som-  
 num quidem inarescit: si cibi cupiditas est: si uenter medicamentis mo-  
 uetur: si per se excernit mollia, & figurata: si extenuatur: si urina &

uini mutatione, & epotis aliquibus medicamentis mutatur: si corpus sine lassitudine est, & morbum facile sustinet. siquidē in quo omnia hæc sunt: is ex toto tutus ē: in quo plura ex his sunt, is in bona spe est. Articulorum uero uitia ut podagræ, chiragræq; si iuuenes tentantur: neq; callum induxerunt: solui possunt: maximeq; torminibus leniuntur: & ex quocunq; modo uenter fluit. Item morbus comitialis ante pubertatem ortus non ægre finitur: & in quo ab una parte corporis uenientis accessionis sensus incipit. optimum est à manibus, pedibusue initium fieri: deinde à lateribus: pessimum inter hæc à capite. Atq; in his quoq; ea maxime prosunt: quæ per deiectiones excrevantur. Ipsa autem deiectio sine ulla noxa est: quæ sine febre est: si celeriter desinit: si contracto uentre nullus motus eius sentitur: si extremam aluum spiritus sequitur. Acria tormina quidem periculosa non sunt: si sanguis, & strigmenta descendunt: dum febris, cæteræq; accessiones huius morbi absint: adeo ut etiam grauida mulier non solum reseruari possit: sed etiam partum reseruare. Prodestq; in hoc morbo si iam ætate aliquis proæssit. Contra intestinorū leuitas facilius à teneris ætatibus depellitur: utiq; si fieri urina, et alio cibo corpus incipit. Eadem ætas prodest, & in coxæ dolore, & humerorum, et in omni resolutione nervorum. ex quibus coxa si sine torpore est: si leuiter frigeret: quantum magnos dolores habet: tamen & facile, & mature sanatur: resolutumq; membrū si nihilominus aliter fieri sanum potest: oris resolutio, etiam alio citra finitur: omnisq; deiectio lippienti prodest. At narix ortus, uel per ora uenarū subita profusio sanguinis, uel tormina insaniam tollunt. Humerorum dolores, qui ad scapulas uel manus tendunt: uomitu atræ bilis soluantur. et quisquis dolor deorsum tendit: sanabilior est. Singultus sternutamento finitur. Longas deiectiones suppressit uomitus. Mulier sanguine uomens, profusis mēstruis liberatur. Quæ mēstruis nō purgatur, si sanguinē, ex naribus fudit: omni periculo uacat. Quæ locis laborat: aut difficulter partiū edit: sternutamento leuatur. Aëstua quartana ferè breuis est. cui calor, & tremor est: saluti delirium est. Lienosis bono tormina sunt. deniq; ipsa febris, quod maxime mirū uideri potest: sæpe præsidio est. nā & præcordiorum dolores si sine inflammatione sunt, fiunt: & in iecinoris dolore succurrit: & nervorū distentionem, rigoremq; si postea cæpit: ex toto tollit: & ex difficultate urinae morbū tenuioris intestini ortum, si urina per calorem mouet: leuat. At dolores capitis quibus oculorū caligo, et rubor cum quadā frontis prurigine accedunt: sanguinis profusione, uel fortuito, uel et petita summoventur. Si capitis, ac frontis dolores ex uento, uel frigore, aut aestu sunt: grauedine, et sternutamentis finiuntur.

Febrem autem ardentem, quam græci *ναύσωνα* uocant: subitus horror exoluit. Si in febre aures obtusæ sunt: si sanguis è naribus fluxit: aut uenter resolutus est: illud malum desinit ex toto. Nihil plus aduersus surditatem, quàm biliosa aluus potest. Quibus in fistula urinae uti multi apices, quos *ούματα* græci uocant: esse cœperunt: ijs ubi pus ea pte profluxit, sanitas redditur. ex quibus cum pleraque per se proueniant: scire licet interea quoque quæ ars adhibet: naturam plurimum posse. Contra si caput febre continenti dolet: neque quicquam reddit: malum atque mortiferum est: maximeque id periculum est pueris à septimo anno ad quartum decimum. In pulmonis morbo si sputum primis diebus non fiat: deinde à septimo die cœpit, et ultra septimum mansit: periculosum est. Quantoque magis mixtos, neque inter se diductos colores habet: tanto deterius. et tamen nihil peius est, quàm sincerum id edi: siue rufum est, siue cruentum: siue album, siue glutinosum: siue pallidum, siue spumans. nigrum tamen pessimum est. In eodem morbo periculosa sunt tussis, destillatio, etiam quod aliàs salutare habetur, sternutamentum. Periculosissimumque est si hæc secuta subita deiectio est. Ferè uero quæ in pulmonis, eadem in lateris doloribus, et mitiora signa, et asperiora esse consueverunt. Ex iecinore si pus cruentum exit: mortiferum est. At ex suppurationibus hæc pessimæ sunt: quæ intus tendunt sic, ut exteriorem quoque cutem decolorent. Ex his deinde, quæ in exteriorem partem prorumpunt, quæ maximæ: quæque planissimæ sunt. Quod si ne rupta quidem uomica uel pure extrinsecus emissio febris quieuit: aut quamuis quierit: tamen repetit. item si sitis est: si cibi fastidium, si uenter liquidus, si pus est liuidum, et pallidum, si nihil æger excreat, nisi pituitam spumantem: periculum certum est. Atque ex his quidem suppurationibus, quas pulmonum morbi concitant: ferè senes moriuntur: ex cæteris iuniores. At in tabe sputum mixtum, purulentum, febris assidua, quæ et cibi tempora eripit: et siti affligit in corpore tenui: periculum subesse testatur. Si quis etiam in eo morbo diutius traxit: ubi capilli fluunt: ubi urina quedam araneis similia subsidentia ostendit: atque in his odor foedus est: maximeque ubi post hæc orta deiectio est: protinus moritur. Vtique si tempus autumnus est: quo ferè qui cætera parte anni traxerunt: resoluuntur. Itē pus expuisse in hoc morbo, deinde ex toto spueri desisse, mortiferum est. Solent etiam in adolescentibus ex eo morbo uomica, fistulaeque oriri: quæ non facile sanescunt: nisi si multa signa bonæ ualeitudinis subsecuta sunt. Ex reliquis uero minime facile sanantur uirgines, aut hæc mulieres: quibus super tabem menstrua suppressa sunt. Cui uero sano subitus dolor capitis ortus est: deim somnus oppressit, sic ut stertat: neque



neq; expersgatur, intra septimum diem pereundū est: magis si cum aliis cito non antecesserit. Si palpebræ dormientis non coeunt: si albū oculorum apparet. quos tamen ita mors sequitur: si id malum non est febre discussum. At aqua inter cutem, si ex acuto morbo coepit: ad sanitatem raro perducitur. utiq; si contraria his, quæ supra posita sunt: subsequuntur. æque in ea quoq; tussis spem tollit. Item si sanguis sursum, deorsumq; erupit: & aqua medium corpus impleuit. Quibusdam etiā in hoc morbo tumores oriūtur: deinde desinunt: deinde rursus assurgunt. Hi quidem tutiores sunt: quā qui supra comprehensi sunt, si attenduntur. sed ferē fiducia secundæ uoletudinis opprimuntur. Illud inre aliquis mirabitur: quomodo quædam simul & affligunt nostra corpora, & parte aliqua tueantur. Nam siue aqua inter cutem quem impleuit: siue in magno abscessu multum puris coijt: simul id omne effudisse æque mortiferum est: ac si quis sani corporis uulnere factus exanguis est. Articuli uero, qui sic dolent, ut super eos ex alio quædam tubercula innata sint: nunquam liberantur. quæq; eorum uicia uel in senectute coeperunt: uel in senectutem ab adolescentia peruenierunt, ut aliquando leniri possunt: sic nunquam ex toto finiuntur. Morbus quoq; comitialis post annum quintum & uigesimalium ortus ægre curatur: multoq; ægrius is, qui post quadragesimum annum coepit, adeo ut in ea ætate aliquid in natura spei, uix quicquam in medicina sit. In eodem morbo si simul totum corpus afficiatur: neq; ante in partibus aliquis uenientis mali sensus est: sed homo ex improviso concidit: cuiuscunq; is ætatis est: uix sanescit. Si uero aut mens læsa est: aut neruorū facta resolutio: medianæ locus non est. Deiectionibus quoq; si febris accessit: si inflammatio iocoris, aut præcordiorum, aut uentris: si inmodica sitis, si longius tempus, si alius uaria, si cum dolore est: etiam mortis periculum subest. maximq; si inter hæc tormina uetera esse ceperunt. Isq; morbus maxime pueros assumit usq; ad annum decimum. cæteræ ætates facilius sustinent. Mulier quoq; grauida eiusmodi casu rapi potest, atq; etiam si ipsa conuuluit, partum tamen perdit. Quin etiā tormina ab atra bile orsa, mortifera sunt. aut si sub his extenuato iam corpore subito nigra alius profluxit: aut intestinorum lenitas. Periculosior est si frequens deiectio est: si uenter omnibus horis, & cum somno, & sine hoc profluit: si similiter noctu, & interdum: si quod excernitur aut crudum est, aut nigrum: & præter id etiam leue, & mali odoris sit: si sitis urget: si post potionem urina non redditur: quod euenit quia tunc liquor omnis non in uesciam, sed in intestina descendit: si os exulceratur: si rubet facies, & quasi maculis quibusdam colorum omnium distin-

guntur: si uenter est quasi fermentatus, pinguis, atq; rugosus: si & cibi  
 cupiditas non est. Inter quæ cum euident mors sit, multo euidentior  
 est: si iam longum quoq; id uitium est: maximeq; si etiã in corpore se  
 nili est. Si uero in tenuiore intestino morbus est: uomitus, singultus, ner  
 uorum discentio, delirium: mala sunt. At in morbo arquato durũ fie  
 ri iecur pernitissimum est. Quos lienus male habet, si tormina pre  
 henderunt: deinde uersa sunt: uel in aquam inter cutem, uel intesti  
 norum leuitatem uix ulla medicina periculo subtrahit. Morbus inte  
 stini tenuioris, nisi resolutus est intra septimum diem, occidit. Mulier  
 ex partu si cum febre uehementibus etiam, & assiduus capitis dolori  
 bus premitur: in periculo mortis est. si dolor, atq; inflammatio est in  
 his partibus, quibus uiscera continentur: frequenter spirare signum  
 malum est. si sine causa longus dolor capitis est: & in ceruices, ac sca  
 pulas transit: rursusq; in caput reuertitur: aut à capite ad ceruices, sca  
 pulasq; peruenit: perniciosus est: nisi uomitam aliquam excitauit sic,  
 ut pus extassiretur. aut nisi sanguis ex aliqua parte prorupit: aut nisi  
 in capite multa prurigo, toto uero corpore pustulæ ortæ sunt. Aque ma  
 grum malum est, ubi torpor, atq; prurigo peruagantur modo per to  
 tum caput, modo in parte: aut sensus alicuius ibi quasi frigoris est: eaq;  
 ad summam quoq; linguam perueniunt. Et cum in hisdem abscissi  
 bus auxilium sit: eo difficilior sanitas est: quo minus sæpe sub his ma  
 lis illi subsequuntur. In coxæ uero doloribus si uehemens torpor est:  
 frigescatq; crus, & coxa: aliusq; nisi coacta non reddit: idq; quod ex  
 cernitur, mucosum est: iamq; ætas eius hominis quadragesimum an  
 num excessit: is morbus erit longissimus, minimeq; annuus: neq; fini  
 ri poterit nisi aut uere, aut autumno. Difficilis æque curatio est in ea  
 dem ætate, ubi humerorum dolor uel ad manus peruenit: uel ad sca  
 pulas tendit: torporemq; & dolorem creat: neq; bilis uomitu leua  
 tur. Quacumq; uero parte corporis membrum aliquod resolutum est: si  
 neq; mouetur, & emacrescit: in pristinum habitum non reuertitur:  
 eoque minus quo uetustius id uitium est: & quo magis in corpore seni  
 li est. Omnique resolutioni neruorum ad medicinam non idonea tem  
 pora sunt hyems, & autumnus. aliquid sperari potest uere, & æsta  
 te. Isq; morbus mediocris uix sanatur: uehemens sanari non potest.  
 Omnis etiã dolor minus medianæ patet: qui sursum procedit. Mulieri  
 grauidæ, si subito mammae emacruerunt: abortus periculũ est. Quæ  
 neq; peperit, neq; grauida est, si hac habet: à menstruis defecta est.  
 Quartana æstus breuis: autumnalis ferè longa est: maximeq; quæ  
 cæpit hyeme appropinquante. si sanguis profluxit: deinde secuta est  
 dementia cum discentione neruorum: periculum mortis est. Itemq; si

medicamentis purgatum, & adhuc inanem, nervorū distentio oppres-  
sit: aut si in magno dolore extremæ partes frigent: neq; is ad uitam  
redit: qui ex suspensio spumante ore detractus est. Alius nigra san-  
guini atro similis repentina siue cum febre, siue etiam sine hac, per-  
niciosa est.

De morborum curationibus. Caput. VIII.

Ognitis inditijs, quæ nos uel spe consolentur: uel metu ter-  
reant: ad curationes morborum transeundum est. Ex his  
quædam cōes sunt: quædam propriæ. cōes, quæ pluri-  
bus morbis opitulantur. propriæ, quæ singulis. ante de  
communibus dicam. Ex quibus tamen quædam non egros solum, sed  
sanos quoq; sustinent: quædam in aduersa tantum ualitudine adhibē-  
tur. Omne uero auxilium corporis aut demit aliquam materiam:  
aut adiāt: aut euocat: aut reprimit: aut refrigerat: aut calefacit: si-  
mulq; aut durat: aut mollit. Quædam non uno modo tantum, sed et  
duobus inter se non contrarijs adiuant. Demitur materia sanguinis  
detractione, cucurbitula, deiectione, uomitu, frictioe, gestatione, omniq;  
exercitatione corporis, abstinentia, sudore: de quibus protinus dicam.

De sanguinis detractioe per uenas. Caput. IX.

Anguinem incisa uena mitti nouum non est. sed nullum  
pene morbum esse, in quo non mittatur: nouum est. Item  
mitti iunioribus, & fœminis uterū non gerentibus, uetus  
est. In pueris uero idē experiri, & in senioribus, & in  
gravidis quoq; mulieribus uetus non est. si quidē antiqui primam, ul-  
timamq; ætatem sustinere non posse hoc auxiliij genus indicabant: per-  
suaserantq; sibi mulierem gravidā, quæ ita curata esset: abortum esse  
facturā. Postea uero usus ostendit nihil ex his esse perpetuum: aliasq;  
potiores obseruationes adhibendas esse: ad quas dirigi curantis consē-  
lium debeat. interest enim non quæ ætas sit: neq; qd in corpore in-  
tus geratur: sed quæ uires sint. Ergo si iuuenis imbecillus est: aut si mu-  
lier, quæ gruida non est: parum ualet: male sanguis emittitur. E mo-  
ritur enim uis, si quæ his supererat: et hoc modo erepta ē. At firmus  
puer, & robustus senex, & gruida mulier ualens, tuto curantur. Ma-  
xime tamen in his medicus imperitus falli pōt: quia ferē minus robo-  
ris illis ætatibus subest. Mulieriq; prægnati post curationē quocq; uiri-  
bus opus est nō tantū ad se, sed et ad partū sustinendū. Non qd aūt



intentionem animi, aut prudentiam exigit, protinus faciendum est: cum præcipua in hoc ars sit, quæ non annos numeret: neq; conceptio- nem solam uideat: sed vires æstimet: & ex eo colligat, possit nec ne su- peresse quod uel puerum, uel senem, uel in una muliere quod duo cor- pora simul sustineat. Interest enim inter ualens corpus, et obесum: in- ter tenue, & infirmum. Tenuioribus magis sanguis, plenioribus ma- gis caro abundat. Facilius itaq; illi detractionem eiusmodi sustinent: celeriusq; ea, si nimium est pinguis: quis affligitur. Ideoq; uis corpo- ris melius ex uenis, quàm ex ipsa specie æstimatur. neq; enim solum hæc considerata sunt, sed etiam morbi genus quod sit. utrum su- perans, an deficiens materia læserit. Corruptum corpus sit, an inte- grum. Nam si materia uel deest, uel integra est: istud alienum est. At si uel copia sui male habet, uel corrupta est: nullo modo melius succurrat. Ergo uehemens febris ubi rubet corpus, plenæq; uenæ tu- ment: sanguinis detractionem requirit. Item uiscerum, morbi, neruo- rumq; resolutio, & rigor, & distentio, quicquid deniq; fauces difficul- tate spiritus strangulat: quicquid subito supprimit uocem: quisquis in- tolerabilis dolor est: & quacunq; de causa ruptum aliquid intus, atq; collisum est. Item malus corporis habitus, omnesq; acuti morbi, qui modo, ut supra dixi, non infirmitate, sed onere nocet. fieri tamen po- test, ut morbus quidem id desideret: corpus autem uix pati posse ui- deatur. Sed si nullum tamē appareat aliud auxilium: periturusq; sit qui laborat, nisi temeraria quoq; uia fuerit adiutus: in hoc statu boni medici est ostendere: q̄ nulla spes sine sanguinis detractione sit: fa- teriq; quantus in hac ipsa re sit motus. & tum demum si exigetur, sanguinem mittere. de quo dubitari in eiusmodi re non oportet. satius est enim anceps auxilium experiri, quam nullum. idq; maxime fie- ri debet ubi nerui resoluti sunt: ubi subito aliquis obmutuit: ubi angri- na strangulatur: ubi prioris febris accessio penē confecit, paremque subsequi uerisimile est, neq; eandem uidentur sustinere ægri vires posse. Cum sit autem minime crudo sanguis mittendus: tamen ne id qui- dem perpetuum est. neq; enim semper concoctionem res expectat. Ergo si ex superiore parte aliquis decedit: si contusus est: si ex aliquo subito casu sanguinem uomit, quamuis paulo ante sumpsit cibum: ta- men protinus ei demenda materia est: ne si subsederit, corpus affligat. Idemq; etiam in alijs casibus repentinis qui strangulabunt, dictum erit. At si morbi ratio patietur: tum demum nulla cruditatis suspi- cione remanente id fiet. Ideoq; ei rei uidetur aptissimus aduersus ua- letudinis dies secundus, aut tertius. sed ut aliquando etiam primo die sanguinem mittere necesse est: sic nunquam utile post diem quar- tum est:

tum est: cum iam spatio ipso materia & exhausta est, & corpus cor-  
rumpit: ut detractio imbecillum id facere possit: non possit integrum.  
Quod si uehemens febris urget: in ipso impetu eius sanguinem mitte-  
re, hominem iugulare est. Expectanda ergo remissio est, si non decre-  
scat: sed crescere desit: neq; speratur remissio, tunc quoq; quauis pe-  
ior: sola tamen occasio non omittenda est. Ferè etiam ista medicina  
ubi necessaria est: in biduum diuidenda est. satius est enim in primis  
lenare ægrum: deinde perpurgare: quàm simul omni vi effusa for-  
tasse præcipitare. Quod si in cura quoq; aquæ, quæ inter cutem est,  
ista respondet: quanto magis necesse est in sanguine respondeat. mit-  
tendi uero is debet, si totius corporis causa fit, ex brachio: si partis alicuius,  
ex ea ipsa parte: aut certe quàm proxima. quia non ubiq; mitti potest,  
sed in temporibus: in brachijs, iuxta talos. Neq; ignoro quosdam dice-  
re quam longissime sanguinem inde, ubi lædit, esse mittendum. sic enim  
auerti materiæ cursum: at illo modo in id ipsum quod grauatur, euoca-  
ri. sed id ipsum falsum est. Proximum enim locum primo exaruit.  
Ex ulterioribus autem cæteus sanguis sequitur, quatenus emittitur.  
ubi is suppressus est: quia non trahitur, ne uenit quidem. Videtur ta-  
men usus ipse docuisse: si caput fractum est, ex brachio potius sangui-  
nem mittendum esse. si quod in humero uicium est, ex altero brachio:  
credo quia si quid parum efferit, opportuniore hæ partes iniuriæ  
sunt: q̃ quæ iam male habent. auertitur quoq; interdum sanguis, ubi  
alia parte prorumpens: alia emittitur. Desinit enim fluere qua uolu-  
mus: inde obiectis quæ prohibeant, alio dato itinere. Mittere autem  
sanguinem cum sit expeditissimum: usum habenti, tum ignaro diffi-  
cillimum est. iuncta enim est uena arterijs, his nerui. ita si neruum  
scalpellus attingit: sequitur neruorum distentio: eaq; hominem crudeli-  
ter consumit. At arteria incisa neq; coit, neq; sanescit: interdum etiam  
ut sanguis uehementer erumpat, efficit. Ipsius quoq; uenæ, si forte præ-  
cisa est, capita comprimuntur: neq; sanguinem emittunt. At si timide  
scalpellus demittitur: summam cutem lacerat: neq; uenam incidit. Nō  
nunquam etiam ea later: neq; facile reperitur. ita multæ res id diffi-  
cile inscio faciunt: quod perito facillimum est. Incidenda ad medium  
uena est: ex qua cum sanguis erumpit, colorem eius, habitumq; opor-  
tet attendere. Nam si is crassus, & niger est, uitiatus est: ideoq; uuliter  
effunditur. Si rubet, & pellucet, integer est. eaq; missio sanguinis adeo  
nō prodest: ut etiā noceat protinusq; is suppressendus est. Sed id eue-  
nire non potest sub eo medico, qui scit ex quali corpore sanguis mitten-  
dus sit. illud magis fieri solet, ut æque niger assidue ac primo die  
profluat. quod quauis ita est, tamen si iam satis fluxit: suppressen-

in febre ne  
cuius nō est  
mittendus  
nec nō  
expectate  
missione

in fractur  
capitis qu  
uena iuni

quandis  
quis niten  
est in mag  
cipit et q  
nō niten



dus est: semperq; ante finis faciendus est, q̄ anima deficiat. deligan-  
 dumq; brachiū super imposito expresso ex aqua frigida penicillo: et  
 postero die auerso medio digito, non aut scalpello, uena ferienda: ut re-  
 cens coitus eius resoluator: iterumq; sanguinem fundat. Siue aut pri-  
 mo, siue secundo die sanguis, qui crassus, & niger initio fluxerat: et  
 rubere, & pellucere coepit: satis materiæ detractum est: atq; quod  
 superest, sincerum est. Ideoq; protinus brachium deligandum: ha-  
 bendumq; ita est, donec ualens acutricula sit: quæ celerime in uena  
 confirmatur.

De sanguinis detractione per cucurbitulas. Caput. X.

Cucurbitularum uero duo genera sunt: æneum, & cor-  
 neum. Aenea altera patet: altera clausa est. Cornea alte-  
 ra parte æque patens, altera foramen habet exiguum. In  
 aeneam linamentum ardēs coniicitur: ac sic os eius corpo-  
 ri aptatur: imprimiturq; donec inhæreat. Cornea per se corpori im-  
 ponitur: deinde ubi ea parte qua exiguum foramen est, ore spiritus ad-  
 ductus est: superq; cœra cauum id clausum est: æque inhærescit.  
 Vtraq; non ex his tantum materiæ generibus, sed etiam ex quolibet  
 alio recte fit. At si cætera descierūt: caliculus quoq; aut pultarius oris  
 compressioris ei rei commodè aptatur: ubi inhæsit: si concisa ante scal-  
 pello cutis est, sanguinem extrahit. si integra est, spiritum. Ergo ubi  
 materia quæ intus est, lædit: illo modo: ubi inflatio, hoc imponi solet.  
 Vsus autem cucurbitulæ præcipuus est: ubi non in tuto corpore, sed in  
 parte aliqua uitium est: quam exhauriri ad confirmandam ualetu-  
 dinem satis est. Idq; ipsum testimonium est: etiam scalpello sanguinē,  
 ubi membro succurritur, ab ea potissimum parte: quæ iam læsa est: esse  
 mittendum. q̄ nemo cucurbitulam diuersæ parti imponit: nisi cum  
 profusionem sanguinis eò auertit: sed ei ipsi quæ dolet: quæq; liberā-  
 da est. Opus etiam esse cucurbitula potest in morbis longis: quauis et  
 spacium aliquod accessit: siue corrupta materia, siue spiritu male ha-  
 bente. In acutis quoq; quibusdā si & lenari corpus debet: & ex uena  
 sanguinem mitti: uires non patiuntur. Idq; auxilium ut minus uehe-  
 mens, ita magis tutum. Neq; unquam periculosum est, et si in medio fe-  
 bris impetu: et si in cruditate adhibetur. Ideoq; ubi sanguinem mitti  
 opus est: si incisa uena præceptum periculum est: aut si in parte corpo-  
 ris etiam uitium est: huc potius confugiendum est. cū eo tamen ut scia-  
 mus, hic ut nullum periculum, ita lenius præsidium esse: nec posse ue-  
 hementi malo, nisi æque uehementis auxilium succurrere.



## De deiectione. Caput. XI.

Eiectionem aut antiqui varijs medicamentis, crebraq; alui  
 d ductione in omnibus ferè morbis moliebantur: dabantq;  
 aut nigrum ueratrū, aut filiculam, aut squamam aeris,  
 quam *λεπίδος χαλκός* græci uocant: aut lactucæ marinæ  
 lac: cuius gutta pani adiecta, abunde purgat: aut lac uel asininum, uel  
 bubulum, uel caprinum: eiq; salis paulum adiciebant: decoquebantq;  
 id: et sublati his, quæ coierant: quod quasi serum supererat: bibere  
 cogebant. Sed medicamenta stomachū ferè lædunt. ideoq; omnibus cæ-  
 tharticis aloë miscenda est. Alius si uehementius fluit: aut sæpius duc-  
 tur: hominem infirmat. Ergo nunquam in aduersa ualetudine medica-  
 mentum eius rei causa recte datur: nisi ubi is morbus sine febre est. Ut  
 cum ueratrū nigrum, aut atra bile uexatis, aut cum tristitia infanti-  
 tibus, aut is quorū nerui parte aliqua resoluti sunt: datur. At ubi fe-  
 bres sunt: satius est eius rei causa abos, potionesq; assumere: qui simul  
 et alant: et uentrē molliant. Suntq; ualetudinis genera, quibus ex la-  
 cte purgatio conuenit. Plerumq; uero alius potius ducenda est: quod ab  
 Asclepiade quoq; sic nituperatum, ut tamen seruatum sit: uideo ple-  
 rumq; seculo nostro præteriri. Est autem ea moderatio, quam is se-  
 tus uidetur: aptissima: ut neq; sæpe ea medicina tentetur: et tamen se-  
 mel sumptum uel bis, non omittatur. Si caput graue est: si oculi cali-  
 gant: si morbus maioris intestini est, quod græci *υῶλον* nominant: si in  
 intro uentre, aut in coxa dolores sunt: si in stomachū quædam biliosa  
 cōcurrunt: uel et pituita eò se, humor'ne aliquis aquæ similis confert:  
 si spiritus difficilior redditur: si nihil per se uenter excernit. utiq; si  
 iuxta quoq; stercus est, et intus remanet: aut si stercoris odorē nihil  
 deiciens, æger ex spiritu suo sentit: aut si corruptum est quod excernit-  
 ur: aut si prima media febrē non sustulit: aut si sanguinem mitti, cū  
 opus sit: uires non patiuntur: tempusue eius rei præterijt. aut si mul-  
 tum ante morbū aliquis portauit: aut si is qui sæpe, uel sponte, uel casu  
 purgatus est: subito habet aluū supressam. Seruanda uero illa sunt, ne  
 ante diem tertiu ducatur: ne ulla cruditate substance, ne in corpore in-  
 firmo, diuq; aduersa ualetudine exhausto: ne ue in eo, cui satis alius  
 reddit cotidie, quiue eam liquidam habebit: ne in ipso accessionis in-  
 petu, quæ quod tum infusum est, alio continetur: regeſtumq; in caput  
 multo grauius piculū efficit. pridie uero abstinere debet æger: ut aptus  
 tali curationi sit. Eodē die ante aliquot horas aquā calidā bibere, ut  
 superiores eius ptes madescat: tum imittēda in aluū est: si leui medici-  
 na cōtēti sumus: pura aqua, si paulo ualētiori: mulsa, si leni, ex aqua in

qua foenum græcum uel ptisana uel malua decocta sit. si reprimendi causa: ex uerbenis. acris autem est marina aqua uel alia, sale adiecto: atque utraq; decocta commodior est. Acrior fit adiecto uel oleo elunistro uel melle quoque. si acrior est: eo plus extrahit: sed minus faciel sustinetur. Id quod infunditur: neque frigidum esse oportet: neque calidum: ne alterutro modo lædat. Cum infusum est: quantum fieri potest continere se in lectulo debet æger: nec primæ cupiditati deiectionis protinus cedere. ubi necesse est, tum demum residere. fereque eo modo deempta materia superioribus partibus leuatis morbum ipsum moluit. Cum uero, quoties res coegit, desidendo aliquis se exhaustit: paulisper debet conuiescere, et ne uires deficiant: utique eo die cibum assumere. qui plenior an exiguus sit dandus: ex ratione eius affectionis, quæ expectabitur, aut in metu non erit, æstimari oportebit.

## De uomitu. Caput. XII.

Uomitus ut in secunda quoque ualitudine sæpe necessarius biliosus est: sic et in his morbis, quos bilis concitauit. Ergo omnibus, qui ante febres horrore, et tremore uexantur: omnibus, qui cholera laborant: omnis est et cum quadam hilaritate insanientibus, et comitiali quoque morbo oppressis, necessarius est. Sed si acutus morbus est, sicut in cholera: si febris est, ut inter horrores: asperioribus medicamentis opus non est: sicut in deiectionibus quoque supra dictum est. satisque est ea uomitus causa sumi: quæ sanis quoque sumenda esse proposui. At ubi longi ualentesque morbi sine febre sunt, ut comitialis, aut insania: ueratro quoque albo utendum est: id neque hyeme, neque æstate recte datur: optime uere: tolerabiliter autumno. quisquis daturus erit, id agere ante debet, ut accepturi corpus humidius sit. Illud scire oportet, omne eiusmodi medicamentum, quod potui datur, non semper ægris prodesse: semper sanis nocere.

## De frictione. Caput. XIII.

E frictione uero, et gestatione adeo multa Asclepiades tanquam inuentor eius persequitur: quod in eo uolumine, quod communium auxiliorum scripsit: cum trium tantum facere mentionem, uinis. s. et aque, et gestationis: tamen maximam partem in hoc consumpsit. Oportet autem neque recentiores uiros in his fraudare: quæ uel reppererunt: uel recte secuti sunt. Et tamen ea, quæ apud antiquiores aliquos posita sunt: authoribus suis reddere. Neque dubitari potest quin latius quidem

Et dilucidius ubi, et quomodo frictione utendū esset, Asclepiades præceperit: nihil tamen reppererit, quod non à uetustissimo auctore Hippocrate paucis uerbis cōprehensum sit: qui dixit. frictione, si uehementis sit, durari corpus: si lenis, molliari: si multa, minui: si modica, impleri. Sequitur ergo ut tum utendum sit: cum aut astringendum corpus sit, quod fluēs est: aut moliendū quod induruit: aut digerendū in eo quod copia nocet. aut alendum id quod tenuē: et infirmum est. Quas tamen species si quis curiosius æstimet, quod iam ad medicum non pertinet: facile intelliget omnes ex una causa pendere, quæ demit. Nam et astringitur aliquid eo dempto: quod interpositum, ut id laxaretur, effecerat. Et molliatur eo detracto, quod duriciæ creabat: et impletur non ipsa frictione, sed eo cibo: qui postea usque ad cūtem digestionē quadam relaxatam penetrat. Diuersarum uero rerū in modo causa est. Inter unctionem autem, et frictionem multum interest. Vng. n. leuiterque pertractari corpus est in acutis, et recentibus morbis oportet: in remissione tamen, et ante cibum. Longa uero frictione uti neque in acutis morbis, neque in crescentibus conuenit: præter quæ cum phrenitias somnus ea requiritur. Amat autem hoc auxiliū ualeitudo longa, et est à primo impetu inclinata. Neque ignoro quosdā dicere omne auxiliū necessarium esse incrementibus morbis: non cum iam per se finiuntur. quod non ita se habet. Potest. n. morbus etiam qui per se finem habiturus est: citius tamen adhibito auxilio tolli. quod duabus de causis necessarium est: ut et quæ primum bona ualeitudo contingat: et ne morbus qui remanet, iterum quamuis leui de causa exasperetur. Potest. n. morbus minus grauis esse quæ fuerit: neque ideo tamen solui: sed reliquiis quibusdā inherere: quas admotum aliquod auxiliū discutit. sed ut lenata quoque aduersa ualeitudine recte frictio adhibetur: sic nunquam adhibenda est sebre incremente. Verum si fieri poterit, cum ex toto corpus ea uacabit: minus certe cum ea remisserit. Eodem autem modo in tutis corporibus esse debet: ut cum infirmus aliquis implendus modo est in partibus: aut quia ipsius membri imbecillitas id requirit: aut quia alterius. Nam et capitis longos dolores ipsius frictio leuat: non in impetu tamen doloris, et membrum aliquod resolutum ipsius frictione confirmatur. Longe tamen sæpius aliud perfricandum est, cum aliud dolet: maximeque cum à summis, aut à medijs partibus corporis euocare materiā uolumus: ideoque extremas partes perfricamus. Neque audiendi sunt, qui numero finiunt quoties aliquis perfricandus sit. Id enim ex uiribus hominis colligendum est. Et si is qui per infirmus est: potest satis esse, quinquages. si robustior potest, ducenties esse faciendum. Inter utrumque deinde prout uires sunt. Quo fit ut et minus sæpe in



muliere, quàm in uiro: minus saepe in puero, uel sene, quàm in iuvene manus dimouendæ sint. Deniq; si certa membra perfriquantur: multa, ualentiq; frictione opus est. Nam neq; totum corpus infirmari cito per partem pòt: & opus est quã plurimũ materiæ digerri: siue id ipsum membrum, siue per id aliud leuamus. At ubi totius corporis imbecillitas hanc curationẽ per totum id exigit: breuior esse debet, & lenior: ut tantummodo summam cutem emolliat: quo facilius capax ex recẽti cibo nouæ materiæ fiat. In malis iam ægrum esse testatur: ubi exterior pars corporis friget: interior cum siti calet: ut supra posui. Sed tunc quoq; unicum in frictione præsidium est: quæ si calore in cutem euocauit: potest alicui medicinæ locum facere.

## De gestatione. Caput. XIII.

Estatio quoq; longis etiam, & inclinatis morbis aptissima est. utilisq; est & his corporibus, quæ iam ex toto febre carent: sed adhuc exerceri per se nõ possunt: & his quibus lentæ morborũ reliquiæ remanent: neq; aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti, uehementiq; febre, præcipueq; ardente, ad discutiedam eam, gestatione dixit utendum esse: sed id periculose fit: meliusq; quiete eiusmodi impetus sistinetur. si quis tamen experiri uolet: sic experiatur. si lingua non erit aspera: si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor uisceribus, aut capiti, aut præcordijs suberit. et ex toto nunquã gestari corpus dolens debet: siue id in toto, siue in parte est: nisi tamen solis nervis dolentibus, neq; unquam in recenti febre, sed in remissione eius. Genera autem gestationis plura sunt adhibenda: quæ sunt et pro uiribus cuiusq;, & pro opibus: ne aut imbecillam hominem nimis digerant: aut humili obsint. Gestationum lenissima est naui, uel in portu, uel in flumine. uehementior in alto mari naui, uel lectica, aut scanno: acrior uehiculo. Atq; hæc ipsa & intendi, & leniri possunt. si nihil horum est, suspendi lectus debet: & moueri. si ne id quidem est: at certe uni pedi lecti subiiciendus funiculus est: atq; ita lectus huc, & illuc manu impellendus. Et lenia quidem genera exercitationis infirmis conueniunt. Valentiora uero his qui iam pluribus diebus febre liberati sunt: aut his qui grauium morborum initia sic sentiunt: ut adhuc febre uacent. Quod & in tabe, et in stomachi uitijs, & cum aqua cutem subiit, & interdum in morbo regio fit: aut ubi quidã morbi, qualis comitialis, qualis insania ẽ sine febre, quantum diu manent. In quibus affectibus ea quoq; genera exercitationum necessaria sunt, quæ cõprehendimus eo loco: quo quemadmodum sani, neq; firmi homines se gererent: præcipimus.

Abstinentiæ uero duo genera sunt: alterum ubi nihil assumit æger: alterum ubi non nisi quod oportet. Initia morborum primum famem, sitimq; desiderant: ipsi deinde morbi, moderationem: ut neq; aliud quàm expedit: neq; eius ipsius nimium sumatur. Neq; enim conuenit iuxta in mediam protinus facietatem esse. Quod si sanis quoq; corporibus inutile est: ubi aliqua necessitas famem fecit: quanto inutilius est in corpore ei ægro? Neq; ulla res magis adiuvat laborantem, q̃ tempestiua abstinentia. Intemperantes homines apud nos, ipsi cibi tempora curantibus dant. Rursus alij tempora medicis pro dono remittunt: sibi ipsis modum uē dicant. Liberaliter agere se credunt qui cætera illorum arbitrio relinquunt: in genere cibi liberi sunt: quasi quæretur qd medico liceat: non quid ægro salutare sit: cui uehemēter nocet, quotiens in eius quod assumitur uel tempore, uel modo, uel genere peccatur.

## De sudore. Caput. XVI.

Vdor etiam duobus modis elicitur: aut siccitate calore, aut balneo. Siccus calor est, & harenæ calidæ, & laoniacæ, & clibanæ, et quarundam naturalium sudationes. ubi è terra profusus calidus uapor ædificio includitur: sicut sup̃ basas in myrtetis habemus. Præter hæc sole quoq; et exercitatioe us mouetur. Vtiliaq; hæc genera sunt quoties humor intus nocet: usq; digerendus est. Ac neruorum quoq; quedam uitia sic optime curantur: sed cætera infirmis possunt conuenire. solet exercitatio tantum robustioribus, qui tamen sine febre, uel initio morbi, uel èt grauius morbis tenentur. Cauendum autem est nequid horum uel in febre, uel in cruditate tentetur. At balnei duplex usus est. nam modo discussis febribus initium cibi plenioris, uiniq; firmioris ualeitudini facit: modo febrem ipsam tollit: fereq; adhibetur, ubi summam calorem relaxari, euocariq; corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit. antiqui timidius eo utebatur. Asclepiades audacius. Neq; terrere autem ea res, si tempestiua est: debet. & ante tempus nocet. Quisquis febre liberatus est: simulatq; ea uno die non accessit: eo, qui proximus est, post tēpus accessionis, tuto lauari potest. At si circuitum habere ea febris solita est, sic, ut tertio, quarto ue die reuertatur: quandoq; non accessit: balneum tutum est. Manentibus uero adhuc febribus, si hæc sunt lentæ, lienesq; iam diu male habent: recte medicina ista tentatur: cum eo tamen ne præcordia dura sint:

ne'ue ea tumeant: ne'ue lingua aspera sit: ne'ue aut in medio corpore, aut in capite dolor ullus sit: ne'ue tum febris increſcat. At in his quidem febribus, quæ certum circuitum habent, duo balnei tempora ſunt: alterum ante horrorem, alterum febre finita. In his uero, qui lenis febriculis diu detinentur: cum aut ex toto reſſit acceſſio: aut ſi id non ſolet, certe lenita eſt: iamq; corpus tam integrum eſt: quàm maxime eſſe in eo genere ualetudinis ſolet: imbecillus homo iturus in balneum uitare debet: ne ante frigus aliquod experiatur. Vbi in balneum uenit, pauliſper reſiſtere: experiſq; num tempora aſtringantur: Et an ſudor aliquis oriatuſ. Illud ſi incidit, hoc non ſecutum eſt: inutile eo die balneum eſt: perungendus eſt is leniter, Et auferendus eſt: uitandumq; omnimodo frigus: Et abſtinentia utendum. At ſi temporibus integris primum ibi, deinde alibi ſudor incipit: fouendum os aqua calida: tū in ſolio deſidendum eſt: atq; ibi quoq; uidendum, num ſub primo cōtactu aquæ calidæ ſumma cutis inhorreſcat: quod nix tamen fieri po teſt, ſi priora recte ceſſerunt. certum id autem ſignum inuiliſ balnei eſt. Ante uero, an poſteaquam in aquam calidā ſe demittat: aliquis perungi debeat: ex ratione ualetudinis ſuæ cognoſcat. Ferè tamen, niſi ubi nominatim, ut poſtea fiat, id præcipietur: moto ſudore leniter corpus perungendum: deinde in aquam calidam demittendū eſt. atq; hic quoq; habenda uirium ratio eſt. Neq; committendum ut per aſtum anima deſiciat: ſed maturius is auferendus: curioſeq; in ueſti mentis inuoluendus eſt. ut neq; ad eum frigus aſpiret: Et ibi quoq; antequam aliquid aſſumat: inſudet. Fomenta quoq; calida ſunt miliū, ſal, harena, quodlibet eorum calefactum, et in linteum coniectum. Si minore ui opus eſt: etiam ſolum linteū. At ſi maiore: extinſi titiones, inuolutiq; panniculi, Et ſic circumdati. Quin etiam calido oleo replentur utriculi: Et in uafa fictilia: ad ſimilitudinem, quas lenticilas uocant: aqua coniicitur: Et ſal ſiccō linteo excipitur. demittiturq; in aquam bene calidam. tum ſuper id membrum, quod fouendum eſt: collocatur: iuxtaq; igne ferramenta duo ſunt capitulis paulo latioribus: alterumq; ex his demittitur in eū ſalem: Et aqua ſuper leniter aſpergitur. ubi frigere cœpit, ad ignem refertur: Et idem in altero fit: deinde inuicem in utroq; inter quæ deſcēdit ſaluſ, Et caliduſ ſuauiſ: qui contractis aliquo morbo neruiſ opitulatur. His omnibus commune eſt digere id quod uel præcordia onerat: uel fauces ſtrangulat: uel in aliquo membro nocet. Quando autem quoq; utendū ſit, in ipſis morborum generibus dicitur.

Qui abi,



Qui cibi, potiones'ue, aut ualentis, aut mediæ, aut imbecillæ materiæ sint. Caput. XVII.

Vm de his dictum sit, quæ detrahendo inuuant: ad ea ueniendum est, quæ nos alunt: id est cibum, & potionem. hæc aut non omnium tantum morborum, sed et secundæ ualentudinis cōia præsidia sunt. Pertinetq; ad rem omnium proprietates nosse. primum ut sani sciant quomodo his utantur. deinde ut exsequentibus nobis morborū curationem, liceat species rerum, quæ assidue necessariæ erunt: subiungere. neq; necesse est subinde singulas eas nominare. Scire igitur oportet omnia legumina, quæq; ex frumentis panificia sunt, generis ualentissimi esse. Id ualentissimum uoco: in quo plurimum alimenti est: item omne animal quadrupes domesticum: omnem grandem feram, quales sunt capreæ, ceruus, aper, onager, omnem grandem auem, quales sunt anser, & pavo & grus: omnes beluas marinas, ex quibus cetos est: quæq; his pares sunt. Item mel, & caseum quo minus mirum est, opus pistorium ualentissimum esse: quod ex frumento, adipe, melle, caseo constat. In media uero materia numerari ex oleribus debere ea: quorum radices uel bulbos assuimus. Ex quadrupedibus leporem aues omnes à minimis ad phoenixpterum. item pisces omnes, qui salem non patiuntur: solidi'ue saluntur. Imbecillissimam uero materiam esse omne olus: & quicquid in cauliculo nascitur: qualis est cucurbita, & cucumis, & capparitis, omnia poma, oleas, coctas, itemq; cōchilia. Sed quantum hæc ita discretæ sunt: tamen et quæ sub eadem specie sunt: magna discrimina recipiunt: aliaq; res alia, uel ualentior est, uel infirmior. Si quidem plus alimenti est in carne, quàm in ullo alio. Firmitus est triticum, quàm milium: id ipsum: quàm hordeum: et ex tritico firmissima siligo: deinde similia: deinde cui nihil ademptum est, quod αὐτότυπον græci uocant: infirmior est. ex polline infirmissimus cibarius panis. Ex leguminibus uero ualentior faba, uel lenticula, quàm pisum. Ex oleribus ualentior rapa, napiq; & omnes bulbi: in quibus cepam quoq; & allium minus: quàm pastinacæ, uel quæ specialiter radícula appellatur. Item firmitus brassica, et beta, & porrum: quàm lactuca, uel cucurbita, uel asparagus. At ex fructibus surculorum ualentiores unæ, ficus, nuxes, palmulæ: quàm quæ poma proprie nominantur. Atq; ex his ipsis firmitiora, quæ succosa: quàm quæ fragilia sunt. Itemq; ex his auibus, quæ in media specie sunt: ualentior ea quæ pedibus: quàm quæ uolatu magis nititur: & ex his quæ uolatu fidunt: firmitiores sunt quæ grædiōres: quàm quæ minutæ sunt, ut ficedula, et turdus: Atq; ea quoq;

quæ in aqua degunt, leuiorem cibum præstant: quàm quæ natandi  
 scientiam non habent. Inter domesticas uero quadrupedes leuissima  
 suilla est: grauiissima bubula. Itemq; ex feris quo maius quodq; ani-  
 mal, eo robustior ex eo cibus est. Pisciumq; eorum, qui ex media mate-  
 ria sunt, quibus maxime utimur: tamen grauiissimi sunt: ex quibus sal-  
 samenta quoq; fieri possunt: qualis lacertus est. deinde qui quamuis te-  
 neriores: tamen duri sunt, ut aurata, coruus, scarus, oculata, tum plani,  
 post quos etiam leuiiores lupi, muliq;, & post hos omnes saxatiles.  
 Neq; uero in generibus rerum tantummodo discrimen est: sed etiã in  
 ipsis: quod & ætate fit, & membro, & solo, et cælo, et habitu. nã qua  
 drupes animal omne si lactans est, minus alimenti præstat. Item quo  
 tenerior pullus, cohortalis est. In piscibus quoq; media ætas, quæ non  
 dum summam magnitudinem impleuit. Deinde ex eodem sue ungu-  
 læ, rostrum, aures, cerebellum. Ex agno, hedonæ cum pectolis totum  
 caput aliquanto quàm cætera membra leuiora sunt: adeo ut in me-  
 dia materia poni possint. Ex auibus pectora, colla, alæ uel recte infir-  
 mis annumerantur. Quod ad solum uero pertinet: frumentum quoq;  
 ualentius est collinum, quàm campestre. leuior piscis inter saxa edi-  
 tus, quàm in harena: leuior in harena, quàm in limo. Quo fit, ut ex  
 stagno, uel lacu, uel flumine eadẽ genera grauiora sint. Leuiorq; qui  
 in alto, quàm qui in uado uixit. Omne etiam ferum animal dome-  
 stico leuius, & quodcunq; humido cælo, quàm quod sicco natum est.  
 Deinde eadem omnia pingua, quàm macra: recentia, quàm salsa,  
 noua, quàm uetusta plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit  
 iurulenta, quàm assa: magis assa, quàm elixa. Ouum durum ualen-  
 tissimæ materiæ est: molle, uel sorbile, imbecillissimæ. Cum quæ panifi-  
 cia omnia firmissima sint: elota tamen quædam genera frumenti, ut  
 alica, oriza, pisanæ, uel ex hisdẽ facta sorbitio, uel pulticula. Et aqua  
 quoq; madens panis imbecillissimis annumerari potest. Ex potioni-  
 bus uero quæcunq; ex frumento facta est: itemq; lac mulsus, defru-  
 tum, passum, uinum aut dulce, aut uehemens, aut mustum, aut magnæ  
 uetustatis, ualentissimi generis est. At acetum, & id uinum: quod pau-  
 corum annorum, uel austerum, uel lene est: in media materia est.  
 Ideoq; infirmis nunquam generis alterius dari debet. A qua omniũ  
 imbecillissima est. firmitorq; ex frumento potio est, quo firmitus fuit  
 ipsum frumentum. firmitior ex eo uino, quod bono solo, quàm quod  
 tenui: quodq; temperato cælo, quàm quod aut nimis humido, aut ni-  
 mis sicco: nimisq; aut frigido, aut calido natum est. Mulsus quo  
 plus mellis habet: defrutum quo magis incoctum est: passum quo ex  
 ficiore uina est: eo ualentius est. A qua leuissima pluuialis est: deinde

fontana: tum ex flumine, tum ex puteo: post hæc ex niue, aut glacie. grauior his ex lacu: grauiſſima ex palude. Facilis etiam & neceſſaria cognitio eſt naturam eius requirentibus. nam leuis pondere apta pareretur ex his quæ pondere pares ſunt, eo melior quæq; eſt: quo celerius & caleſcit, & frigeſcit: quoq; celerius ex ea legumina percoquantur. ſerè uero ſequitur ut quo ualentior quæq; materia eſt: eo minus facile concoquatur: ſed ſi concocta eſt, plus alar. Itaq; utendum eſt materiæ genere pro uiribus: modusq; omnibus pro genere ſumendus. Ergo imbecillis hominibus rebus inſirmiſſimis opus eſt. mediocriter firmos media materia optime ſuſtinet. & robuſtis apta, ualidiſſima eſt. Plus deinde aliq; aſſumere ex leuioribus poteſt, magis in his quæ ualentiffima ſunt, temperare ſibi debet.

Quæ natura, ac proprietas cuiusq; rei ſit, quæ uel ſcimus.

Caput. XVIII.

Eq; hæc ſolo discrimina ſunt: ſed etiã aliæ res boni ſucci:  
 n aliæ mali ſunt: quas οὐχὺ λαρ, uel κακοχὺ λαρ græci uocant. Aliæ lenes, aliæ acres: aliæ craſſiorem pituitam in nobis faciunt, aliæ tenuiorẽ: aliæ idoneæ ſunt ſto macho: aliæ alienæ ſunt. Itemq; aliæ inſtant: aliæ ab hoc abſunt. aliæ caleſcunt: aliæ refrigerant: aliæ facile in ſto macho acceſcunt: aliæ non facile intus corrumpuntur. aliæ mouent alium: aliæ ſupprimunt. aliæ citant urinam: aliæ tardant. Quædam ſomnum mouent: quædam ſenſus excitant. Quæ omnia ideo noſcenda ſunt, quoniã aliud aliter, uel corpori, uel ualeitudinĩ conuenit.

Quæ res boni ſucci ſint. Caput. XIX.

b Oni ſucci ſunt triticum, ſiligo, alia, oriza, amilũ. Itẽ et lenes ſunt, & ſto macho aptæ: et caleſcunt tragem, ptiſana, lac, caſeus mollis, omnis uenatio, omnes aues, quæ ex media materia ſunt. Ex maioribus quoq; hæc, quas ſupra nominauimus. Mediũ inter teneros, durosq; piſces, ut mulus, & lupus, uerna, lactuca, urtica, malua, cucumis, cucurbita, ouũ ſorbile, portulaca, cochlea, palmulæ. ex pomis quodcunq; neq; acerum, neq; acidũ eſt. Vinum dulce uel lene, paſſum, defrutum: olea quæ ex his duobus in aliter ſeruata ſunt: uulua, roſtra, trunculiq;. In ſumma omnis pinguis caro, omnis glutinoſa, omne iecur.



Ali uero succi sunt milium, panicum, hordeum, legumina, caro domestica permacra, omnisq; caro salsa, omne falsamentum, garu: uetus caseus, cicer, radícula, rapa, napi, bulbi, brassica: magisq; et cyma eius, asparagus, beta, cucumis, porrum, eruca, nasturcium, thymum, nepeta, satyria, hyssopum, ruta, anethum, feniculum, cuminum, anisum, lapatium, sinapi, et allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcunq; acidum, uel acerbum est: acetum, omnia acria, acida, acerba, oleum: pisces quoq; saxatiles, omnesq; qui ex tenerrimo genere sunt: aut hi qui rursus nimium duri: uirosiq; sunt: ut ferè quos stagna, lacus, limosi uel riui ferunt: qui uel in nimiam magnitudinem excesserunt.

## Quæ res lenes: quæ uel acres sint. Caput. XXI.

Enes autem sunt sorbitiones, pulicula, lagnum, amilum, ptisana, pinguis caro, et quæcunq; glutinosa est. Quod ferè quidem in omni quæ domestica fit: præcipue tamen in ungulis, trunculisq; suum: in pectiolis, capitulisq; hedorum, et uitulorum, et agnorum: omnibusq; cerebellis. Item si qui proprie bulbi nominantur: lac, defrutum, passum, nuclei pinei. Acria sunt omnia nimis austera: omnia acida, omnia salsa, et mel quidem quo melius est: eo magis. Item allium, cepa, eruca, ruta, nasturcium, cucumis, beta, brassica, asparagus, sinapi, radícula, intubus, ocymum, lactuca, maximaq; olerum pars.

## Quæ res crassiorè, quæ uel tenuiorem pituita faciunt. Caput. XXII.

Crassiorè autem pituitam faciunt omnia sorbilia, alicia, oriza, amilum, ptisana, lac, bulbi, omniaq; ferè glutinosa. Extenuant eandem omnia salsa, atq; acria, et acida.

## Quæ res stomacho idoneæ sunt. Caput. XXIII.

Stomacho autem aptissima sunt quæcunq; austera sunt: et quæ acida sunt: quæq; contacta sale modico sunt. Item panis sine fermento, et elota alicia, uel oriza, uel ptisana: omnis auis, omnis uenatio, atq; utraq; uel assa, uel elixa. Ex domesticis animalibus bubula. Si quid ex cæteris sumitur, macrum potius,

potius, quàm pingue. Ex sue ungulæ, rostra, aures, uulua, sterilesq;. Ex oleribus intubus, lactuca, pashnaca, cucurbita elixa, si fer. Ex pomis cerasium, morum, sorbum, pirũ fragile, quale crustuminum uel neauianum est. Item pira quæ reponuntur tarëtina, atq; signina. Malum orbiculatum, aut scandianum, uel amerinum, uel cotoneũ, uel punicum absinthium. Vuæ ex olla, molle ouum, palmulæ, nuclei pinei, oleæ albæ ex dura muria, eadem aceto intinctæ, uel nigræ, quæ in arbore bene permaturuerũt: uel quæ in passo, defruto ue seruata sunt. Vinum austerum, liat iam asperum sit: item resinatum. Duri ex media materia pisces, ostrea, pectines, murices, purpuræ, cochleæ, cibi, potionesq; uel frigida, uel feruentes, absinthium.

Quæ res alienæ stomacho sunt. Caput. XXIII.

Lienæ uero stomacho sunt omnia tepida, omnia salsa, omnia iurulenta, prædulcia, omnia pingua, sorbitio, panis, itemq; uel ex milio, uel ex hordeo, oleum, radices olerũ, et quodcunq; olus ex oleo, garo ue estur: mel, mulsu, defrutum, passum, lac, omnis caseus, una recens, ficus & uiridis, & arida, legumina omnia, quæq; inflare consueuerunt. item thymum, nepeta, satureia, hyssopum, nasturtium, lapatum, lapsanum, iuglandes. Ex his autem intelligi potest non quicquid boni succi est, protinus stomacho conuenire: neq; quicquid stomacho conuenit, protinus boni succi esse.

Quæ inflant, aut inflationem leuant. Caput. XXV.

Inflant autem omnia ferè legumina, omnia pingua, omnia dulcia, omnia iurulenta, mustum, atq; etiam id uinum, cui nihil adhuc ætatis accessit. Ex oleribus alium, cepa, brassica, omnesq; radices excepto sifere & pashnaca: bulbi, ficus etiam arida, sed magis uirides: una recentes, nuges omnes exceptis nucleis pineis: lac, omnisq; caseus, quicquid deinde subcrudũ aliquis assumpsit. Minima inflatio fit ex uenatione, aucupio, piscibus, pomis, oleis, conchilijs, ouis uel mollibus, uel sorbilibus, uino uctere. Fœniculum uero, & anetum inflationes etiam leuant.

*vinum non inflat*

Quæ res aut calefaciunt, aut refrigerant. Caput. XXVI.

Calefaciunt piper, sal, atro omnis iurulenta, alliu, cepa, ficus arida, salsamentum, uinum, & quo meracius est, eo

Aurelij Cor.

d ij

magis. refrigerant olera, quorum crudi caules assumuntur, ut intubus, & lactuca. Item coriandrū, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasia, mala austerā, pira fragilia, caro elixa, præcipueq; acetū, siue cibus ex eo, siue potio assumitur.

Quæ res intus facile uitiuntur, uel minime corrumpuntur.

Caput. XXVII.

Acile autem intus corrumpuntur panis fermentatus, & f quisquis alius, quàm ex tritico est: lac, mel, idcoq; lactantia, atq; omne pistoriū opus, teneri pisces, ostrea, olera, ca seus & recens, & uetus, crassa uel tenera caro, uinū dulce, mulsū, defrutum, passum, quicquid deinde uel iurulentum est, uel nimis dulce, uel nimis tenue. At minime intus uitiuntur, panis sine fermento, aues, et eæ potius duriores, aurati pisces, neq; solū aurata pura, aut scarus, sed etiā loligo, locusta, polypus. Item bubula, omnisq; dura caro, eademq; aptior est si macra, si salsa est. omniaq; salsamenta, cochleæ, murices, purpuræ, uinum austerum, uel resinatum.

Quæ res aluum mouent. Caput. XXVIII.

T aluum mouent panis fermentatus, magisq; si cibarius, a uel hordeaceus est. brassica, si subcruda est lactuca, anethum, nasturcium, ocymum, urtica, portulaca, radícula, capparis, allium, cepa, malua, lapatium, beta, asparagus, cucurbita, cerasia, mora, uua, omnia mitia, ficus etiam arida, sed magis uiridis, uuae recentes pingues, minutæ aues, cochleæ, garum, salsamenta, ostrea, pelorides, echini, musculi, & omnes ferè conchulæ, maximeq; ius earū, saxatiles, & omnes teneri pisces, sepiarū atramentum: si qua caro assumitur pinguis, eadem uel iurulenta, uel elixa: aues quæ natant, mel crudū, lac, lactantia omnia, malsū, uinum dulce, uel falsū, aqua, tenera omnia tepida, dulcia, pingua, elixa iurulenta, falsa, diluta.

Quæ res aluum astringant. Caput. XXIX.

Contra astringunt panis ex siliigne, uel ex simila, magis c si sine fermento est: magis etiam si ustus est: intenditurq; uis eius et si bis coquitur. pulicula uel ex halica, uel ex panico, uel ex milio. itemq; ex hisdem sorbitio, & magis



si hæc ante fricta sunt. lenticula, cui uel beta, uel intubus, uel ambubeia, uel plantago adiecta est, magisq; et si illa ante fricta est: per se etiam intubus uel ex plantagine, uel ambubeia fricta: minuta olera, brassica bis decocta, dura oua, magisq; si assa sunt: minuta aues, morula, palumbus, magisq; si in posca decoctus est: graues quoq; aues, quæ magis currunt, quàm uolant: lepus, caprea, iecur ex his, quæ seuis habent, maximeq; bubulum, ac seuum ipsum, caseus: qui uehementior uetustate fit, uel ea mutatione quam in caseo transmarino uidemus: aut si recens est ex melle, mulso ue decoctus. Itè nul coctum, pira immatura, sorba, magisq; ea: quæ torminalia uocantur, mala cydonia, et punica, olea uel albæ, uel permaturæ, myrta, palmula purpurea, murices, uinū resinatum uel asperū: item meracum, acetum mulsum quod inferbuit: item de frutū, passum, aqua uel tepida, uel præfrigida dura, idest ea quæ tarde purescit, ideoq; plura potissimum: omnia dura, macra, austera, aspera, testa, et in eadē carne: assa potius, quàm elixa.

Quæ res urinam mouent. Caput. XXX.

Urinam aut mouent quæcunq; in horto nascentia boni odoris sunt, ut apium, ruta, anethū, ocymum, menta, hyssopum, anisum, coriandrū, nasturciū, crucca, foeniculū. Præter hæc asparagus, capparitis, nepeta, thymum, satureia, lapsanū, pastinaca, magisq; agrestis, radícula, sifer, cepa. Ex uenatione maxime lepus, uinum tenue, piper et rotundum, et longum, sinapi, absinthium, nuclei pinei.

Quæ res somnum mouent, aut sensus excitant. Caput. XXXI.

Omno uero aptum est papauer, lactuca, maximeq; aestiua, cuius cauliculus iam lacte repletus est: morum, porrum. Sensus exatāt nepeta, thymum, satureia, hyssopum, præcipueq; puleium, ruta, et cepa.

Quæ res corpus aut erodant, aut reprimant, aut refrigerent, aut calefaciant, aut durent, aut emolliant. Caput. XXXII.

Vocare uero materiam multa admodum possunt. sed ea quæ ex peregrinis medicamentis maxime constant: alijsq; magis, quàm quibus ratione uictus succurritur, opitulatur: in præsentia differam. Ponam ea uero quæ præptæ, et his morbis de quibus protinus dicturus sum, apta: corpus erodunt:

Et sic eo quod mali est, extrahunt. Habent autē hanc facultatem se-  
 mina eruce, nasturcij, radiculæ præcipue tamē omnium sinapi Salis  
 quoq; Et fici eadem vis est. leniter uero simul Et reprimunt, Et  
 molliunt lana succida uel aceto, uel uino: quo oleum adiectum est.  
 contrita palmulæ: furfures in salsa aqua, uel aceto decoctæ. At si-  
 mul reprimunt Et refrigerant herba muralis, pa- themum uel perdi-  
 cium appellant: serpillum, puleium, ocymum, herba sanguinalis, quam  
 græci ποταμόριον uocant: portulaca, papaueris folia, capreoliq; uitū,  
 coriandri folia, hyoscyamū, muscus, sisser, apiū, solanum, quā σπόχρον  
 græci uocant: brassicæ folia, intubus, plantago, fœniculi semen, contrita  
 pira uel mali, præcipueq; cydonia, lenticulæ, aqua frigida maximēq;  
 pluuialis, uinum, acetum, Et ex horum aliquo magis, madens uel pa-  
 nis, uel farina, uel spongia, uel anis, uel lana succida, uel etiam linteo-  
 lum, creta cimolia, gypsum, melinum, myrteum, rosa, acerbum oleum,  
 uerbenarū contusa cum teneris caulibus folia: cuius generis sunt olea,  
 cypressus, myrtus, lentiscus, tamaris, ligustrum, rosa, rubus, laurus, he-  
 dera, punicum malum. sine frigore autem reprimunt cocta mala cy-  
 donia, malicoriū, aqua calida, in qua uerbenæ coctæ sunt, quas supra  
 proposui: puluis uel ex fece uini, uel ex myrti folijs, amarae nuxes. Ca-  
 lesfacit uero ex qualibet farina cataplasma, siue ex tritici, siue ex far-  
 ris, siue hordei, siue erui, uel lolij, uel milij, uel panici, uel lenticulæ, uel  
 fabæ, uel lupini, uel lini, uel fœni græci, ubi ea deferbuit, calidaq; im-  
 posita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quā ex  
 aqua cocta. Præterea cyprinum, irinum, medulla, adeps ex felle iun-  
 ctæ oleo, magisq; si uetus est: sal nigrum, gut, piper, quinq; folium, fe-  
 req; quæ uehementer Et reprimunt, Et refrigerant. Durant quæ ca-  
 lesfaciunt, Et digerunt, Et emolliunt. Præcipueq; ad emolliendum po-  
 test cataplasma ex lini, uel fœni græci semine. His autem omnibus Et  
 simplicibus, Et permixtis uarie medici utuntur: ut magis quid quisq;  
 persuasērit sibi appareat: quā quid euidenter compererit.

## De morborum generibus. Caput. I.

Rouisis omnibus, quæ pertinent ad uniuersa genera morborum, ad singulorū curationes ueniam. Hos autem in duas species græci diuiserunt: aliosq; ex his acutos, alios longos esse dixerunt. Idq; quoniam nō semper eodem modo respondebant: eosdem alij inter acutos, alij inter longos retulerunt. Ex quo plura eorū genera esse manifestum est. Quidam enim breues utiq; sunt, qui cito uel tollunt hominem: uel ipsi cito finiuntur. Quidam longi, sub quibus neq; sanitas in propinquo, neq; exitium est. Tertiumq; genus eorum est, qui modo acuti, modo longi sunt. idq; non in febribus tantummodo, in quibus frequentissimum est: sed in alijs quoq; fit. Atq; etiam præter hos quartum est, quod neq; acutum dici potest, quia non perimit: neq; utiq; longum, quia si occurrat, facile sanatur. Ego cum de singulis dicam: qui cuiusq; generis sit indicabo. diuidam autem omnes in eos, q; in totis corporibus consistere uidentur: & eos qui oriuntur in partibus. incipiam à prioribus pauca præfatus de omnibus. In nullo quidē morbo minus fortuna sibi uendicare: quàm ars potest: ut pote cum re pugnante fortuna nihil medicina proficiat. magis tamen ignoscendū medico est parum proficenti in acutis morbis, quàm in longis. Hic enim breue spatium est: intra quod, si quod auxilium non profuit: æger extinguitur. ibi & deliberationi, & mutationi remediorū tempus patet: adeo ut raro, si inter initia medicus accessit: obsequens æger sine illius uitio pereat. Longus tamen morbus cū penitus insedit: quod ad difficultatem pertinet: acuto par est. & acutus quidē quo uetustior est: longus autem quo recentior: eo facilius curatur. Alterū illud ignorari non oportet: quod non omnibus ægris eadem auxilia conueniunt. ex quo incidit, ut alia, atq; alia summi authores quasi sola uendicarent: prout cuiq; æsserant. Oportet itaq; ubi aliquid non respondit, non tanti putare authore, quanti ægrū: & experiri aliud, atq; aliud: sic tamen, ut in acutis morbis cito mutetur, quod nihil prodest: in longis, quos tempus ut facit, sic etiam soluit: non statim condemnatur, si quid non statim profuit. minus uero remoueat, si quid paulum saltem innat: quia profectus tempore expletur.



Quomodo morbi cognoscantur: Et an increscant, an consistant, an mutantur: Et qua ratione ab initio qui languere incipit, curari debeat, Caput. II.

Rotinus at inter initia scire facile est, quod acutus morbus, quis longus sit: non in his solis, in quibus semper ita se habet: sed in his quoque in quibus variat. Nam ubi sine intermissionibus accessiones, et dolores graues urgent: acutus morbus est. Vbi lenti dolores, lentæ uel febres sunt: et spacia inter accessiones porriguntur: acceduntque ea signa, quæ in priore uolumine exposita sunt: longum hunc futurum esse manifestum est. Videndum est est morbus an increscat, an consistat, an minuat: quia quædam remedia increscentibus morbis, plura inclinantibus conueniunt. eaque quæ decrecentibus apta sunt, ubi acutus increscens urget: in remissionibus potius experienda sunt. Increscit autem morbus dum grauioribus dolores, accessionesque ueniunt: hæcque et antequam proxime reuertitur: et postea desinunt. Atque in longis quoque morbis etiam tales notæ non habentibus, scire licet increscere: si somnus incertus est, si deterior concoctio, si foediores deiectiones, si tardior sensus, si pigrior mens, si percurrit corpus frigus, aut calor, si idem magis pallet. ea uero quæ contraria his sunt: decedentis eius notæ sunt. Præter hæc in acutis morbis serius æger alendus est: nec nisi iam inclinatis, ut primo dempta materia, impetum frangat. in longis maturius, ut sustinere spatium aduenturi mali possit. Ac si quando is non in toto corpore, sed in parte est: magis tamen ad rem pertinet uim totius corporis molliri, quam proprie partes ægre sanentur. Multum etiam interest ab initio, quis recte curatus sit, an perperam. quia curatio minus his prodest: in quibus assidue frustra fuit. si quis temere habitus adhuc integris uiribus uiuit: admota curatione momento restituitur. sed cum ab his coeperim, quæ notæ quasdam futuræ aduersæ ualentudinis exhibent: curationum quoque principium ab animaduersione eiusdem temporis faciam. igitur si quid ex his, quæ proposita sunt in adiit: omnium optima sunt quies, et abstinentia. si quid bibendum, aqua, idque interdum uno die fieri satis est. Interdum si terrentia manent, bident, proximèque abstinentiæ sumendus est cibus exiguis: bibenda aqua: postera die etiam uinum. deinde inuiam alternis diebus, modo aqua, modo uinum, donec omnis causæ motus finiatur. Per hæc non sæpe instans grauis morbus discutitur: plurimique falluntur, dum se primo die protinus sublato languore aut exercitatione, aut balneo, aut coacta deiectione, aut uomitu, aut sudationibus, aut nino sperant. non quo non

interdum id incidat, aut non decipiat: sed quo sæpius fallat, solâq; abstinentia sine ullo periculo medeatur. cū præsertim est pro modo terroris moderari liceat, & si leuiora inditia fuerint: satis sit à uino tantum abstinere: quod subtractū plusquam, si cibo quid dematur: adiunat. si paulo grauiora, satis sit non aquam tantū bibere, sed etiā cibo carnem subtrahere. interdū panis quoq; minus, quàm pro consuetudine assumere: humidoq; cibo esse contentum, et olere potissimum. satiq; sit, tum ex toto à cibo, à uino, ab omni motu corporis abstinere: cū uehementer notæ terruerunt. Neq; dubium est, quin uix quisquam, qui non dissimulauit, sed per hæc mature morbo occurrat: ægrotet.

### De febrium generibus, Caput. III.

Tq; hæc quidem sanis facienda sunt tantū causam metuentibus. sequitur uero curatio febriū: quod & in toto corpore, et uulgare maxime morbi genus est. Ex his una cotidiana, altera tertiana, altera quartana est. Interdum etiam longiore circuitu quedā redeunt. sed id raro euenit. In prioribus & morbi sunt, & medicinæ. At quartanæ quidē simplices sunt: incipiunt ferè ab horrore, deinde calor erumpit: finitaq; febre biduum integrum est. ita quarto die reuertitur. Tertianarū uero duo genera sunt: alterū eodem modo, quo quartana & incipiens, & desinens, illo tantum interposito discrimine, quod unum diem præstat integrum: tertio redit. Alterum longe perniciosius, quod tertio quidem die reuertitur: ex octo autem, & quadraginta horis ferè, sex, & triginta per accessionem occupat: interdum etiā uel minus, uel plus. neq; ex toto in remissione desistit: sed tantum lenius est. id genus pleriq; medici in uisitatione appellant. cotidianæ uero uariæ sunt, & multiplices. Aliæ enim protinus à calore incipiunt, aliæ à frigore, aliæ ab horrore. Frigus uero ubi extremæ partes membrorū inalgescunt: horrore ubi totū corpus intremit. Rursus aliæ sic desinunt, ut ex toto sequatur integritas. aliæ sic, ut aliquantū quidem minuat ex febre: nihilominus tamen quedā reliquæ remaneant, donec altera accessio accedat: ac sæpe aliæ uix quicquā aut nihil remittant: sed ita ut continent. Deinde aliæ feruore ingentem habent, aliæ tollerabilem: aliæ cotidie pares fiunt, aliæ impares. atq; inuicem altero die leniores, altero uehementiores: aliæ tempore eodem postridie reuertuntur. aliæ uel serius, uel celerius: aliæ diem, noctemq; accessionem, & deaccessionem implent: aliæ minus, aliæ plus: aliæ cum decedunt sudorem mouent: aliæ non mouent. atque aliās per sudorem ad integritatem

uenitur: aliis corpus tantum imbecillius redditur. Accessiones etiam modo singula singulis diebus fiunt: modo binæ, plures uel concurrunt. ex quo sæpe euenit ut cotidie plures accessiones, remissionesq; sint: sic tamen ut una quæq; alicui priori respondeat. Interdum uero accessiones quoq; confunduntur sic, ut neq; notari tempora earum, neq; spacia possint. Neq; uerum est quod dicitur à quibusdam, nullam febrem inordinatam esse, nisi aut ex uomica, aut ex inflammatione, aut ex ulcere. facilius enim semper curatio foret: si hoc uerum esset. Sed quod euidentes causæ faciunt: facere etiam abditæ possunt. neq; de re, sed de uerbo controuersiam mouent. qui cum aliter, aliterq; in eodem morbo febres accedant: non easdē inordinate redire: sed alias, aliasq; subinde oriri dicunt. quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret: etiā si uere diceretur. Tempora quoq; remissionum modo liberalia, modo uix ulla sunt.

#### De curationum diuersis generibus, Caput. IIII.

**T** februm quidem ratio maxime talis est. Curationum uero diuersa genera sunt: prout authores aliqui habent. A sclepiades officium esse medici dicit, ut tuto, ut celeriter, ut iocunde curet. id notum est: sed ferè periculosa esse nimium et festinatio, et uoluptas solet. qua uero moderatione utendū sit: ut quantum fieri potest, omnia ista cōtingant: prima semper habita salute in ipsis partibus curationum considerandū erit. et ante omnia queritur, primis diebus æger qua ratione continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis, concoctionem moliebantur: eo quod cruditatē maxime horrebant, deinde eam materiam, quæ lædere uidebatur: ducendo sæpius aluum subtrahabant. A sclepiades medicamentis sustulit: aluum non toties, sed ferè tamen in omni morbo subduxit. febre uero ipsa præcipue se ad eius remediū uti professus est. Conuellēdas enim uires ægri putauit, luce, uigilia, siti ingenti, sic, ut ne os quidem primis diebus elui sineret. Quo magis fallūtur qui per omnia iocundam eius disciplinam esse contendunt: et is enim ulterioribus quodam diebus cubantis etiam luxuriæ subscripsit: primis uero tortoris uicem exhibuit. Ego autem medicamentorum dari potiones, et alium duci non nisi raro debere concedo. et id non ideo tamen agendum, ut ægri uires conuellantur existimo: quoniam ex imbecillitate summum periculum est. minui ergo tantum materiam superantem oportet, qua naturaliter digeritur: ubi nihil noui accedit. Itaq; abstinentius à cibo primis diebus est: in luce habendus æger, nisi infirmus interdiu est. quo-



niam corpus ista quoq; digerit: usq; cubare quàm maximo conclavi debet. Quod ad sitim uero somnumq; pertinet: moderandum est, ut interdum uigilet: noctu, si potest, conquiescat. ac neq; poter: neq; nimium siti crucietur. Os etiam eius elui potest, ubi et sium est, et ipsi fauces requirere: neq; ad rem male haberi aegri pertinere. Ac primo quidem sic tenendus est. Optimum uero medicamentum est, opportune cibibus datus: qui quado primum dari debeat: quaeritur. Pleriq; ex antiquis tarde dabant: saepe quinto die, saepe sexto. Et id fortasse uel in Asia, uel in Aegypto coeli ratio patitur. Asclepiades ubi aegrum tri-duo per omnia fatigarat: quarto die cibo destinabat. At Themison nusper non quando coepisset febris: sed quando desisset, aut certe leuata esset, considerabat: Et ab illo tempore expectato die tertio, si non accesserat febris, statim: si accesserat, ubi ea uel desierat: uel si assidue inhaerebat: si certe se inclinauerat, cibum dabat. Nihil autem horum utiq; perpetuum est. Nam potest primo die primus cibus datus esse: potest secundo: potest tertio: potest non nisi quarto: aut quinto: potest post unam accessionem: potest post duas: potest post plures. Refert enim qualis morbus sit: quale corpus: quale coelum: quae aetas: quod tempus anni. minimeq; in rebus multum inter se differetibus quod intermittendum non est. perpetuum esse praecipuum temporis potest. In morbo, qui plus uirium aufert: celerius cibus dandus est. itemq; eo coelo, quo magis digerit. Ob quam causam in Africa nullo die aeger abstinere recte uidetur. Maturius est puero, quàm iuueni: aestate, quàm hyeme dari debet. Vnum illud est, quod semper ubiq; seruandum est: ut aegri uires subinde assidens medicus inspiciat: Et quandiu supererunt, abstinentia pugnet: si imbecillitatem uereri coeperit, cibo subueniat. Id enim eius officium est, ut aegrum neq; superuacua materia oneret: neq; imbecillitatem fami prodat. Idq; apud Erasistratum quoq; inuenio: qui quauis parum docuit quando uenter, quando corpus ipsum exinaniretur, dicendo tamen haec esse uisenda: Et tum cibum dandum, cum corpori deberetur: satis ostendit dum uires superessent, dari non oportere: ne deficerent: consulendum esse. Ex his autem intelligi potest ab uno medico multos non posse curari: eumq; si artifex est: idoneum esse, qui non multum ab aegro recedit, sed qui quaestui seruiunt, quoniam is maior ex populo est, libenter amplectuntur ea praecipua: quae sedulitatem non exigunt: ut in hac ipsa re. Facile est enim dies uel accessiones numerare his quoq;, qui aegrum raro uident. ille assideat necesse est: qui, quod solum opus est, uisurus est: quando nimis

longa in  
dia nō lū  
datur a bel

imbecillus futurus sit, nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad ini-  
 tium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit. Est autem alia etiam  
 de diebus ipsis dubitatio, quoniam antiqui potissimum impares seque-  
 bantur: eosque, tanquam tunc de ægry iudicaretur, *ὑπὸ ἰατροῦ* nomi-  
 nabant. Hi erant dies tertius, quintus, septimus, quartusdecimus, uige-  
 simus primus: ita ut summa potentia septimo, deinde quartodecimo,  
 deinde uni & uigesimo daretur. Igitur sic ægros nutriebant: ut die-  
 rum imparium accessiones expectarent. deinde postea cibū quasi le-  
 uioribus accessionibus instantibus darent: adeo ut Hippocrates si alio  
 die febris desisset: recidiuam timere sit solitus. Id Asclepiades iure ut  
 uanū repudiavit. neque in ullo die *ἡ γὰρ* par, imparue esset: his uel maius,  
 uel minus periculum esse dixit. Interdū enim peiores dies pares fiunt:  
 & oportunius post eorum accessiones cibus datur. Nonnunquam etiā  
 in ipso morbo dierum ratio mutatur: sitque grauior, qui remissior esse  
 consueuerat. atque ipse quartusdecimus par est: in quo esse magnā uim  
 antiqui fatebantur. Qui cum octauum primi naturam habere conten-  
 derent, ut ab eo secundus septenarius numerus inaperet: ipsi sibi re-  
 pugnant non octauum, neque decimum, neque duodecimum diem sumen-  
 dum, quasi potentiorē. Plus enim tribuebant nono, et undecimo. Quod  
 cum fecissent sine ulla probabili ratione: ab undecimo non ad tertium  
 decimum, sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam apud Hip-  
 pocratem ei, quem septimus dies liberaturus sit: quartum esse graui-  
 simum. Ita illo quoque authore in die pari et grauior febris esse potest:  
 & certa futuri nota. Atque idem alio loco quartum quengque diem, ut in  
 utrumque efficacissimum apprehendit: idest quartum, septimum, unde-  
 cimum, quartumdecimum, decimum septimum, in quo & ab impari  
 ad paris rationem transit. & ne hoc quidem propositum conserua-  
 uit, cum à septimo die undecimus non quartus sed quintus sit. adeo  
 apparet quacunque ratione ad numerū respeximus: nihil rationis sub  
 illo quidem authore reperiri. Verū in his quidē antiquos tunc cele-  
 bres ad modum pythagorici numeri fecerunt: cū hic quoque medicus  
 non numerare dies debeat: sed ipsas accessiones intueri: et ex his con-  
 iectare quando dandus cibus sit. Illud autem magis ad rem pertinet  
 scire: num oporteat dari cum iam bene uenæ conquieuerunt: aut etiā  
 num manentibus reliquijs febris. Antiqui enim quā integerrimis  
 corporibus alimētum offerebant. Asclepiades inclinata quidem febre,  
 sed adhuc tamen inherente. in quo unam rationem secutus est: non  
 quo non sit interdum maturius cibus dandus, si mature timetur al-  
 tera accessio: sed quo scilicet quā sanissimo dari debeat. Minus enim  
 corrumpitur quod integro corpori infertur. Neque tamen uanum est



quod Themisoni uidebatur, si duabus horis integer futurus esset æger: satius esse tunc dare: ut ab integro corpore potissimū diduceretur. Nā si diduci tam celeriter posset: id esset optimum. Sed cum hoc breue tempus non præster: satius esse principia cibi. i. decedente febre, quam reliquias ab incipiente excipi. ita si longius tempus secundū est, quā integerrimo dādus est: si breue, etiam antequam ex toto integer fiat. Quo loco uero integritas est, eodem est remissio: si qua maxime in febre continua potest esse. Atq; hic quoq; quæritur utrū tot hora expectandæ sint, quot febrem habuerunt: an satis sit primam partem earum præteriri, ut ægris iocundius insidat, quibus interdum non ualet. Tutissimum est autem ante totius accessionis tempus præterire. quamuis ubi longa febris fuit: potest indulgeri ægro maturius: dum tamen ante minime pars dimidia prætereatur. Idq; non in ea sola febre, de qua proxime dictum est: sed in omnibus ita seruandum est.

De febrium speciebus, & singularum curationibus, & primo quando cibus febricitantibus dandus sit. Caput. V.

Aec magis per omnia genera febrium perpetua sunt: nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si  
 h semel tantum accessit, deinde desit: eaq; uel ex inguine, uel ex lassitudine, uel ex æstu, alia'ue simili re fuit sic, ut interior nulla causa metum fecerit: postero die cū tempus accessionis ita transyt, ut nihil mouerit: cibus dari pot. At si ex alto calor uenit: & grauitas uel capitis, uel præcordiorum secuta est: neq; apparet quid corpus confuderit, quamuis unam accessionē secuta integritas est: tamen quia tertiana timeri potest, expectandus est dies tertius: & ubi accessionis tempus præterijt, cibus dandus est, sed exiguus, quia quartana quoq; timeri potest. Et die quarto demum: si corpus integrum est: eo cum fiducia utēdum. Si uero postero, tertio'ue, aut quarto die secuta febris est: scire licet morbum esse. Sed tertianarum, quartanarumq; quarū & certus circuitus est: & finis integer: et quia liberaliter quæta tempora sunt: expeditior ratio est. De quibus suo loco dicam. Nunc uero eas explicabo, quæ cotidie urgent. Igitur tertio quoq; die cibus ægro commodissime datur: ut alter febrem minuat: alter uiribus subueniat. Sed his dari debet si quotidiana febris est, quæ ex toto desinat: simul atq; corpus integrū factū est: si, quamuis nō accessiones, febres tamen iunguntur: et cotidie quidē increscunt: sed sine integritate tamen remittunt: cū corpus ita se habet, ut maior



remissio non expectetur. Si altero die grauior: altero leuior accessio est post grauiorem. ferè uero grauiorem accessionem leuior nox sequitur. quo fit ut grauiorem accessionem nox quoq; tristior antecedit. At si continuatur febris: neq; leuior unquam fit: & dari cibum necesse est: quando dari debeat, magna quidem dissensio est. Quidam, quia ferè remissius matutinum tempus aëris est: tunc putant dandū. quod si respondet, non quia mane est: sed quia remissior est aeger: dari dabet. Si uero ne tunc quidem ulla requies aëris est: hoc ipso peius id tempus est: quod cum sua natura melius esse debeat: morbi uitio non est. simulq; insequitur tempus meridianū: à quo cum omnis aeger ferè peior fiat: timeri potest ne ille magis etiam quàm ex consuetudine urgeatur. Igitur alij uespere tali aëro cibum dant. Sed cum eo tempore ferè pessimi sint, qui aërotant: uerendum est, ne si quid tunc mouerimus: fiat aliquid asperius. Ob hæc ad mediam noctem decurro: idest finito iam grauiissimo tempore, eodemq; longissime distante: secuturus uero ante lucanis horis, quibus omnes ferè maxime dormiunt: deinde matutino tempore, quod natura sua leuissimum est. Si uero febres uagæ sunt: quia uerendum est: ne cibum statim subsequantur: quandocunq; quis ex accessione leuatus est: hunc debet assumere. At si plures accessiones eodem die ueniunt: considerare oportet, pares ne per omnia sint: quod uix fieri potest: an impares. Si per omnia pares sunt: post eam potius accessionem cibum dari debet: quæ non inter meridiem, & uesperum desinit. Si impares sunt: considerandum est quo distent. Nam si altera grauior, altera leuior est: post grauiorem dari debet. si altera longior, altera breuior: post longiorem. si altera grauior, altera longior est: considerandum est utra magis affligat: illa uero, an hæc tempore: & post eam dandus est. Sed planè plurimum interest: quantæ: qualesq; inter eas remissiones sint. Nā si post alteram febrem motio manet: post alteram integrum corpus est: integro corpore cibo tempus aptius est. Si semper febricula manet: sed alterum tamen longius tempus remissionis est: id potius eligendum est: adeo ut ubi accessiones continuantur, protinus inclinata priore dandus cibum sit. Et enim perpetuū est, ad quod omne cōsiliū dirigi potest: cibum quàm maxime semper ab accessione futura reducere: & hoc saluo dare quàm integerrimo corpori. quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones seruabitur. Sed cū sit aptissimū tertio quoq; die cibum dare: tamē si corpus infirmum est, cotidie dandus est: multoq; magis si continentes febres sine remissione sunt: quanto magis corpus affligunt: aut si duæ, plures uel accessiones eodē die ueniunt. Quæ res efficit, ut & à primo die protinus

die protinus cibis dari cotidie debeat. Si protinus uenæ coniderunt: & sæpius eodem die, si inter plures accessiones subinde uis corpori deest. Illud tamen in his seruandū est: ut post eas febres minus cibi detur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum uero febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat, aut finiatur: scire licet optimum cibo tempus esse febre finita. deinde cum decessio eius consistit. tertium si necesse est, quandoque decedit, cætera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas urget, satius esse consistente iam incremento febris aliquid offerre: quàm incremente. Satius esse instante, quàm incipiente: cum eo tamen ut nullo tempore is qui deficit, non sit sustinendus. Neque hercule satis est ipsas tantum febres medicum intueri: sed etiam totius corporis habitum: & ad eum dirigere curationem, seu supersunt uires, seu desunt: seu quidā mali affectus interueniunt. Cum uero semper aegros securos agere conueniat, ut corpore tantum, non etiam animo laborent: tum præcipue ubi cibum sumpserunt. Itaque si qua sunt quæ exasperatura eorum animos sunt: optimum est eadem ægrotantium noticiæ subtrahere. si id fieri non potest: sustinere tamen post cibum usque somni tempus, & cum experfecti sunt, tunc exponere.

Quando potiones febricitantibus dari expediat. Caput. VI.

Ed de cibo facilius quidem cum ægris ratio est: quorum  
 Sæpe stomachus hunc respuit: et si mens concupiscit. De  
 potione uero ingens pugna est: eoque magis, quo maior febris est. Hæc enim sitim accendit: & tum maxime aquam  
 exigit, cum illa periculosissima est. Sed docendus æger est ubi febris con-  
 quieuerit, protinus sitim quoque quieturam: longioremque accessione  
 fore, si quod ei datum fuerit alimentum. ita celerius eum desinere  
 sitire qui non bibit. Necesse est tamen quanto facilius etiam sani famem,  
 quam sitim sustinent: tanto magis ægris in potione, quam in cibo in-  
 dulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet: nisi subito  
 sic uenæ coniderunt, ut cibis quoque dari debeat. Secundo uero, cæte-  
 risque etiam quibus cibis non dabitur: tamen si magna sitis urgebit,  
 potio dari potest. Ac ne illud quidē ab Heraclide Tarēntino dictum  
 ratione cæret: ubi aut bilis ægrum, aut cruditas male habet: expedire  
 quoque per modicas potiones misceri nouam materiam corruptam. illud  
 uidendum est, ut qualia tempora cibo leguntur: talia potioni quoque, ubi  
 sine illo datur, deligantur: aut cum ægrum dormire cupimus. quod  
 ferè sitis prohibet. Satis autem conuenit, cum omnibus febricitantibus



nimus humor alienus sit: tum præcipue esse sciamus, quæ ex partu in febres inciderunt. Sed cum tempora cibo, potioniq; febris et remissio- nis ratio detur: non est expeditissimum scire, quando æger febricitet: quan- do melior sit: quando deficiat: sine quibus dispensari illa non possunt. Venis enim maxime credimus fallacissimæ rei: quia sæpe istæ lenio- res, celerioresue sunt & ætate, & sexu, & corporum natura. Et ple- runq; satis sano corpore si stomachus infirmus est: nonnunquam et incipiente febre subeunt, & quiescunt: ut imbecillus is uideri possit, cui facile laturo grauis instat accessio. Contra sæpe eas concitat, & re- soluit sol, balneum, & exercitatio, & metus, & ira, & quilibet alius animi affectus: adeo ut cum primum medicus uenit, sollicitudo ægri dubitantis quomodo ille se habere uideatur: eas moueat. ob quam cau- sam periti media est, non protinus ut uenit apprehendere manu bra- chium. sed primum residere hilari vultu: percontariq; quemadmo- dum se habeat: & si quis eius metus est, eum probabili sermone leni- re. tum deinde eius corpori manum admonere. quas uenas autem cõspectus medici mouet: quàm facile mille res turbant. Altera res est, cui credimus: calor æque fallax. nã hic quoq; excitatur æstu, labore, somno, metu, sollicitudine. igitur intueri quidẽ omnia etiam ista oportet. sed his non omnia credere: ac protinus quidem scire non febricitare eum, cuius uenæ naturaliter ordinatæ sunt: teporq; talis est, qua- lis esse sanis solet. Non protinus autem sub calore, motuq; febrem se se concipere: sed ita si summa quoq; arida inæqualiter cutis est: si calor & in fronte est: & ex imis præcordijs oritur. si spiritus ex naribus cum feruore prorumpit: si color aut rubore, aut pallore nouo muta- tus est: si oculi graues, & aut persici, aut subhumidi sunt: si sudor cum fit, inæqualis est: si uenæ non æquis intervallis mouentur. Ob quam causam medicus neq; in tenebris, neq; à capite ægri debet residere: sed illustri loco aduersus eum, ut omneis notus ex vultu quoq; cubantis perspiciat. Vbi uero febris fuit, atq; decreuit: expectari oportet num tempora, partesue corporis aliæ paulum madescent: quæ sudorẽ uen- turum esse testentur. ac si qua nota est, tunc demum dare potui cali- dam aquam: cuius salubris effectus est, si sudorẽ per omnia membra diffundit. Huius autem rei causa continere æger sub ueste satis multa manus debet: eademq; crura, pedesq; contingere: qua male pleriq; ægros in ipso impetu febris, pessimèq; ubi ardens ea est, male habent. si sudare corpus cepit, linteam tepefacere oportet: paulatimq; singu- la membra detergere. At ubi sudor omnis finitus est: aut si is non ue- nit: ubi quàm maxime potuit: idoneus esse cibo æger uidetur: sub ueste leniter ungendus est: tum detergendus: deinde ei cibus dandus. Cibus



autem febricitantius humidus est aptissimus, aut humori certe q̄ proximis: utiq; ex materia quā leuissima, maximēq; sorbitio. eaq; si magnæ febrēs fuerunt, quā tenuissima esse debet. Mel quoq; despinatum huic recte adiicitur: quo corpus magis nutriatur: sed id, si stomachum offendit, superuacuum est: sicut ipsa quoq; sorbitio. Dari uero in uicem eius potest, uel intrita ex aqua calida, uel alia elota. Si firmus est stomachus, & compressa aluus: ex aqua mulsā si uel ille languet, uel hæc profluit, ex posca. Et primo quidē cibo id satis est. secūdo uero aliquid adijci potest: ex eodem tamen genere materie, uel olus, uel conchilium, uel pomum. Et dum febres quidē increscunt, hic solus idoneus abus est. Vbi uero aut desinunt, aut leuantur: semper quidē incipiendum est ab aliquo ex materia leuissima: adijciendū uero aliquid ex media, ratione habita subinde & uirium hominis, & morbi. Ponendi uero ægro uarij cibi sicut Asclepiades præcepit: tum demum sunt, ubi fastidio urgetur: neq; satis uires sufficiunt, ut paulum ex singulis degustando famē uitet. At si neq; uis, neq; cupiditas deest, nulla uarietate sollicitandus æger est: ne plus assumat, quā concoquat. Neq; uerum est, quod ab eo dicitur: facilius concoqui cibos uarios. edūtur enim facilius ad concoctionem aut materiæ genus, & modus pertinent. Neq; inter magnos dolores, ut neq; crescente morbo tutū est, ægrū cibo impleri: sed ubi inclinata iam in melius ualeitudo est. Sunt alia quoq; observationes in febris necessaria. atq; id quoq; uidendū est, quod quidam solum præcipiunt: an astrictum corpus sit: an profluat. quorum alterum strangulat quod continet: alterum digerit. nam si astrictum est, ducenda aluus est: mouenda urina, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiam misisse, concussisse uehementibus gestationibus, corpus in lumine habuisse, imperasse faciem, sitim, uigiliam prodest. Vtile est etiam ducere in balneum: prius demittere in solium: tum ungere: iterum ad solium redire: multa q; aqua fouere inguina: interdum etiam oleum in folio cum aqua calida miscere: uti cibo rarius, & serius tenui, simplicia, molli, calido, exiguo, maximēq; ol eribus, qualia sunt, lapatium, urtica, malua, uel iure etiam concharum, muscutorum ue, aut locustarum: neq; danda caro nisi elixa est. At potio esse debet magis liberalis & ante cibum, & post hunc: & cum hoc ultra quā sitis æget. Poterit q; à balneo et pinguius, aut dulcius dari uinum. poterit semel, aut bis interponi græcum salsum. Contra uero si corpus profluat, sudor coercendus: quies adhibenda erit tenebris: somno q; quandoq; uolet, utendum non nisi leui gestatione corpus agitandum: & pro genere mali subueniendum. Nam si uenter fluit: aut si stomachus non continet, ubi febris

decreuit, liberaliter oportet aquam tepidā potui dare, & uomere cogere: nisi aut fauces, aut præcordia, aut latus dolet: aut uetus morbus est. Si uero sudor exercet, duranda cutis est uel nitro, uel sale: quæ cū oleo miscentur. At si leuius id uitium est, oleo corpus unguendum est. si uehementius, rosa, uel melino, uel myrteo: cui uinum austerum sit adiectum. Quisquis autem fluore æger est: cum uenit in balneum, prius unguendus: deinde in solium demittendus est. Si in cute uitium est: frigida quoq; quàm calida aqua melius utetur. Vbi ad cibum uentum est: dari debet is ualens, frigidus, siuus simplex, qui quam minime corrumpi possit: panis tostus, caro assa, uinum asperum, uel certe subausterum: si uenter profluit, calidum: si sudores nocent, uomitusq; sunt, frigidum.

Quomodo pestilentes febres curari debeant. Caput. VII.

*iam uide-  
bitur in feb-  
re pestilent.*

**d** Esiderat etiam propriam animaduersionem in febribus pestilentie casus. In hac minime utile est, aut fame, aut medicamentis uti: aut ducere aluum. Si uires sinunt, sanguinem mittere optimum est: præcipueq; si cum dolore febris est. Si id parum tutum est, ubi febris aut tenuata est, aut leuata est: uomitu pectus purgare. Sed in hoc maturius, quàm in alijs morbis ducere in balneum opus est: uinum calidum, & meracius dare, & omnia glutinosa. inter quæ quoq; carnem generis eiusdem. Nam quo celerius eiusmodi tempestates corripunt: eo maturius auxilia, etiã cum quadam temeritate rapienda sunt. Quod si puer est, qui laborat: neq; tantum robur eius est, ut sanguis mitti possit: siti ei utendum est: ducenda aluus, uel aqua, uel ptisanæ cremore: tum demum is leuibus cibis nutriendus. Et ex toto non sic pueri ut uiri curari debent. Ergo, ut in alio quoq; genere morborum parcius in his agendum est. Non facile sanguinem mittere, non facile ducere aluum, non cruciare uigilia, fame uel, aut nimia siti, conuenit. Vomitus post febrem eliciendus est: deinde dandus cibus ex leuissimis: tum is dormiat: postero quoq; die si febris manet, abstineatur. Tercio ad similem cibum redeat. Dandaq; opera est quantum fieri potest, ut inter oportunam abstinentiam cibosq; oportunos, ommissis cæteris, nutriatur. Si uero ardens febris extorret: nulla medicamenti danda potio est: sed in ipsis accessionibus oleo, & aqua refrigerandus est: quæ miscenda manu sunt, donec albescant: & conclauī tenendus, quo multum, & purum aërem trahere possit: neq; multis uestimentis strangulandus, sed admodum leuibus tantum uelandus est. Possunt etiam super stomachum imponi folia uitis



folia vitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia vexandus est. alendus maturius est: id est à die tertio, & ante cibū. isdē perungendus. si pituita in stomacho cōiit: inclinata iam accessione uomere cogendus est: & tunc dandum frigidum olus: aut pomum ex his, quæ stomacho conueniunt. si siccus manet stomachus, protinus uel ptisanæ, uel alicæ, uel orizæ cremor dandus est: cū quo recens adeps coctus sit. Cum uero in summo incremento morbus est: utiq; non ante diem quartum magna siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat ei ultra satietatem: & cū iam uenter, & præcordia ultra modū repleta, satisq; refrigerata sunt: uomere debet. Quidā ne uomitū quidem exigunt: sed ipsa aqua frigida, tantū ad satietatem data, pro medicamento utuntur. Vbi utrunlibet factum est: multa ueste operiendus est: & collocandus ut dormiat. Fereq; post longam sitim, & uigiliā, post multam satietatem, post infractum calorē, plenus somnus uenit, per quem ingens sudor effunditur: idq; præsentissimum auxilium est. Sed in his tamen, in quibus præter ardorem nulli dolores, nullus præcordiorum tumor, nihil prohibēs uel in thorace, uel in pulmone, uel in faucibus, non ulcus, non deiectio, non profluvium alui fuit. Si quis autem in eiusmodi febre leniter tussit, is neq; uehementi siti conflictatur: neq; bibere aquam frigidam debet: sed eo modo curandus est quo in cæteris febribus præcipitur.

Curatio semitertianæ febris quæ hemitritæos dicitur. Caput. VIII.

**T** ubi id genus tertianæ est, quod ἡμιτρίτων medici appellant: magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerumq; frequentiores accessiones, deaccessionesq; ut aliud morbi genus uideri possit: porrigitq; febris inter horas uigintiquatuor et triginta sex, ut quod idem est: non idem esse uideatur. Et magnopere necessarium est, neq; dari cibum, nisi in ea remissione, quæ uera est: & ubi ea uenit, protinus dari: plurimiq; sub alterutro curantis errore subito moriuntur. ac nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet: tum dari cibum, qui neq; incitet febre: & tamen longum eius spatium sustineat.

Curatio lentarum febrium. Caput. IX.

**N** onnunquam etiam lentæ febres sine ulla remissione corpus tenent: ac neq; cibo, neq; ulli remedio locus est. In hoc casu medicum dici cura esse debet, ut morbū mutet. Fortasse enim curationi



oportunior fiet. Sæpe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adiectū, corpus eius per tractandum est. quoniam interdum sic euenit, ut horror oriatur: et fiat initium quoddam noui motus: exq̃; eo cum magis corpus incaluit: sequatur et remissio. In his frictio quoq̃; ex oleo, et sale salubris uidetur. at si diu frigus est et torpor, et iactatio corporis, non alienum est in ipsa febre dare mulsi tres, aut quatuor cyathos: uel cum cibo uinum bene dilutum. Intenditur enim sæpe ex eo febris, et maior ortus calor, simul et priora mala tollit: et spem remissionis in ea curatione ostendit. Neq̃; hercule ista curatio noua est: qua nunc quidam traditos sibi ægros, qui sub cautiore medicis trahebantur: interdum cōtrarijs remedijs sanant. si quidem apud antiquos quoq̃; ante Erophilum, et Erasistratum, maximeq̃; post Hippocratem fuit Petro quidam qui febricitantem hominem ubi acceperat, multis uestimentis operiebat: ut simul calorem ingentem, sitimq̃; excitaret. Deinde ubi paulum remitti cœperat febris, aquam frigidā potui dabat: ac si mouerat sudorem, explicuisse se ægrum indicabat. si non mouerat, plus etiam aquæ frigidæ ingerebat: et tum uomere cogebat. Si alterutro modo febre liberauerat: protinus suillā assam, et uinum homini dabat. Si non liberauerat: decoquebat aquam sale adiecto, eamq̃; bibere cogebat, ut mouendo uentrem purgaret. et intra hæc omnis eius medicina erat. eaq̃; non minus grata fuit his: quos Hippocratis successores non refecerant: quā nunc est his, quos Erophili, uel Erasistrati æmuli diu tractos non expedierunt. Neq̃; ideo tamē non est temeraria ista medicina: quia plures, si protinus à principijs exæpit: intererunt. Sed cum eadē omnibus conuenire non possint: ferè quos ratio nō restituit: temeritas adiuvat. Ideoq̃; eiusmodi medicameliū alienos ægros, quā suos nutriunt. Sed est circumspecti quoq̃; hominis et nouare interdū: et augere morbum: et febres accendere: quæ curationē, ubi id quod est, nō recipit: potest recipere id, quod futurū est.

Remedia in febribus ad capitis dolorem, et præcordiorum inflammationem, et ariditatem, et sabritiem lingue. Caput. X.

Considerandum etiam est febres ne solæ sint: an alia his quoq̃; mala accedant. id est num caput doleat: num lingua aspera: nū præcordia intēta sint. Si capitis dolores sunt, rosam cum aceto misceere oportet, et in id ingerere: deinde habere duo pittacia, quæ latitudinē frontis, longitudinēq̃; æquet. Ex his inuicem alterū in aceto et rosa habere, alterum in fronte: aut intinctam hisdem lanam suadā imponere. Si acētū offendit, pura

rosa utendum est. Si rosa ipsa lædit, oleo acerbo. si ista parum iuuant: teri pōt uel iris arida, uel nuces amaræ, uel quælibet herba ex refrigerantibus. Quorū quidlibet ex aceto impositum dolorē minuit: sed magis aliud in alio. iuuat et panis cum papauere iniectus, uel cum rosa, cerussa, spuma uel argenti. Olfacere quoq; uel serpillum, uel anethum non alienum est. At si in præcordijs inflammatio, et dolor est: primo super imponenda sunt cataplasmata reprimentia, ne si calidiora fuerint: plus eò materiæ concurrat. Deinde ubi prima inflammatio se remisit: tunc demum ad calida, et humida ueniendū est: ut ea quæ remanserint, discutiant. Notæ uero inflammationis sunt quatuor, rubor, et tumor cum calore, et dolore. Quo magis errauit Erasistratus, qui febrē nullam sine hac esse dixit. Ergo si sine inflammatione dolor est: nihil imponendum est. Hunc enim statim ipsa febris soluit. At si neq; inflammatio, neq; febris, sed tantum præcordiorum dolor est: protinus calidis, et siccis fomentis uti licet. Si uero lingua siccata est, et scabra: detergenda primum penicillo est ex aqua calida. deinde ungenda mixtis inter se rosa, et melle. Mel purgat: rosa reprimi: simulq; siccæscere non sinit. At si scabra non est, sed arida, ubi penicillo deterisa est: ungi rosa debet: cui ceræ sit paulum adiectum.

Remedia contra frigus, quod febrem præcedit. Caput. XI.

Olet et ante febres esse frigus, idq; uel molestissimū morbi genus est. Vbi id expectatur, omni potione prohibendus æger est. hæc enim paulo ante data multum malū adiici. Item maturius ueste multa tegendus est. admonenda partibus his, pro quibus metuiamus, siccata et calida fomenta, sic, ne statim uehementissimi calores incipiam: sed paulatim accrescant. Perfricandæ quoq; eæ partes manibus unctis ex uetere oleo sunt: eiq; adiiciendum aliquid ex calefacientibus. Contentiq; medici quidam una frictione et ex quolibet oleo sunt. In harū febriū remissionibus nonnulli tres, aut quatuor sorbitionis cyathos etiam nam ultra manente febre dant. deinde ea bene finita reficiunt stomachum cibo frigido, et leni. Ego tum hoc puto tentandum, cum parū cibis semel et post febrem datus prodest. sed curiose perspicendū est, ne tempus remissionis decipiat. Sæpe enim in hoc quoq; genere uoletudinis iam minui febris uidetur: et rursus intenditur. itaq; ei remissioni credendum est: quæ etiam immoratur: et iactationem, fæctoremq; quendam oris, quem ὀζεν græci uocant, minuit. Illud satis conuenit, si cotidie pares accessiones sunt: cotidie paruum cibum dandum. si impares, post grauiorem cibum: post leniorem, aquam mulsam.

b *h* *Orro* *autem* *ea* *ferè* *febres* *antecedit:* *quæ* *certũ* *habent*  
*circuitum,* *et* *ex* *toto* *remittuntur.* *Ideoq;* *tutissimæ* *sunt,*  
*maximèq;* *curationes* *admittunt.* *Nam* *ubi* *incerta* *tem=*  
*pora* *sunt:* *neq;* *alui* *ductio,* *neq;* *balneum,* *neq;* *uinum,* *neq;*  
*medicamentum* *aliud* *recte* *datur.* *incertũ* *est* *enim* *quando* *febris* *uen-*  
*tura* *sit:* *ita* *fieri* *potest,* *ut* *si* *subito* *uenerit,* *summa* *in* *eo* *perniciēs*  
*sit:* *quod* *auxilij* *causa* *sit* *inuentũ.* *Nihilq;* *aliud* *fieri* *põ,* *quàm* *ut* *pri-*  
*mis* *diebus* *bene* *abstineatur* *ager.* *deinde* *sub* *decessu* *febris* *eius,* *quæ*  
*grauissima* *est:* *cibũ* *sumat.* *at* *ubi* *certus* *circuitus* *est:* *facilius* *oĩ* *illa*  
*tentantur:* *quia* *facilius* *proponere* *nobis* *et* *accessionũ,* *et* *decessionũ* *ui-*  
*ces* *possumus.* *In* *his* *autem* *cum* *ueterauerunt:* *utilis* *famis* *non* *est.* *Pri-*  
*mis* *tantummodo* *diebus* *ea* *pugnandum* *est:* *deinde* *diuidenda* *cura-*  
*tio* *est:* *et* *ante* *horror,* *tum* *febris* *discutienda.* *Igitur* *cum* *primum*  
*aliquis* *inhorrui,* *et* *ex* *horrore* *in* *alui:* *dare* *ei* *oportet* *potui* *tepi-*  
*dam* *aquam* *subsalſam,* *et* *uomere* *eum* *cogere.* *nam* *ferè* *talis* *horror*  
*ab* *his* *oritur,* *quæ* *biliosa* *in* *stomacho* *resederunt.* *idem* *faciendũ* *est,*  
*si* *proximo* *quoq;* *circuitu* *æque* *cessit:* *sæpe* *enim* *sic* *discutitur.* *iamq;*  
*quod* *genus* *febris* *sit,* *scire* *licet.* *itaq;* *sub* *expectatione* *proxime* *ac-*  
*cessionis,* *quæ* *instare* *tertia* *potest:* *deducendus* *in* *balneum* *est:* *dādũq;*  
*opera* *est,* *ut* *per* *tempus* *horroris* *in* *solio* *sit.* *si* *ibi* *quoq;* *senſerit:* *ni-*  
*hilominus* *idem* *sub* *expectatione* *accessionis* *quartæ* *faciat.* *si* *quidem*  
*eo* *quoq;* *modo* *sæpe* *id* *discutitur.* *si* *nec* *balneũ* *quidem* *proſuit:* *ante*  
*accessionem* *allium* *edat:* *aut* *bibat* *calidã* *aquam* *cum* *pipere:* *si* *qui-*  
*dem* *ea* *quoq;* *assumpta* *calorem* *mouent,* *qui* *horrorem* *nō* *admittit.*  
*Deinde* *eo* *modo* *quo* *in* *frigore* *præceptũ* *est:* *anteq;* *inhorrescere* *pos-*  
*sit,* *opiat.* *Fomentisq;* *protinus* *validioribus* *totum* *corpus* *circundare*  
*conuenit,* *maximèq;* *in* *moluitis* *extinctis* *testis,* *et* *titionibus.* *si* *nihilo-*  
*minus* *horror* *perruperit,* *nullo* *oleo* *calefacto* *inter* *ipsa* *uestimenta*  
*perfundatur:* *cui* *æque* *ex* *caleſcipientibus* *aliquid* *sit* *adiectum.* *adhi-*  
*beaturq;* *frictio* *quantam* *is* *sustinere* *poterit,* *maximèq;* *in* *manibus,*  
*et* *pedibus:* *et* *spiritum* *ipse* *contineat.* *neq;* *desistendum* *est* *etiam* *si*  
*horror* *est.* *sæpe* *enim* *pertinacia* *iuuantis* *malum* *corporis* *vincit.* *si*  
*quid* *euomuit,* *danda* *aqua* *tepidã:* *iterumq;* *uomere* *cogendus* *est:* *uten-*  
*dumq;* *eisdẽ* *est,* *donec* *horror* *finiatur.* *Sed* *præter* *hæc,* *ducenda* *alius*  
*est,* *si* *tardius* *horror* *quiescit:* *si* *quidem* *id* *quoq;* *exonerato* *corpori*  
*prodest.* *ultima* *quoq;* *post* *hæc* *auxilia* *sunt* *gestatio,* *et* *frictio.* *Cibus*  
*autem* *in* *eiusmodi* *morbis* *maxime* *dandus* *est:* *qui* *mollem* *aluiũ* *præ-*  
*ſet.* *Caro* *glutinosa,* *uinum* *cum* *dabitur,* *austerum.*



## Curatio cotidiane febris. Caput. XIII.

*h* Aec ad omnes circuitus febrü pertinent. discernendæ in singulæ sunt: sicut ratione habent dissimilem. si cotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet: tum ci-  
bis altero quoq; die uti. si res inueterauerit, post febrem experiri balneü, & uinum, magisq; si horrore sublato hæc superest.

## Curatio tertianæ febris. Caput. XIII.

*f* I tertiana uero, quæ ex toto intermittit, aut quartana est: medijs diebus & ambulationibus uti oportet, alijsq; exercitationibus, & unctionibus. quidam ex antiquioribus medicis Cleophrantus in hoc genere morborum multo ante accessionem caput agri multa calida aqua perfundebat: deinde uinü dabat. quod quatuor pleraq; eius uiri præcepta secutus est Asclepiades, recte tamen præterijt. Est enim anceps ipse, si tertiana febris est: tertio die post accessione dicit aluum duci oportere. quinto post horrorem uomitus elicere. deinde post febrem, sicuti illi mos erat, adhuc calidis dare cibum, & uinum. sexto die in lectulo detineri. sic enim fore ne septimo die febris accedat. Id sæpe fieri posse uerisimile est. Tutius tamen est, ut hoc ipso ordine utamur tria remedia, uomitus, alui ductionis, uini potus per triduum: id est die tertio, & quinto, & septimo tentare. nec uinum nisi post accessionem die septimo bibat. Si uero primis diebus discussus morbus non est: incidiq; in uetustatem, quo die febris expectabitur: in lectulo se contineat: post febrem perfricetur: tum cibo assumpto bibat aqua. postero die, quo cibo uacat, & ab exercitatione, unctioneq; aqua tantum contentus conquiescat. Et id quidem optimum est. si uero imbecillitas urgebit: & post febrem uinum, & medio die paulum cibi debet assumere.

## Curatio quartanæ febris. Caput. XV.

*e* Adem in quartana faciendæ sunt. sed cum hæc tarde ad modum finiatur, nisi primis diebus discussa est: diligentius ab initio præcipiendü est, quid in ea debeat fieri. Igitur si cui cum horrore febris accessit, eaq; desijt: eodem die, & postero, tertioq; continere se debet: & aqua tantummodo calidam primo die post febrē sumere: biduo proximo quantum fieri potest hanc quidē. si quarto die cum horrore febris reuertitur, uomere

sicut ante præceptum est: deinde post febrem modicum cibum sumere, vini quadrantem. Postero, tertioque die abstinere: aqua tantummodo calida, si sitiet, assumpta: septimo die balneo frigus præuenire: abstinere, continere se debet: & aqua tantummodo calida si sitiet: ac tum ita nono die balneo frigus præuenire: si febris redierit, ducere alium. ubi ex eo corpus conquieuerit, inunctione uehementer perfricari: eodem modo sumere cibum & uinum: biduo proximo se abstinere frictione seruata. decimo die rursus balneum experiri: & si postea febris accesserit, æque perfricari. uinum copiosius bibere. ac si proximum est quies tot dierum, ut abstinentia cum cæteris quæ præcipiuntur, febrem tollant. Si uero nihilominus remanet: aliud ex toto sequendum est curationis genus: idque agendum, ut quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quo minus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet: qui primis diebus ducendam aluum: deinde abstinendum usque in septimum diem dixit. Quod ut sustinere aliquis possit: tamen etiam febre liberatus, uix refectiōi ualebit. adeo si febris sæpius accesserit: concidet. Igitur si tertio decimo die morbus remanebit: balneum neque ante febrem, neque post eam tentandum erit: nisi interdum iam horrore discusso. Horror ipse per cadem quæ supra præscripta sunt expugnandus. Deinde post febrem oportebit ungi: & uehementer perfricari: cibum & ualidum, & fortiter assumere. uino uti quantum libebit. postero die cum satis quieuerit, ambulare, ex cæteri, ungi, perfricari fortiter: cibum accipere sine uino: tertio die abstinere. quo die uero febrem expectabit: ante surgere, & exerceri, dareque operam non oportet, ut in ipsam exercitationem tempus febris incurrat. sic enim sæpe illa discutitur. At si in opere occupauit: tum demum se recipere. In eiusmodi ualitudine medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibus, uinum. Si uenter astrictus est, soluendus est. sed hæc facile ualidiores faciunt. si imbecillitas occupauit: pro exercitatione gestatio est. si ne hanc quidem sustinet: adhibenda tamen frictio est. si hæc quoque uehemens onerat: intra quietem, & inunctionem, & cibum sistendum est: dandaque opera est, ne qua cruditas in cotidianam id malum uertat. Nam quartana ne minem iugulat. sed si ex ea facta cotidiana est: in malis æger est. Quod tamen nisi culpa uel ægri, uel curantis nunquam fit.

Curatio duarum quartanarum. Caput. XVI.

¶ Si due quartanae sunt: neque hæc, quas proposui, exercitationes adhiberi possunt: aut ex toto quiescere opus est: aut si id difficile est, leniter ambulare: considerare diligenter inno-

luti pedibus, & capite. Quoties febris accessit, & desit, cibum modicum sumere, & vinum. reliquo tempore nisi imbecillitas urget: abstinere. Aut si duæ febres penè iunguntur, post utrâq; cibum sumere. deinde nullo tempore & moveri aliquid, & postunctionem abo uti. Cum vero vetus quartana raro, nisi vere solvatur: utiq; eo tempore attendendum est ne quid fiat, quod valetudinem impediât. Prodestq; in vetere quartana mutare subinde victus genus: à vino ad aquam: ab aqua ad vinum: à lenibus cibis ad acres: ab acribus ad lenes transire: esse radicem: deinde uomere: iurè uel pulli gallinacei uentrem resoluerè: oleum ad frictiones: adicere: calefactientia ante accessionem sorbere, uel acetum cyathos duos, uel unum sinapis cum tribus græci uini salsi, uel mixta paribus portionibus, & in aqua diluta, piper, castoreum, laser, myrram. per hæc enim similiaq; corpus agtandum est, ut moueatur ex eo statu quo detinetur. Si febris quieuit, diu meminisse eius diei cõuenit: eoq; uitare frigus, calorem, cruditatè, lassitudinè. Facile enim reuertitur: nisi à sano quoq; aliquandiu timetur.

Curatio cotidiane febris, quæ ex quartana facta sit. Caput. XVII.

**T** si ex quartana cotidiana facta est: cum id initio inaderit, per biduum abstinere oportet. frictione uti: aquam tantummodo uesperis potui dare. tertio die sæpe fit ne febris accedat. sed siue fuit, siue non fuit, cibus post accessionis tempus est dandus. at si manet: per biduum abstinentia, quanta maximo imperari corpori potest: frictione cotidie utendum est.

De tribus insanie generibus: & primo de eius curatione, quæ à græcis phrenitis dicitur. Caput. XVIII.

**T** februm quidem ratio exposita est. supersunt uero alij corporis affectus: qui huic superueniunt. ex quibus eos, qui certis partibus assignari non possunt: protinus iungam. Incipiam ab insania: primamq; huius ipsius partem agrediar: quæ et acuta, et in febre est: græci *ῥαγία* appellant. Illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione ægros desipere: et loqui aliena. Quod nõ quidè leue est: neq; incidere potest, nisi in febre uehementi: non tamen æque pestiferum est. Nam plerumq; breue esse consuevit: leuatoq; accessionis impetu protinus mens redit. Neq; id genus morbi remedium aliud desiderat: quàm quod in curanda febre præceptum est. Phrenitis uero tum demum est: cum continua demètia esse incipit: aut cum æger quauis adhuc sapiat: tamen quasdam na-



nas imagines accipit. perfecta est ubi mens illis imaginibus addicta est. Eius autem plura genera sunt: si quidem ex phrenitidis alij hilarer, alij tristes sunt: alij facilius continentur, et intra uerba desipiunt. alij consurgunt, & uolenter quædam manu faciunt. atq; ex his ipsis alij nihil nisi impetu peccant: alij etiam artes adhibent: summamq; spem sanitatis in captandis maiorum operum occasione præbent: sed exitu deprehenduntur. Ex his autem eos qui intra uerba desipiunt, aut leuiter etiam manu peccant: onerare asperioribus coercionibus superuacuum est. Eos uero qui uolentius se gerunt, uincire conuenit: ne uel alteri, uel sibi noceant. Neq; credendum est si uinctus aliquis dum leuari uinculis cupit: sanum iam se fingat, quamuis prudenter & miserabiliter loquatur: quoniam is dolus insipientis est. Ferè uero antiqui tales ægros in tenebris habebant: eo quod eis contrarium esse exterreri: & ad quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid iudicabant. At Asclepiades tanquam tenebris ipsis terrentibus in lumine habendos esse dixit neutrum tamen perpetuum est: alium enim lux, alium tenebræ magis turbant. reperiunturq; in quibus nullum discrimen deprehendi uel hoc, uel illo modo possit. Optimum itaq; est utrumq; experiri: & habere eum, qui tenebras horret, in luce: eum q; lucem, in tenebris. At ubi nullum tale discrimen est, æger si uires habet, loco lucido: si non habet, obscuro continendus est. Remedia uero adhibere ubi maxime furor urget, superuacuum est. simul enim febris quoq; increfcit. itaq; tunc nihil nisi continendus æger est. Vbi uero res patitur, festinanter subueniendum est. Asclepiades perinde esse dixit his sanguinem mitti, ac si trucidentur: rationem hanc secutus, quod neq; insania esset, nisi febre intenta: neq; sanguis nisi in remissione eius recte mitteretur. Sed ipse in his somnum multa frictione quæsiuit, cum intentio febris somnum impediatur: & frictio non nisi in remissione eius utilis sit. Itaq; hoc quoq; auxilium debuit præterire. Quid igitur est? Multa in præcipiti periculo recte fiunt aliàs omittenda. & continuata quoq; febris habet tempora: quibus & si non remittit, non tamen crescit. Estq; hoc ut non optimum, sic tamen secundum remedij tempus. Quod si uires ægri patiuntur, sanguis quoq; mitti debet. Nec minus deliberari potest an alius ducenda sit. tam interposito die conuenit caput ad cutem tendere: deinde aqua fouere. in aqua uerbena aliquæ decoctæ sint, uel ex reprimentibus: aut prius fouere: deinde tendere: & iterum fouere: ac nouissime rosa caput, naresq; implere: offerre etiam naribus rutam ex aceto contritam: mouere sternutamenta medicamentis in id efficacibus. Quæ tamen facienda sunt in his, quibus uires non desunt. si uero imbecillitas est,

rosa tantum caput adiecto serpillio, similiq; aliquo madefaciendū est. Vtiles etiam in quibuscunq; viribus herbae duae sunt, solanum, & muralis: simul ex utraq; succo expresso caput impleatur. cum se febris remiserit, frictione utendum est. partius tamen in his qui nimis hilares, quam in his qui nimis tristes sunt. Aduersus omnium autē sic insanientium animos, gerere se pro cuiusq; natura necessarium est. Quorundā enim uani metus leuandi sunt: sicut in homine praediuite famē timente incidit: cui subinde falsae hereditates nunciabatur. Quorundā autē adacia coercenda est: sicut in his fit, in quibus continēdis plagae quoq; adhibentur. Quorundam etiā intempestiuus risus & obiurgatione, & minis prohibendus est. Quorundam discutiendae tristes cogitationes: ad quod symphoniae, & cymbala, strepitusq; proficiunt. Saepius tamen assentiendum, quam repugnandū est. paulatimq; & non euidenter ab his, quae stulte dicuntur, ad meliora mens eius abducenda est. Interdum etiā elicienda ipsius intentio, ut fit in hominibus studiosis literarum quibus liber legatur: aut recte si delectantur: aut perperam, si id ipsum eos offendit. emendando enim conuertere animum incipiunt. Quin etiam recitare si qua meminerunt cogendi sunt. Ad cibum quoq; quosdam non desiderantes reduxerunt hi, qui inter epulantes eos collocauerunt. Omnibus uero sic affectis somnus & difficilis, & praecipue necessarius est. sub hoc enim pleriq; sanescunt. Prodest ad id, atq; etiam ad mentem ipsam componendam crocinum unguentum cum irino in caput datum. Si nihilominus uigilant hi, quidam somnum moliantur potui dando aquam, in qua papauer, aut uosv'amos decocta sit: alij mandragorae mala puluino subijciunt: alij uel a momum, uel sicamini lachrymam fronti inducunt. hoc nomen apud medicos reperio. Sed cum graeci morū σινάμυρον appellant: mori nulla lacryma est. sic uero significatur lachryma arboris in Aegypto nascētis: quā ibi μωπόρων appellant. Plurimi decoctis papaueris corticibus, ex ea aqua subinde spongia os, & caput fouent. Asclepiades ea superuacua esse dixit, quoniā in Lethargum saepe cōpellerent. Praecipit autē ut primo die à cibo, potione, somno abstineretur: uespere ei daretur potui aqua: tunc frictio admoueretur lenis, ita ut ne manum quidem qui fricaret, uehementer imprimeret. postero deinde die hisdē omnibus factis, uespere ei daretur sorbitio, et aqua: rursumq; frictio adhiberetur. Per hanc enim nos consecuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, & quidem adeo, ut illo confitente nimis: frictio etiam lethargi periculum afferat. Sed si sic somnus non accessit, tum demum illis medicamentis accersendus est, habita scilicet eadem moderatione, quae hic quoq; necessaria est: ne quem obdormire uolumus:



excitare postea non possumus. Confert etiam aliquid ad somnum silanus iuxta cadens: uel gestatio post cibum et noctu, maximeq; suspensus lecti motus. Neque alienum est, si neque sanguis ante missus est: neque mens constat: neque somnus accedit: occipitio incuso circurbitulam admoovere. quæ quia leuat morbum, potest etiam somnum facere. Moderatio autem in cibo quoq; adhibenda est. Nam neq; impletus æger est, ne insaniat. neq; ieiunio utq; uexandus est, ne imbecillitate in cardiacum incidat. Opus est autem cibo infirmo, maximeq; sorbitione, potione aquæ mulsæ: cuius ternos cyathos bis hyem: quater æstate dedisse satis est. Alterum genus insanie est: quod spatium longius recipit: quia ferè sine febre incipit: leues deinde febriculas excitat: et consistit in tristitia, quam uidetur bilis atra contrahere. in hac utilis detractio sanguinis est. Si quid hanc prohibet, prima est abstinentia: secunda per album uer atrum, uomitumq; purgatio. post utriuslibet adhibenda bis die frictio est. si magis ualet, frequens etiã exercitatio. In ieiuno uomitus: cibus sine uino dandus ex media materia est. Quam quotiens posuero, scire licet etiam ex infirmissima dari posse: dum ne ea sola quis utatur: ualentissima tantummodo esse remouenda. præter hæc seruanda aliud est quàm tenerrima. remouendi terrores, et potius bona spes afferenda. quærenda delectatio ex fabulis, ludisq; quibus maxime capi sanus assueuerat. Laudanda si qua sunt ipsius opera: et ante oculos eius ponenda. Leniter obiurganda uana tristitia. Subinde admonendus in his ipsis rebus, quæ solitantur: cur non potius letitiæ, quàm solitudinis causa sit. Si febris quoq; accessit, sicut aliæ febres curanda est. Tertium insanie genus est ex his longissimum, adeo ut uitam ipsam non impediat: quod robusti corporis esse consuevit. huius autem ipsius species duæ sunt. Nam quidam imaginibus, non mente falluntur: qualem insanientem Aiacem, uel Orestem poetarum fabulæ ferunt. quidam animo desipiunt. Si imagines fallunt: ante omnia uidendum est, tristes, an hilares sint. In tristitia nigrum uer atrum deiectionis causa: in hilaritate album ad uomitum excitandum dari debet. idq; si in potione non accepit: pani adijciendum est, quo facilius fallat. nam si bene se purgauerit: ex magna parte morbum leuabit. Ergo etiam si semel datum uer atrum parum profecerit: interposito tempore iterum dari debet. Neq; ignorare oportet, leuiorem esse morbum cum risu, quàm serio insanientium. Illud quoq; perpetuum est in omnibus morbis: ubi ab inferiore parte purgandus aliquis est, uentrem eius ante soluendum esse: ubi à superiore, ampri mendum. Si uero consilium insanientem fallit: tormentis quibusdam optime curatur. Vbi perperam aliquid dixit, aut fecit, fame, uincis



lis, plagis coercendus est. Cogendus est & attendere, & ediscere aliquid, & meminisse. sic enim fiet ut paulatim metu cogatur considerare quid faciat. subito etiam terreri, & expauescere in hoc morbo prodest. Et ferè quicquid animum uehemēter perturbat. Potest enim quedam fieri mutatio: cum ab eo statu mens in quo fuerat, abducta est. Interest etiam si ipse sine causa subinde rideat: an mestus, demissusq; sit. nam demens hilaritas terroribus his, de quibus supra dixi: melius curatur. si nimia tristitia est: prodest lenis, sed multa bis die frictio. Itē per caput aqua frigida infusa: demissumq; corpus i aquā, & oleum. illa communia sunt, insanientes uehementer exerceri debere: multa frictione utri: neq; pinguem carnē, neq; uinum assumere: abis uti post purgationem ex leui materia quā leuissimis. non oportere esse uel solos, uel inter ignotos, uel inter eos quos aut contemnunt: aut negligunt. mutare debere regiones: & si mens redit, annua peregrinatione esse iactandos. Raro, sed aliquando tamen ex metu delirium nascitur. Quod genus insanientium specie, similiq; uictus genere curandum est: præterquā quod in hoc insanie genere solo recte uinum datur.

Cardiaci morbi curatio. Caput. XIX.

Vic morbo præcipue contrarium est id genus, quod *napθιανὸν* à grecis nominatur: quus sæpe ad eum phrenitici transeant. Si quidem mens in illis labat: in hoc constat. Id autem nihil aliud est, quā nimia imbecillitas corporis: quod stomacho languente immo dicto sudore digeritur. Licetq; protinus scire id esse, ubi uenarū exigui, imbecilliq; pulsus sunt. Sudor autem supra cōsuetudinem et modo, & tempore ex toto thorace, & ceruicibus, atq; etiam capite prorūpit: pedibus tantummodo et cruribus siccioribus, atq; frigentibus. At ubi id morbi genus est: curatio prima ē, supra præcordia imponere quæ reprimant cataplasmata. secunda, sudorē prohibere. id præstat acerbum oleū, uel rosa, uel melinū, aut myrten. quorū aliquo corpus leniter perungendū: cæratumq; ex aliquo horum tum imponendū est. Si sudor uincat, delinendus homo est uel gypso, uel argenti spuma, uel cimolia creta: uel etiam subinde horum puluere respergendus. Idem præstat puluis ex contritis aridi myrti, uel rubi folijs: aut ex austeri, et boni uini arida fecē. Pluraq; similia sunt: quæ si desunt, satis utilis est quilibet ex uia puluis iniectus. Sup hæc uero quo minus corpus insudet: leni ueste debet esse cōtectus, loco nō calido, fenestris patentibus

*quid sit*

sic, ut per flatus quoq; aliquis accedat. Tertium auxilium est imbecillitati iacentis uino, ciboq; succurrere. Cibus nō multus quidē, sed sæpe tamen nocte, ac die dandus est, ut nutriat: neq; oneret. is esse debet ex infirmissima materia: & stomacho aptus. nisi autem necesse est, ad uinum festinare non oportet. si uerendum est ne deficiat, tum & intrita ex hoc, et hoc ipsum austerum quidem, sed tamen tenue miracū. Egelidum subinde & liberaliter dandū est adiecta polenta: si modo is æger parum cibi assumit. idq; uinū esse debet neq; nullarum uiriū, neq; ingentium: recteq; tota die, ac nocte uel treis heminas æger bibet. si uastus corpus est: plus etiam. Si abum nō accipit, perunctum ante perfundere aqua frigida conuenit: & tum dare. Quod si stomachus resolutus parum continet, & ante abum, & post eum: sponte uomere oportet: rursusq; post uomitum cibum sumere. si ne id quidem manserit, sorbere uini cyathum: interpositaq; hora sumere alterum. si id quoq; stomachus reddiderit: totum corpus bulbis contritis super illinendum est. qui ubi inaruerunt, efficiunt, ut uinum in stomacho contineatur: exq; eo toti corpori calor, uenisq; uis redeat. Vltimum auxilium est, in aluum ptisanæ, uel alicæ cremorem ex inferioribus partibus inijcere, si quidem id quoq; uires tuetur. Neq; alienum est naribus quoq; estuantis admouere quod reficiat: id est rosam, & uinum. Et si qua in extremis partibus frigent: unctis, & calidis manibus fovere. per quæ si consequi potuimus, ut & sudoris impetus minuat: & uita prorogetur: incipit iam tēpus ipsum esse præsidio. Vbi in tuto esse uidetur: uerendum est tamen ne ad eandem imbecillitatem cito recidat. Itaq; uino tantum remoto, cotidie ualidiorē abum debet assumere: donec satis uirium corpori redeat.

## De lethargo, &amp; eius curatione. Caput. XX.

Lter quoq; morbus est aliter phrenitico cōtrarius. In illo a difficilis somnus, prompta ad omnem audaciam mēs est. At in hoc marcor & inexpugnabilis penē dormiendi necessitas, ἡ βαρὺς græci nominant. atq; id quoq; genus acutū est: & nisi succurratur, celeriter ingulat. Hos agros quidā subinde excitare nituntur admotis his, quæ per sternutamenta euocantur: & his, quæ odore fædo movent, qualis est pix cruda, lana succida, piper, ueratrum, castoreum, acetum, allium, cepa, iuxta etiam galbanum incendunt, aut pilos, aut cornu ceruinum. si id non est, quodlibet aliud. Hæc enim cum comburuntur, odorem fædū movent. Tharrias uero quidam accessione esse id malum dixit: leuariq; cum ea de-  
assit. Itaq;



cessit. Itaq; eos qui subinde excitant, sine usu male habere. Interest aut in decessione expergiscatur æger: an cum febris non leuetur: aut leuata quoq; ea somnus urgeat. Nam si expergiscatur, adhibere ei ut sopito supernacuum est. neq; enim uiglando melior fit: sed per se, si melior est: uigilat. Si uero continens ei somnus est: utiq; excitandus est. sed his temporibus quibus febris leuissima est, ut et excernat aliqd, & sumat. Excitat aut ualidissime repente aqua frigida infusa post remissionem. Itaq; perunctum oleo multo corpus tribus, aut quatuor amphoris totum per caput perfundendum est. Sed hoc utemur, si æqualis ægro spiritus erit: si mollia præcordia. Sin aliter hæc erunt: ea potiora, quæ supra comprehensa sunt. Et quod ad somnum quidem pertinet, commodissima hæc ratio est. Medendi autem causa caput radendum: deinde postea fouendum est aqua: in qua laurus, aut ruta decocta sit. Altero die imponendum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, aut lauri bacce, aut hedera cum rosa, et aceto. Præcipueq; proficit, & ad excitandum hominem naribus admotum, & ad morbum ipsum depellendum capiti, fronti uel impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest, maximeq; oportune cibus datus: idest in remissione quanta maxima inueniri poterit: aptissima autem sorbitio est, donec morbus, decrescere incipiat: sic ut si cotidie grauis accessio est: hæc cotidie detur. Si alternis, post grauiorem, sorbitio: post leuiorem, mulsæ aqua. Vinum quoq; cum tempestiuo cibo datum, non mediocriter adiuuat. quod si post longas febres eiusmodi torpor corpori accessit: cætera eadem seruanda sunt. Ante accessionem aut tribus, quattuor uel horis castoreum, si uenter astrictus est: mixtum cum scamonea: si non est, per se ipsum cum aqua dandum est. Si præcordia mollia sunt, cibus utendum est plenioribus. Si dura, in hisdem sorbitionibus subsistendum: imponendūq; est præcordijs, quod simul et reprimat, et emolliat.

De aqua inter cutem, hoc est hydropico morbo. Caput. XXI.

Ed hic quidem acutus est morbus. Longus uero fieri potest eorum, quos aqua inter cutem male habet: nisi primis diebus discussus est: ὕδρωπα græci uocant. Atq; eius tres species sunt. Nam modo uentre uehementer intento creber intus ex motu spiritus sonus est. modo corpus inæquale est: tumoribus aliter, aliterq; per totum id orientibus. modo intus in unum aqua contrahitur: & moto corpore ita mouetur, ut impetus eius conspici possit. Primum τιμπανίτην, secundum λωκοπλευματίαν, uel ὕπόσαρκα, tertium ἀσκήτην græci nominant. Communis in omnium est humo-

Aurelij Cor.

f



ris nimia abundantia: ob quam ne ulcera quidē in his ægris facile sa-  
 nescent. Sæpe uero hoc malū per se incipit. Sæpe alteri uetusto mor-  
 bo, maximeq; quartanæ superuenit. Facilius in seruis, quā in li-  
 beris tollitur. quia cum desideret famem, sitim, mille alia tedia, lon-  
 gamq; patientiam: promptius his succurritur, qui facile coguntur: quā  
 quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt: si ex  
 toto sibi temperare non possunt: ad salutem perducuntur. Ideoq; non  
 ignobilis medicus Chrysippi discipulus apud Antigonum regem am-  
 cum quendam eius notæ intemperantiæ mediocriter eo morbo impli-  
 citum, negauit posse sanari. Cumq; alter medicus epirotes Philippus se  
 sanaturum polliceretur: respondit illum ad morbum ægri respicere: se  
 ad animum. neq; eum res fefellit. Ille. n. cum summa diligentia non  
 medica tantummodo, sed etiam regis custodiretur: tamen malagmata  
 sua deuorando, bibendoq; suam urinam, in exitium se præcipitauit.  
 Inter initia tamen non difficillima curatio est: si imperata sunt corpo-  
 ri quies, sitis, inedia. At si malum inueterauerit: non sine magna mo-  
 lestia discutitur. Metrodorum tamen Epicuri discipulum referunt: cum  
 hoc morbo tentaretur, neq; æquo animo ferret necessariam sitim: ubi  
 diu abstinerat: bibere solitum, deinde euomere. Quod si redditur  
 qui quid receptum est: multum tedio demit. si à stomacho retentum  
 est, morbum auget. Ideoq; in quolibet tentandum nō est. Sed si febris  
 quoq; est: hæc in primis submouenda est per eas rationes: per quas  
 huic succurri posse propositum est. Si sine febre æger est: tum demū ad  
 ea ueniendum est, quæ ipsi morbo mederi solent. atq; hic quoq; quæ-  
 cunq; species est, si nondum nimis occupauit: hisdem auxilijs opus est.  
 multum ambulandum. currendum aliquid est. superiores maxima  
 partes sic perfricandæ, ut spiritum ipse contineat. euocandus est su-  
 dor non exercitatione tantummodo, sed etiam in harena calida, uel laco-  
 nico, uel clibano, simulibusq; alijs: maximeq; utiles naturales, et siccæ  
 sudationes sunt: quales super baias habemus in myrtetis. balneū, atq;  
 omnis humor alienus est. Ieiuno recte catapotia dantur facta ex ab-  
 sinthij duabus: myrrhæ uetertia parte. Cibus esse debet ex media qui-  
 dem materia: sed tamen generis durioris. Potio non ultra danda est,  
 quā ut uitam sustineat. optimaq; est, quæ urinā mouet. Sed id ipsum  
 tamen molliori cibo, quā medicamento melius est. Si tamen res coget ut  
 ex his aliquid detur: præstanter id decoquendū, eaq; aqua potui dan-  
 da. Videntur autem hanc facultatem habere, iris, nardum, crocum, cin-  
 namum, amomum, cassia, myrra, balsamum, galbanum, ladanum, oe-  
 nante, panace, cardamomum, hebenus, cupressi semen, una timinia, quā  
 σαρδίαν ἀργύριον græci nomināt: abrotanum, rosæ folia, acorum, ama-

*rae maces, tragoriganum, storax, costum, iunni quadrati & rotundi*  
*semen: illud κνύρον, χαϊρον hoc graeci vocant. Quae quotiens posuero,*  
*non quae hic nascuntur, sed quae inter aromata afferuntur, signifi-*  
*cabo. Primo tamen quae leuissima ex his sunt: idest rosae folia, uel nar-*  
*di spica tentanda sunt. Vinum quoque utile est, & austerum: sed quam*  
*tenuissimum. Commodum est etiam lino cotidie uentrem metiri: &*  
*qua comprehendit aluum, notam imponere. postero die uidere si ple-*  
*nius corpus sit: an extenuetur. Id enim quod tenuatur, medianam sen-*  
*tit. Neque alienum est metiri & potionem eius, et urinam. Nam si plus*  
*humoris excernitur, quam assumitur: ita demum secundae ualitudi-*  
*nis spes est. Asclepiades in eo qui ex quartana in hydropa deade-*  
*rat: se abstinentia bidui & frictione usum. tertio die iam et febre,*  
*& aqua liberato abum, & uinum dedisse, memorie prodit. Hacte-*  
*nus communiter de omni specie dici potest. Si uehementius malum est,*  
*diducenda ratio curandi est. Ergo si inflammatio, et ex ea dolor creber*  
*est: utilis quotidianus aut alterno quoque die post cibum, uomitus est. Fo-*  
*mentis siccis, calidisque utendum est. Si per haec dolor non finitur, ne-*  
*cessariae sunt sine ferro cucurbitulae. Si ne per has quidem tormentum*  
*tollitur: incidenda cutis est: & tum his utendum. Vltimum auxilium*  
*est: si cucurbitulae nihil profuerunt: per aluum infundere copiose*  
*aquam calidam, eamque recipere. Quin etiam cotidie ter, quaterue*  
*opus est uti frictione uehementi cum oleo, & quibusdam calefacienti-*  
*bus. Sed in hac frictione a uentre abstinendum est. Imponendum uero*  
*in eum crebrius sinapi, donec cutem erodat: ferramentisque cadentibus*  
*pluribus locis uenter exulcerandus est: & seruanda ulcera diutius.*  
*Vtiliter etiam scylla cocta delinitur cutis: sed diu post has inflam-*  
*mationes abstinendum est ab omnibus instantibus. At si id uitium est, cui*  
*αὐκονοπλαγία nomen est: eas partes quae tument, subijcere soli opor-*  
*teret: sed non nimium, ne febricula incidat. si is uehementior est, caput*  
*uelandum est: utendumque frictione madefactis tantum manibus aqua:*  
*cui sal, & nitrum, & olei paulum sit adiectum sic, ut aut pueriles, aut*  
*muliebres manus adhibeantur: quo molior earum tactus sit. Idque si*  
*uires patiuntur, ante meridiem tota hora: post meridiem semi hora fieri*  
*oportet. Vtilia etiam sunt cataplasmata quae reprimunt: maximeque si*  
*corpora teneriora sunt. Incidendum quoque est super talum quattuor*  
*ferè digitis ex parte interiore: qua per aliquot dies frequens humor fe-*  
*ratur: atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet. Concutiendumque*  
*multa gestatione corpus est: atque ubi induratae uulneribus cicatrices sunt,*  
*ad iacendum & exercitationibus est, & cibis, donec corpus ad primum*  
*habitum reuertatur. Cibus ualens esse debet, & glutinosus, maximeque*

*metiri in*  
*utrum qu*  
*fidie deb*  
*nas et c.*

*ura dol*  
*is ex fl*  
*bibj*

*frictio*



atro. Vinum, si per stomachum licet: dulcius. sed ita ut inuicē biduo, triduo uel modo aqua, modo id bibatur. Prodest et lactucae marinae quae grandis iuxta mare nascitur, semen cum aqua potui datum. Si ualens est qui id accipit: ei scylla cocta sicut supra dixi, delinitur. Anthoresque multi sunt: inflatis uescis pulsandos tumores esse. Si uero id morbi genus est, quo in uterum multa aqua contrahitur: ambulare, sed magis modice oportet. malagma quod digerat impositum habere: idque ipsum super imposito triplici panno fasciā, non nimium tamen uehementer astringere. quod à Tharria profectum, seruatum esse à pluribus uideo. Si iecur aut lienem affectum esse manifestum est: ficum pinguem contusam adiecto melle superponere. Si per talia auxilia uenter non fiat: sed humor nihilominus abundat: celeriore uia succurrere, ut is per uentrē ipsum emittatur. Neque ignoro Erasistrato displicuisse hanc curandi uiam. Morbum enim hunc iocineris putauit. Ideoque ita illum esse sanandum: frustraque aquam emitti: quae uitiatō illo subinde nascatur. sed primum non huius uisceris unius hoc uitium est. Nam splene affecto, et in totius corporis malo habitu fit: deinde ut inde coeperit: tamen aqua nisi emittitur, quae contra naturam ibi subsistit: et iocineri, et ceteris interioribus partibus nocet. conuenitque corpus nihilominus esse curandum. neque enim sanat emissus humor: sed medicinae locum facit, quam intus inclusus impedit. Ac ne illud quidem in controuersiam uenit: quin non omnes in hoc morbo sic curari possint: sed imenes robusti, qui uel ex toto carent febre: uel certe satis liberales intermissiones habent. Nam quorum stomachus corruptus est, qui uel ex atra bile huc deciderunt: quique malum corporis habitum habent: idonei huic curationi non sunt. Cibus autē quo die primum humor emissus est, supernacius est: nisi si uires desunt. Insequentibus diebus et his uinum meracius quidem, sed non ita multum dari debet, paulatimque euocandus aeger est ad exercitationes, frictiones, solem, sudationes, navigationes, et idoneos cibos: donec ex toto conualecat. Balneum rarum res amat: frequentiore in ieiunio uomitum. Si aestas est, in mare nature commodum est. ubi conualuit aliquis, diu tamen alienus ei ueneris usus est.

De tabe, et eius speciebus, et curationibus. Caput. XXII.

Intius saepe et periculosius tabes eos male habet, quos  
 d in uasit. Atque huius quoque plures species sunt. Vna est  
 qua corpus non alitur: et naturaliter semper aliquibus  
 decedentibus, nullis uero in eorum locum subeuntibus,  
 summa



summa macies oritur: & nisi occurratur, tollit. & ὀφθαλμοὺς hanc græci uocant. Ea duabus ferè de causis incidere consuevit. aut enim nimio timore aliquis minus, aut auaritia nimia plusquam debet: assumit. ita uel quod deest, infirmat: uel quod superat, corrumpitur. Altera species est, quam græci καχεξία appellam: ubi malus corporis habitus est. ideoq; omnia alimenta corrumpuntur. quod ferè fit, cum longo morbo uitiata corpora, etiam si illo uacant: refectioem tamen nõ accipiunt: aut cum malis medicamentis corpus affectum est, aut cum diu necessaria defuerunt, aut cum inusitatos & inutiles cibos aliquis assumpsit, aliquid uel simile incidit. Huic præter tabem illud quoq; nõnunq; accidere solet, ut per assiduas pustulas, aut ulcera, summa cutis exasperetur: uel aliquæ corporis partes intumescant. Tertia est, longeq; periculosissima species, quam græci φθίσις nominauerunt. Oritur ferè à capite: inde in pulmonem destillat: huic exulceratio accedit. ex hac febricula leuis fit: quæ etiam cum quieuit, tamen & repetit. Frequens tussis est. pus excreatur: interdum cruentum aliquid. Quicquid excreatum est, si in ignem impositum est: mali odoris est. Itaq; qui de morbo dubitant, hac nota utuntur. Cum hæc genera tabis sint, animaduertere primum oportet, quid sit in quo laboratur. deinde si tantummodo non ali corpus apparet: causam eius attendere: & si cibi minus aliquis quàm debet, assumit: adijcere, sed paulatim: ne si corpus insuetum subita multitudine onerauerit: concoctionem impediat. Si uero plus iusto quis assumere solitus est: abstinere uno die, deinde ab exiguo cibo incipere: cotidie adijcere donec ad iustum modum perueniat. Præter hæc conuenit ambulare locis quàm minime frigidis sole uitato: p manus quoq; exerceri. Si infirmior est, gestari, ungi, perfricari si potest maxime per se ipsum sæpius eodem die, & ante cibum, & post eum sic, ut interdum oleo quædam adijciantur calefacta, donec insudet. Prodestq; ieiuno prehendere per multas partes cutem: & attrahere ut relaxetur: aut imposita resina, & abducta subinde idem facere. Vtile est etiam interdum balneum: sed post cibum exiguum. Atq; in ipso solio recte cibi aliquid assumitur: aut si sine hoc frictio fuit, post eam protinus. Cibi uero esse debent ex his, qui facile concoquuntur: qui maxime alunt. Ergo uini quoq; sed austeri necessarius usus est. mouenda urina. at si malus corporis habitus est, primum abstinendum est: deinde aluus ducenda. tum paulatim cibi dandi adiectis exercitationibus, unctionibus, frictionibus. Vtilius his frequens balneum est: sed ieiunis etiam usq; sudorem. Cibis uero opus est copiosis, uarijs, boni succi: quiq; etiam minus facile corrumpantur: uino austero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mitten-

*Phthisis  
uena*

dus est, sed paulatim cotidieq; pluribus diebus cū eo, ut cætera quoq;  
 eodem modo seruetur. Quod si mali plus est, & uera p̄s̄is est: in-  
 ter initia protinus occurrere necc̄sarium est. neq; enim facile is mor-  
 bus cum inueterauerit, euincitur. Opus est si uires patiuntur longa na-  
 uigatione, coeli mutatione sic, ut densius quā id est, ex quo discedit,  
 æger: petatur. Ideoq; aptissime Alexandria ex Italia itur. Ferēq; id  
 posse inter principia corpus pati debet: cum hic morbus ætate firmis-  
 sima maxime oriatur: id est ab anno duodecimo, ad annum quintū,  
 & trigessimū. Si id imbecillitas non sinit, naue tñ non longe gestari  
 cōmodissimum est. Si navigationē aliqua res prohibet: lectica uel alio  
 modo corpus dimouendum est. Tum a negocijs abstinendum est: omni-  
 busq; rebus, quæ sollicitare animum possunt. somno indulgendum: ca-  
 uenda defillationes, ne si quid cura lenarit: exasperetur. & ob id ui-  
 tanda cruditas: simulq; sol, & frigus. Os obtegendum: fauces uelandæ:  
 tussicula suis remedijs finienda. et quādiu quidem febricula incur-  
 sat, huic interdum abstinentia, interdum etiam tempestiuis cibis mēden-  
 dum. Eoq; tempore bibenda aqua. Lac quoq;, quod in capitis dolori-  
 bus, & in acutis febribus, & per eas facta nimia sitis, siue præcor-  
 dia tument, siue biliosa urina est, siue sanguis fluxit, pro ueneno est.  
 in phthisi tamen sicut in omnibus longis, difficilibusq; febriculis recte  
 dari potest. Quod si febris aut nondum incurSAT, aut iam remisit:  
 decurrendum est ad modicas exercitationes, maximeq; ambulationes:  
 item lenes frictiones. Balneum alienū est. Cibus esse debet primo aer,  
 ut alliu, porrum, idq; ipsum ex aceto. uel ex eodē intubus, ocymum, la-  
 ctuca. Dein lenis ut sorbitio ex ptisana, uel ex alia, uel ex amylo la-  
 cte adiecto. Idem oriza quoq; et si nihil aliud est: far præstat. Tū in-  
 uicem modo his cibis, modo illis utendum est. adiiciendāq; quædam ex  
 media materia, præcipueq; uel ex apruna, cerebellū, uel pisciculus, &  
 his similia. Farina ē cum seuo ouillo, caprino uel mixta, deinde inco-  
 cta pro medicamēto est. uinum assumi debet lene, austerum. Nactenus  
 non magna mole pugnatur. Si uehementior noxa est, ac neq; febricula,  
 neq; tussis quiescit: tenuariq; corpus apparet: ualidioribus auxilijs  
 opus est. Exulcerandus est ferro candenti uno loco sub mento, altero in  
 gutture: duobus ad mammam utraq; item sub imis ossibus scapula-  
 rum, quas ὠμοπλάται græci uocant: sic ne sanescere ultra sinamus, nisi  
 tussi finita: cui per se quoq; mēdendum esse manifestū est. Tunc ter,  
 quaterq; die uehementer extrema partes perfricandæ. thorax leui  
 manu pertractandus. post cibum intermittenda hora: & perfricanda  
 crura, brachiaq;. Interpositis denis diebus demittendus est æger in so-  
 lium: in quo sit aqua calida, & oleum. cæteris diebus bibenda aqua:

pro liend.  
 ihiote de  
 utiones  
 & Hyp. s. aff.  
 (6a)

materia  
 ultra san-  
 tatur



tum & vinum: si tussis non est, potui frigidum dandum: si aestas est, egelidum. Vtile est etiam cibos in remissionibus cotidie dari: frictiones, gestationesq; similiter adhiberi. eadem acria quarto, aut quinto die sumere. interdum herbam sanguinalem ex aceto, uel plantaginem esse. Medicamentum etiam est uel plantaginis succus per se, uel marrubium ex melle concoctum, ita ut illius cyathus sorbillo sumatur: huius cochleare plenum paulatim delingatur: uel inter se mixta, & incocta resina terebinthina pars dimidia: butyri, et mellis pars altera. Praecipua tamen ex his omnibus sunt uictus, uehiculum, & nauis, & sorbitio. Alius citra utiq; uitanda est. Vomitus in hoc morbo si frequens est, perniciosus est, maximeq; sanguinis. Qui meliusculus esse coepit, addicere debet exercitationes, frictiones, cibos: deinde ipse se suppresso spiritu perfricare: diu abstinere a uino, balneo, uenere.

De comitialis morbi curationibus. Caput. XXIII.

Inter notissimos morbos est et is, qui comitialis, uel maior nominatur. Homo subito concidit: ex ore spumae mouentur: deinde interposito tempore ad se redit: & per se ipsum consurgit. Id genus saepius uiros quam foeminas occupat. ac solet quidem et longum esse, usq; ad mortis diem: & uita non periculosum: interdum tamen cum recens est hominem consumit: & saepe cum si remedia non sustulerunt, in pueris ueneris, in puelis menstruorum initium tollit. modo cum distentione membrorum, aut nervorum prolabitur aliquis: modo sine illa quidem. Hos quoq; hisdem quibus lethargicos excitare conantur, quod admodum supernacuum est: & quia ne lethargicus quidem is sanatur: & quia cum possit ille nunquam expergisci, acq; ita fame interire: hic ad se utiq; reuertitur. Vbi concidit aliquis, si nulla nervorum distentio accessit, utiq; sanguis mitti debet: si accessit, non utiq; mittendus est, nisi alia quoq; hortantur. necessarium aut est ducere aluum: uel nigro ueratro purgare: uel utrunq; facere si uires patiuntur. tunc caput tondere: oleoq; & aceto pun gere: cibum post diem tertium simul cum transit hora, qua concidit, dare. Neq; sorbitiones aut his, aliq; molles, & faciles cibi, neq; caro, minimeq; suilla conuenit: sed mediae materiae. Nam et uiribus opus est: & cruditates cauendae sunt, cum quibus fugere oportet solem: balneum, ignem, omniaq; calefacientia. item frigus, uinum, uenere, loci

praecipitis conspectum, omniumq; terrentium, uomitum, lassitudinem, solitudines, negocia omnia. Vbi tertio die cibus datus est, intermittere quartum, & inuicem alterum quenq; eadem hora cibi seruata: donec quatuordecim dies transeant. quos ubi morbus exisset: acuti uim



deposuit. at si manet, curandus iam ut longus est. Quod si non quo die primum id incidit, medicus accessit: sed is qui cadere consuevit, ei traditus est: protinus eo genere uictus dabitur: qui supra comprehensus est: expectandus est dies, quo prolatur: utendumq; tum uel sanguinis missione, uel ductionealui, uel nigro ueratro: sicut præceptum est. In sequentibus deinde diebus per eos cibos quos proposui: uitatis omnibus quæ cauenda dixi: nutriendus. Si per hæc morbus finitus non fuerit: confugiendum erit ad album ueratrum: ac ter quoq; aut quater eo utendum: non ita multis interpositis diebus, sic tamen ne iterum unquam sumat, nisi conciderit. Medijs autem diebus uires eius erunt nutriendæ, quibusdā præter ea quæ scripta sunt, adiectis. Vbi mane ex perfectus est, corpus eius leniter ex oleo uetere, cū capite, excepto uentre, permulceatur. tum ambulatione quàm maxime longa, & recta utatur. post ambulationem loco tepido uehementer & diu, ac non minus ducenties, nisi infirmus erit, perfricetur: deinde per caput multa aqua frigida perfundatur. paulum cibi assumat: conqueſcat: rurſus ante noctem ambulatione utatur: iterum uehementer perfricetur sic, ut neq; uenter, neq; caput contingatur: post hæc cœnet: interpositisq; tribus, aut quattuor diebus, uno aut altero acria assumat. Si ne p hæc quidem fuerit liberatus, caput radat: ungatur oleo uetere, adiecto aceto, & nitro: perfundatur aqua salsa: bibat ieiunus ex aqua castoreû: nulla aqua nisi decocta potionis causa utatur. Quidam ingulati gladiatoris calido sanguine epota, tali morbo se se liberarunt: apud quos miserû auxilium, tolerabile miserius malum fecit. Quod ad medicû uero pertinet, ultimû est iuxta taliû ex uiroq; crure paulum sanguinis mittere: occipitium incidere: & cucurbitulas admouere ferro candente: in occipitio quoq; & infra, qua summa uertebra cum capite committitur, adurere duobus locis, ut per ea perniciosus humor euadat. quibus si finitum malum non fuerit, propè est, ut perpetuum sit. Ad leuandum id tantummodo utendum erit exercitatione, multa frictione, cibisq; his, qui supra comprehensi sunt. præcipueq; uitanda omnia, quæ ne fierent, excepimus.

## De regij morbi curatione. Caput. XXIII.

Equè notus est morbus, quem interdum arquatû, interdum regium nominant: quem Hippocrates ait: si post septimum diem febricitante agro supervenit, tutum esse mollibus tantummodo præcordijs substantibus. Diocles ex toto si post febrem oritur, et prodesse, si post hunc febris, cadere. Color autem

remedia loci  
ad oculum  
in quibus  
Sedat ad  
interius in  
signa te est  
num. rabilis

lor autem eum morbum detegit maxime oculorum: in quibus quod album esse debet, fit luteum. Soletq; accedere & sitis, & dolor capitis, & frequens singultus, & præcordiorum dextra parte durities: & ubi corporis uehemēs motus est, spiritus difficultas, membrorumq; resolutio. atq; ubi diutius manet morbus, totum corpus cum pallore quodam inalbescit. Primo die abstinere ægrum oportet: secundo ducere aluum: tum si febris est, eam uictus genere discutere. si non est, scamoneam potui dare: uel cum aqua betam albam contritam, uel cum aqua malsa nuces amaras, absinthium, anesum sic, ut pars huius minima sit. Asclepiades aquam quoq; salsam, & quidem per biduum purgationis causa bibere cogebat ijs, quæ urinam mouent: reiectis. Quidam superioribus ommissis, per hæc et per eos cibos, qui extenuant: idē se consequi dicunt. Ego ubiq; si satis uirium est, ualidiora: si parum, imbecillia auxilia præfero. Si purgatio fuit, post eam triduo: primo modice cibum oportet assumere ex media materia: & uinum bibere græcum salsum, ut resolutio uentris maneat. tum altero triduo ualidiores cibos, & carnis quoq; aliquid esse. intra aquā manere. deinde ad superius genus uictus reuerti cum eo, ut magis satietur omisso græco uino bibere integrum austerū: atq; ita per hæc uariare, ut interdum acres quoq; cibos interponat: interdum ad salsum uinum redeat. Per omne uero tempus utendum est exercitatione, frictione: si hyems est, balneo: si æstas, frigidis natationibus: lecto ēt, & conclauī cultiore. clauso loco uti ludis, lasciniis: per quæ mens exhilaretur. ob quæ regius morbus dictus uidetur. Malagma quoq; quod digerat, super præcordia datū, prodest: uel arida ibi sicus imposita, si iecur, aut lienis affectus est.

## De elephantie curatione. Caput. XXV.

i Gnotus autem penē in italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem ἐλεφαντία græci uocant. isq; longis annumeretur. Totum corpus afficitur, ita ut ossa quoq; uitiari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas, crebrosq; tumores habet. Rubor harum paulatim in atrum colorem conuertitur. Summa cutis inæqualiter crassa, tenuis, dura, mollisq; quasi squamis quibusdam exasperatur: corpus emacrescit: os suræ: pedes intumescunt. Vbi uetus morbus est, digiti in manibus, pedibusq; sub tumore conduntur: febricula oritur, quæ facile tot malis obrutum hominem consumit. protinus ergo inter initia sanguis per biduum mitti debet: aut nigro ueratro uenter solui: adhibenda tū quanta sustineri potest, inedia est. paulum deinde uires reficiendæ: &

ducenda alius. post hæc, ubi corpus leuatum est, utendum est exercitatione, præcipueq; cursu. sudor primum labore ipsius corporis, deinde etiam sicut sudationibus euocandus. frictio adhibenda: moderatimq; inter hæc, ut vires conseruentur: balneum rarum esse debet. Cibus sine pinguibus, sine glutinosis, sine instantibus. Vinum, præterquam primis diebus, recte datur. Corpus contrita plantago, & illita tueri optime uidetur.

De attonitis, & eorum curatione. Caput. XXVI.

Ittonitos quoq; raro uidemus: quorum & corpus, & mens  
a stupet. Fit interdum ictu fulminis: interdum morbo: ἀπο  
πληξίαν hūc græci appellant. Huius sanguis mittendus est.  
ueratro quoq; albo, uel alui ductione utendum. Tum adhibendæ fric-  
tiones: & ex media materia minime pingues cibi. quidam et acres:  
& à uino abstinendum.

De resolutione neruorum: quæ apoplezia, uel paralysis dicitur.  
Caput. XXVII.

T resolutione neruorum frequens ubiq; morbus est. Sed in  
a terdum tota corpora, interdum partes infestat. Veteres  
authores illud ἀποπληξίαν, hoc παράλυσιν nominauerunt. Nunc utrunq; paralyzin appellari uideo. Solent  
autem qui per omnia membra uehementer resoluti sunt, celeriter rapi-  
ac si correcti non sunt, diutius quidem uiuunt: sed raro tamē ad sa-  
nitatem perueniunt: & plerumq; miserum spiritum trahunt, memoria  
quoq; amissa. In partibus uero nunquam acutus, sæpe longus, ferè sa-  
nabilis morbus est. si omnia membra uehementer resoluta sunt. sangui-  
nis detractio uel occidit, uel liberat. Aliud curationis genus uix un-  
quam sanitatem restituit: sæpe mortem. tantum differt uitam: interim  
infestat. Post sanguinis missionem si non redit & motus, & mens: ni-  
hil spei superest. Si rediit: sanitas quoq; prospicitur. At ubi pars reso-  
luta est, prouidet malo corporis, uel sanguis missus, uel alius ducta. *leues uene*  
Cætera eadem in utroq; casu facienda sunt. Si quidem uitare præcipue  
conuenit frigus: paulatimq; ad exercitationes reuertendum est sic, ut  
ingrediatur ipse protinus, si potest. Si id crurum imbecillitas prohi-  
bet: uel gestetur, uel motu lecti concitatur: tum id membrum quod de-  
ficiat si potest, per se, si minus, per alium moueatur: & ui quadam ad  
consuetudinem suam redeat. Prodest et torpentibus mēbris summam



cutem exasperasse, uel urticis caesam, uel imposito sinapi sic, ut ubi rubere coeperit corpus: hæc remoueantur. Scylla quoq; contrita, bulbiq; contriti cum thure recte imponuntur. Neq; alienum est resina cutem tertio quoq; die diutius uellere: pluribus et locis aliquando sine ferro cucurbitulas admoovere. Vnctioni uero aptissimum est uetus oleum, uel nitrum aceto, et oleo mixtum. Quin etiam fouere aqua calida marina: uel si ea non est, tamen salsa, magnopere necessarium est. At si quo loco uel naturales, uel etiam manu factæ tales natationes sunt, ijs potissimum utendum est: præcipueq; in his agitata membra, quæ maxime deficiunt. si id non est, balneum tamen prodest. Cibus esse debet ex media materia, maximeq; ex uenatione. potio sine uino aquæ calidæ. Si tamen uetus morbus est, interponi quarto, uel quinto die purgationis causa uinum græcum salsum prodest. Post coenam utilis uomitus est. Interdum uero etiam neruorum dolor oriri solet. In hoc casu non oportet uomere: non medicamentis urinam mouere: non sine exercitatione sudores, ut quidam præcipiunt, expedit. Bibenda aqua est bis die. in lectulo leniter satis diu corpus perfricandum est. deinde retento spiritu ab ipsa exercitatione potius superiores partes mouendæ. balneo raro utendum: mutandum subinde peregrinationibus cælum. si dolor est, ea ipsa pars sine oleo nitro ex aqua perungenda est: deinde in uoluenda, et subiicienda pruna lenis, et sulphur. atq; ita id suffumigandum: idq; aliquandiu faciendum. sed ieiunio cum bene iam concoxerit, cucurbitulæ quoq; sæpe dolenti parti admouendæ sunt: pulsandusq; leuiter inflatis uescis bubulis is locus est. Vtile est et seum miscere cum uorruæ, et urticæ contritis siminibus sic, ut omniū par modus sit: idq; imponere: fouere aqua, in qua sulphur decoctum sit. Vtricoli quoq; recte imponuntur aqua calida repleti: aut bitumen cum ordea cæa farina mixtum: atq; in ipso potissimum dolore utendum gestatione uehementi est. quod in alijs doloribus pessimum est. Tremor aut neruorum æque uomitu, medicamentisq; urinam mouentibus impeditur. Inimica etiam habet balnea, assasq; sudationes. bibenda aqua est. acris ambulatione utendum. item unctionibus, frictionibusq; maxime per seipsum. pila, similibusq; superiores partes dimouendæ. cibo quolibet utendum, dummodo concoctioni utiq; studeatur. secundum cibum curis abstinendum. rarissima uenere utendum est. si quando quis in eâ prolapsus est: tum oleo leniter, diuq; in lectulo perfricari manibus puerilibus, potius quam uirilibus debet. suppurationes autem quæ in aliqua interiori parte oriuntur, ubi notæ fuerint: primum id agere oportet p ea cataplasmata, quæ reprimunt: ne coctus inutilis materiæ fiat. deinde si hæc uicta sunt, p ea malagmata quæ digerunt: diffi-

*ubi a nen  
tine --*

pentur. Quod si consecuti non sumus, sequitur, ut euocetur: deinde ut maturescat: omnis tunc uomicae finis est, ut rumpatur. Inditiumq; est, pus uel aluo, uel ore redditum. sed nihil facere oportet quo minus quicquid est puris, excedat. Utendum maxime sorbitionibus est: Et aqua calida: Vbi pus ferri desit, transeundum ad faciles quidem, se d tamen ualidiores, Et frigidos cibos, frigidamq; aquam sic, ut ab egeli dis tamen initium fiat. primoq; cum melle quedam edenda, ut nuc lei pinei, uel graecae nuges, uel auellanae. Postea submouendum id ip sum, quo maturius induci cicatrix possit. Medicamentum eo tempore ulceri est, sucus assumptus uel porri, uel marrubij: Et omni cibo por rum ipsum adiectum. Oportebit autem uti in his partibus quae non afficientur, frictionibus: item ambulationibus lenibus. Vitandumq; erit, ne uel luctando, uel currendo, uel alia ratione sanescientia ulcera exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoq; omnimodo ca uendus sanguinis uomitus est.

## De humani corporis interioribus sedibus. Caput. I.

h

Actenus reperiuntur ea genera morborū: quæ in totis corporibus ita sunt, ut ijs certæ sedes assignari non possint. Nunc de his dicam, quæ sunt in partibus. Facilius autem omnium interiorum morbi, curationesq; in noticiam uenient: si prius eorum sedes breuiter ostendero.

Caput igitur, eaq; quæ in ore sunt, non lingua tantummodo, palatūq; terminantur: sed etiam quatenus oculis nostris exposita sunt. In dextra, sinistraq; circa guttur uenæ grandes, quæ σφαγιτιδες nominantur: itemq; arteriæ, quas πρῶτισσας uocant: sursum procedentes ultra aures feruntur. atq; in ipsis ceruicibus glandulæ positæ sunt: quæ interdum cum dolore intumescunt. Deinde duo itinera incipiunt. alterum asperam arteriam nominant: alterum stomachum. arteria exterior ad pulmonem: stomachus interior ad uentriculum fertur. illa spiritum, hic cibum recipit: quibus cum diuersæ uia sint: quæ coeunt exigua in arteria sub ipsis faucibus lingua est. quæ cū spiramus, attollitur: cum cibum, potionemq; assumimus, arteriam claudit. Ipsa autem arteria dura, & cartilaginosa in gutture assurgit: cæteris partibus residet. Constat ex arcibus quibusdam compositis ad imaginem earū uertebularum, quæ in spina sunt: ita tñ, ut ex parte exteriori aspera, ex interiori stomachi modo leuis sit. eaq; descendens ad præcordia, cum pulmone committitur. Is spongiosus, ideoq; spiritus capax, et à tergo spinæ ipsi iunctus in duas fibras ungulæ bubulæ modo diuiditur. huic cor annexū est natura musculosum, in pectore sub sinisteriore māmā situm: duosq; quasi uentriculos habet. at sub corde, atq; pulmone transuersum, ex ualida membrana septum est: quod à præcordijs uterum diducit æque neruosum. Multis etiam uenis per id discurrentibus à superiore parte non solum intestina, sed iecur quoq; lienemq; discernit. Hæc uiscera proxima: sed infra tamē posita dextra, sinistraq; sunt. Iecur à dextra parte sub præcordijs ab ipso septo ortum intrinsecus cauum: extrinsecus gibbum: quod prominens leuiter uentriculo insidet: & in quattuor fibras diuiditur. Ex inferiore uero parte ei fel inhæret. at lienis sinistra non eidē septo, sed intestino innexus est: natura mollis, & rarus longitudo dimis, crassitudinisq; modicæ: isq; paulum à costarum regione in uterum excedens, ex maxima parte sub his conditur. atq; hæc quidem



*iuncta sunt. Renes uero diuersi, qui lumbis sub imis costis inhaerent à parte earum resimi, ab altera rotundi: qui & uenosi sunt: & uentriculos habent: & tunicas super continguntur: ac uiscerum quidem hæ sedes sunt. Stomachus uero qui intestinorum principium est, neruosus à septimæ spinæ uertebra incipit: ac circa præcordia cum uentriculo committitur. Venterculus autem qui receptaculum cibi est: constat ex duobus tergoribus: isq; inter lienem, & iecur positus est: utroq; ex his paulum super eum ingrediente. Suntq; etiam membranulae tenues, per quas inter se omnia ista connectuntur: iungunturq; ei septo, quod transversum esse supra posui. Inde ima uentriculi pars paulum in dexteriolem partem conuersa, in summum intestinum coartatur. Hanc iuncturam πύλονες græci uocant: quoniam portæ modo in inferiores partes ea quæ excreturi sumus, emittit. ab ea ieiunum intestinum incipit non ita implicitum, cui tale uocabulū est: quia nunquam quod accipit, continet: sed protinus in inferiores partes transmittit. Inde tenue intestinum est in sinus uehementer implicitum. Orbes uero eius per membranulas singuli cum inferioribus connectuntur, qui in dexteriolem partem conuersi, & è regione dexteroris coxæ finiti, superiores tamen partes magis complent. Deinde id intestinum cum crassiore altero transverso committitur: quod à dextra parte incipiens, in sinisteriolem peruium, & longum est: in dexteriolem non est. ideoq; cæcum nominatur. At id quod peruium est, late fusum, atq; sinuatum: minusq; quàm superiora intestina neruosum: ab utraq; parte huc, atq; illuc uolutum: magis tamen sinisteriores, inferioresq; partes tenens: contingit iecur, atq; uentriculum. Deinde cum quibusdam membranulis à sinistro rene uenientibus iungitur: atq; hinc dextra recuruatum in imo dirigitur, qua excernit. ideoq; id ibi rectum intestinum nominatur. Contegit uero uniuersa hæc omentum ex interiore parte læue, & strictū: ex superiore mollius. Cui adeps quoq; innascitur: quæ sensu sicut cerebrum quoq; & medulla caret. At à renibus singulæ uenæ calore albæ ad uesicam feruntur: οὐρῆται græci uocant: quod per eas inde descendentem urinam in uesicam desillare concipiunt. Vesica autem in ipso sinu neruosa, & duplex cervice plena, atq; carnosâ iungitur per uenas cum intestino, eoq; ossi, quod pubi subest. Ipsa soluta, atque liberior est: aliter in uiris, atq; in fœminis posita. Nam in uiris iuxta rectum intestinum est, potius in sinistra partem inclinata. In fœminis super genitale earum posita est: superq; elapsa ab ipsa uulua susinetur. Tum in masculis iter urinæ spaciosius, & compressius à cervice huius descendit ad colen. In fœminis breuius, & plenius super uulvæ aruiam*

se ostendit. Vulua autem in uirginibus quidem admodum exigua est. In mulieribus uero nisi ubi grauidæ sunt, non multo maior: quàm ut manus comprehendatur. Ea recta continuatq; ceruice, quæ canalem uocant: contra mediam alium orsa: inde paulum ad dexteriores coxam cōuertitur: deinde super rectum intestinum progressa, ilijs fœminæ latera sua innectit. Ipsa autem ilia inter coxas, & pubem imouentre posita sunt: à quibus ac pube abdomen sursum uersus ad præcordia peruenit: ab exteriori parte euidenti cute, ab interiori leni membrana inclusum: quæ omento iungitur: *περιτόνειος* autem à græcis nominatur.

De curationibus morborum, qui nascuntur à capite: & primo de eius dolore: deinde de morbo qui circa faciem nascitur: tum de linguae resolutione: postremo de desillatione, ac grauedine. Caput. II.

Is ueluti in conspectum quendam quatenus scire curanti necessarium est adductis, remedia singulariū laborantium partium exequar, orsus à capite. sub quo nomine nunc significo eam partem, quæ capillo tegitur. Nam oculorum, aurium, dentium dolor, & si quæ similis est: alijs erit explicandus. In capite autem interdū acutus, & pestifer morbus est: quem *νεφελίαι* græci uocant. Cuius notæ sunt horror calidus, neruorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, uomitus: sic ut uox supprimatur, uel sanguis ex naribus cursus: sic ut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis maxime circa tempora, uel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas: sed neq; grauis, neq; periculosa per hominis ætatem est. Interdum grauior dolor, sed breuis, neq; tamen mortiferus: qui uel uino, uel cruditate uel frigore, uel igne, aut sole contrahitur. Hiq; omnes dolores modo in febre, modo sine hac sunt: modo in toto capite, modo in parte interdum, sic ut oris quoq; proximam partem excrucient. Præter hæc et unum inuenitur genus, quod potest longum esse. ubi humor cutē inflat, eaq; intumescit, et prementi digito cedit, *ὀδονέφαλος* græci appellant. Ex his, id quod secundo loco positum est, dum leue est: quasi ratione curandum, dixi: cum persequerer ea, quæ sani homines in imbecillitate partis alicuius facere deberent. Quæ uero auxilia sunt capitis, ubi cum febre dolor est: eo loco explicitū est, quo febrium curatio exposita est. Nunc de cæteris dicendum: ex quibus id quod acutum est, et id quod supra consuetudinem intenditur: idq; quod ex subita causa, & si non pestiferum, tamen uehemens est: primā curationem

habet, quā sanguis mittatur. sed id, nisi intolerabilis est dolor, superuacuum est. satiusq; est abstinere à cibo: si fieri potest, etiam à potione: si non potest, aquam bibere. si postero die dolor remanet, aluum ducere: sternutamenta euocare: nihil assumere, nisi aquā. saepe enim dies unus, aut alter totum dolorem hac ratione discutit. utiq; si ex uino, uel cruditate origo est. si uero in his auxiliij parum est: tonderi oportet ad cutem. deinde considerandū est: quæ causa dolorem excitarit. si calor, aqua frigida multa perfundere caput expedit: spongiam concuā imponere, subinde in aqua frigida expressam: ungere rosa, & aceto, uel potius his tinctam lanam succidam imponere: aliāq; refrigerantia cataplasmata. At si frigus nocuit: caput oportet perfundere aqua calida marina, uel certe salsa, aut in qua laurus decocta sit: tum caput uehementer perfricare: deinde calido oleo implere: ueste uelare. qui dam ēt id deuinciunt. Alij cervicalibus uestimentisq; onerant: et sic leuantur. alios calida cataplasmata adiunant. Ergo ēt ubi causa incognita est, uidere oportet refrigerantia magis, an calefacientia leniant: & his uti, quæ experimentum approbarit. At si parum causa discernitur: perfundere caput primū aqua calida, sicut supra præceptum est: uel salsa, uel ex lauro decocta. tum frigida poscā. Illa in omni uetusto capitis dolore communia sunt: sternutamenta excitare, inferiores partes uehementer perfricare: gargarizare his, quæ salinam mouent: cucurbitulas temporibus & capitis admoovere: sanguinem ex naribus detrahere: resina subinde tempora peruellere: et imposito sinapi exulcerare ea, quæ male habent, ante linteolo subiecto, ne uehementer arrodāt: cidentibus feramentis ubi dolor est, ulcera excitare: cibū per modicum cum aqua sumere. ubi leuatus est dolor, in balneum ire: ibi multa aqua prius calida, deinde frigida per caput perfundi. Si discussus ex toto dolor est, etiam ad uinum reuerti: sed postea semper antequam quicquam aliud, aquam bibere. dissimile est id genus quod humorem in caput contrahit. In hoc tondere ad cutem necessarium est. deinde imponere sinapi, sic ut exulceret. si id parū profuit: scalpello utendum est. Illa cum hydropicis communia sunt, ut exerceatur: insudet: uehementer perfricetur: abis, potionibusq; utatur, urinā præcipue mouentibus.

De morbo, qui circa faciem nascitur: quem græci cynicum spasmus uocant.

Ita faciem uero morbus innascitur: quem græci κυνικὸν σπασμὸν nominant. Is cum acuta ferè febre oritur. Os cū motu



motu quodam peruertitur. ideoq; nihil aliud est, quàm dissentio oris. Accedit crebra coloris in facie, totoq; corpore mutatio. Somnus in promptu est. in hoc sanguinem mittere optimum est. Si finitum eo malum non est: ducere alium. si ne sic quidem discussum est: albo ueratro uomitum mouere. præter hæc necessarium est uitare solem, lassitudinē, uinum. sed si discussum his non est: utendum est cursu, frictione in eo quod læsum est leni, & multa in reliquis partibus breuiore, sed uehementi. prodest etiam mouere sternutamenta: caput radere: idq; perfundere aqua calida, uel marina, uel certe salsa sic, ut ei quoq; sulphur adiiciatur. post perfusionem iterum perficari: sinapi manducare: eo demq; tempore affectis oris partibus ceratum: integris idem sinapi, donec arrodatur, imponere. Cibus aptissimus ex media materia est.

De resolutione linguae.

**T** si lingua resoluta est: quod interdum per se, interdum ex morbo aliquo fit sic, ut sermo hominis non explicetur: oportet gargarizare ex aqua: in qua uel thymum, uel hyssopū, uel nepeta decocta sit: aquam bibere: caput, et os, & ea quæ submento sunt, & ceruicem uehementer perficari: laesere linguam ipsam: linere: manducare quæ sunt acerrima, idest sinapi, allium, cepam: magna ui luctari, ut uerba exprimantur: exerceri re tanto spiritu: caput sæpe aqua frigida perfundere: nonnunquam multam esse radiculam: deinde uomere.

De destillatione, ac grauedine.

**E**st illat autem humor ex capite interdum in nares: quod leue est. interdum in fauces: quod peius est. interdum et in pulmonem: quod pessimum est. Si in nares destillat: tenuis per has pituita profluit: caput leuiter dolet: grauitas eius sentitur: frequentia sternutamenta sunt. Si in fauces: has exasperat: tussiculam mouet. si in pulmonem: præter sternutamenta, & tussim, est etiam capitis grauitas, lassitudo, sitis, æstus, biliosa urina. Aliud autem quamuis non multum distans malum grauedo est. Hæc nares claudit: uocem obtundit: tussim siccam mouet: sub eadem salsa est salina: sonant aures: uenæ mouentur in capite: turbida urina est. Hæc omnia uox Hippocrates nominat. Nunc uideo apud græcos in grauedine hoc nomen seruari: destillationem *καταρρεύς* appellari. Hæc autem & breuia, & si neglecta sunt, longi esse consue-

runt. Nihil pestiferum est: nisi quod pulmonem exulcerauit. Vbi ali-  
 quid eiusmodi sensimus: protinus abstinere à sole, balneo, uino, uenere  
 debemus. Inter quæunctione, & assueto cibo nihilominus uti licet. am-  
 bulatione tantum acris: sed tecta utendum est: & post eam caput, atq;  
 os supra quinquagies perfricandum. Raroq; fit, ut si biduo, uel certe  
 triduo nobis temperauimus: id uitium non leuetur. Quo leuato, si in  
 destillatione crassa facta pituita est: uel in grauedine nares magis  
 patent: balneo utendum est: multaq; aqua prius calida, post egelida fo-  
 uendum os, caputq;. deinde cum cibo pleniore uinum bibendum. At si  
 æque tenuis die quarto pituita est: uel nares æque clausæ uidentur:  
 assumendum est uinum amineu austerum: deinde rursus biduo aqua:  
 post quæ ad balneum, & ad consuetudinem reuertendum est. Neq;  
 tamen illis ipsis diebus, quibus aliqua omittenda sunt: expedit tan-  
 quam ægros agere. sed cætera omnia quasi sanis facienda sunt. præ-  
 terquam si diutius aliquem, & uehementius ista sollicitare consuerunt.  
 Huic enim quædam curiosior obseruatio necessaria est. Igitur huic si  
 in nares, uel in fauces destillauit: præterea quæ supra retuli: protinus  
 primis diebus multum ambulandum est: perfricandæ uehementer in  
 feriores partes: leuior frictio adhibenda thoraci erit: leuior capiti. de-  
 munda assueto cibo pars dimidia: sumenda oua, amyllum: similiq;  
 quæ pituitam faciunt crassiores. Siti quanta maxime sustineri potest,  
 pugnandum est. Vbi per hæc idoneus aliquis balneo factus, eoq; usus  
 est: adiiciendus est cibo pisciculus, aut caro: sic tamen ne protinus in-  
 stus modus cibi sumatur. uino meraco copiosius utendum est. At si in  
 pulmonem quoq; destillat: multoq; magis & ambulatione, & frictio-  
 ne opus est. eademq; adhibita ratione in cibis, si non satis illi profi-  
 ciunt: acrioribus utendum est. magis somno indulgendum: abstinen-  
 dumq; à negocijs omnibus. aliquando sed serius & balneum tentan-  
 dum. In grauedine autem primo die quiescere: neq; esse: neq; bibere:  
 caput uelare: fauces lana circumdare. postero die surgere. diu abstinere  
 à potione, aut si res coegerit: non ultra heminam aquæ assumere. Ter-  
 tio die panis non tam multum ex parte interiore cum pisciculo, uel  
 leni carne sumere: aqua bibere. Si quis sibi temperare non potuerit,  
 quo minus pleniore uictu utatur: uomere. Vbi in balneum uentum  
 est, multa aqua calida caput, & os fouere usq; ad sudorem. tum ad ui-  
 num redire post quæ uix fieri potest, ut idem incommodum maneat.  
 sed si manserit, utendum erit cibis frigidis, aridis, leuibus, humore q̃  
 minimo: seruatis frictionibus, exercitationibusq;: quæ in omni tali ge-  
 nere ualitudinis necessariae sunt.

## De cernicis morbis, curationibusq; Caput. III.

Capite transitus ad cernicem est: quæ grauibus admodum morbis obnoxia est. neq; tamen aliis importunior, acutiorq; morbus est: quam is qui quodam rigore nervorum, modo caput scapulis: modo mentum pectori annectit: modo rectam, et immobilem cernicem intendit. Priore græcè ὀρθότονον, insequentem ἐμπαρότονον, ultimum ῥέτανον appellant. quamvis minus subtiliter quidam indiscretis his nominibus utantur. Ea sæpe intra quartum diem tollunt. si hunc euaserunt: sine periculo sunt. Omnia eadem ratione curantur: idq; conuenit. Sed Asclepiades utq; mittendum sanguinem credidit. Quod quidam uitandum esse dixerunt: eo quod maxime tum corpus calore egeret: isq; esset in sanguine. Verum hoc quidem falsum est. Neq; enim natura sanguinis est, ut utiq; caleat: sed ex his, quæ in homine sunt: hic celerrime uel calefit: uel refrigescit. Mitti uero nec ne debeat, ex his intelligi potest: quæ de sanguinis missione præcepta sunt. Vtiq; autem recte datur castoreum: & cum hoc piper, uel laser. Deinde opus est fomento humido, & calido. Itaq; pleriq; aqua calida multa cernices subinde perfundunt. id in præsentia lenat. sed cportuniores nervos frigori reddit. quod utiq; uitandum est. Vtilius igitur est cerato liquido primum cernicem perungere: deinde admoovere uestias, bubulas, uel utriculos oleo calido repletos, uel ex farina calidum cataplasma, uel piper rotundum cum fico contusum. Vtilissimum tamen est humido sale fouere. quod quomodo fieret, iam ostendi. Vbi eorum aliquid factum est, admoovere ad ignem: uel si æstas est, in sole ægrum oportet, maximiq; oleo uetere: si id non est, syriaco: si ne id quidem est, adipe quam uetustissima cernicem, & scapulas, & spinam perfricare. Frictio cum omnibus in homine uertebis utilis sit: cum is præcipue quæ in collo sunt. Ergo die, nocteq; interpositis tamen quibusdam temporibus hoc remedio utendum est. Dum id intermittitur, imponendum malagma aliquod ex calefactis. cauendum uero præcipue frigus. Ideoq; in eo conclauis, quo cubabit æger: ignis continuus esse debet: maximiq; tempore ante lucano: quo præcipue frigus intenditur. Neq; inutile erit caput attonsum habere: idq; irino, uel cyprino calido madefacere: & super imposito pilleo uelare. nonnunquam et in calidum oleum totum descendere: uel in aquam calidam: in qua foenum græcum decoctum sit: & adiecta olei pars tertia. Alius quoq; dicta sæpe superiores partes resoluit. si uero etiam uehementius dolor creuit: admouendæ cernicis uel curbitulae sunt sic, ut cutis incidatur: eadem aut feramentis, aut



sinapi adurendæ. Vbi leuatus est dolor, moueriq; cœuix cœpit, scire licet cedere remedijs morbum. Sed diu uitandus abus, quisquis mandendus est. Sorbitionibus utendum: itemq; ouis sorbilibus: aut à pullis mollibus ius aliquod assumendum. id si bene processerit: iamq; ex toto recte se habere ceruices uidebuntur: incipiendum erit à pulticula, uel intrita bene madida. Celerius tamen etià panis mandendus, quàm uinum gustandum. si quidem huius usus præcipue periculosus: ideoq; in longum tempus differendus est.

De faucium morbis, ac curationibus: Et primum de angina, deinde de difficultate spirandi: ultimo de tussi. Caput. IIII.

**I**n hoc autem morbi genus circa totam ceruicem, sic alterũ  
 II æque pestiferum, acutumq; in faucibus esse consuevit: nostrum anginam uocant. apud græcos nomen prout species est. Interdum enim neq; rubor, neq; tumor ullus apparet: sed corpus aridum est: uix spiritus trahitur: membra soluantur. id ουράχην uocant. Interdum lingua, faucesq; cum rubore intumescunt: uox nihil significat. oculi uertuntur. facies pallet. singultusq; ē: id ουράχην uocatur. Illa communia sunt, æger non cibum deuorare: nō potionem potest: spiritus eius includitur. Lenius est ubi tumor tantummodo et rubor est: cætera non sequuntur. id παρὰουράχην appellant. Quicquid est, si uires patiuntur, sanguis mittendus est. si non abundat: secundum est ducere aluum. Cucurbitula quoq; recte sub mento, et circa fauces admouetur: ut id quod strangulat, euocet. Opus est deinde fo mentis humidis. nam sicca spiritum elidunt. Ergo admoovere spongas oportet: quæ melius in calidum oleum: quàm in calidam aquam subinde demittuntur. Efficacissimusq; est hic quoq; salis calidi succus. Tum commodum est hyssopum, uel nepeta, uel thymum, uel absinthiũ, uel etiam fursures, aut ficus aridas, aut mulsam aquam decoquere: eaq; gargarizare. post hæc palatum ungere uel felle taurino, uel eo medicamento, quod ex moris est. polline etiam piperis id recte respergitur. Si per hæc parum proficiatur, ultimum est incidere satis altis plagis sub ipsis maxillis supra collum, et in palato citra unam uel eas uenas, quæ sub lingua sunt: ut per ea uulnera morbus erumpat. quibus si non fuerit æger adiutus, scire licet malo uictum esse. si uero his morbus leuatus est: iamq; fauces, et cibum, et spiritum capiunt: facilis ad bonã ualeitudinẽ recursus est. Atq; interdum natura quoq; adiunat: si ex angustiore sede uitium transit in latiore. Itaq; rubore, et tumore in præcordijs orto, scire licet fauces liberari.

Quicquid

Quicquid autem eas lenabit, incipiendum est ab humidis, maximeq; aqua mulsæ decocta: deinde assumendi molles, et nō acres cibi sunt: do nec fauces ad pristinū habitum reuertantur. Vulgo audio si quis pulum hirundinis ederit: angina toto anno non periclitari. seruatumq; cum ex sale cum is morbus urget: comburi, carbonemq; eius contritū in aquam mulsam: quæ potui datur: infricari, & prodesse. Id cum ido neos authores ex populo habeat: neq; habere quicquam periculi possit, quanuis in monumentis medicorum non legerim: tamen inferendum huic operi meo credidi.

### De difficultate spirandi.

St etiā circa fauces malum, quod apud græcos aliud, atq; aliud nomen habet: prout se intendit. Omne in difficultate spirandi cōsistit. Sed hæc dum modica est, neq; ex toto strangulat: *δυσπνοια* appellatur. Cum uehementior est, ut spirare æger sine sono, et anelatione non possit, *ἀσπνοια*. Cū accessit id quoq; ne nisi recta cervice spiritus trahatur, *ὀρθόπνοια*. Ex quibus id, quod primum est, potest diutius trahi. Duo in se quæntia acuta esse consuerunt. His communia sunt, quod propter angustias, per quas spiritus euadit: sibilum elidit: dolor in pectore, præcordijsq; est: interdum etiam scapulis: isq; modo decidit: modo reuertitur. ad hæc tussicula accedit. Auxilium est, nisi aliquid prohibet: in sanguinis detractio. Neq; id satis est: sed lacte quoq; ueter soluedus est. Liquanda aluus: interdum etiā duenda. quibus extenuatum corpus incipit spiritum trahere commodius. Caput autem ē in lecto sublime habendum est: thorax fomentis, cataplasmatissq; calidis, aut siccis, aut etiam humidis adinuandus est: et postea uel malagma super imponendū: uel certe ceratum ex cyprino, uel irino unguento. Sumenda deinde ieiuno potui mulsæ aqua: cum qua uel hyssopus cocta, uel contrita capparis radix sit. Datur ē utiliter aut nitrum, aut nasturciū, frictum alliu, deinde contritū, & cum melle mixtum: simulq; coquatur mel, galbanū, resina terebinthina: & ubi coierunt ex his quod fabæ magnitudinē habet, cottidie sub lingua liquatur. aut sulphuris ignem nō experti, pondo et quadrans abrotani pondo in uini cyatho teruntur: idq; tepescitum sorbetur. Est ē non uana opinio uulpinū iecur, ubi sicum et aridum factum est: contundi oportere: polentamq; ex eo potioni aspergi: uel eiusdem pulmonē quādam recentissimum assum, sed sine ferro coctum, edendū esse. Præter hæc sorbitionibus, & lenibus cibis utendū est. interdum uirgo tenui austero: nonnunquā uomitu. Prosunt ē quæcunq;

## LIBER

urinam augent. sed nihil magis quam ambulatio lenta pene usq; ad lassitudinem, frictio multa præcipue inferiorum partium uel in sole, uel ad ignem, & per se ipsum, & per alios usq; ad sudorem. In interiore uero faucium parte interdum exulceratio esse consuevit. In hac pleriq; extrinsecus cataplasmatibus calidis, fomentisq; humidis utuntur. Volunt etiam uaporem calidum ore recipi: per quæ molliores alij partes eas fieri dicunt: oportunioresq; uitio iam hærenti. Sed si bene sic uitari morbus potest: tanta illa præsidia. si metus eius est, superuacua sunt. Utq; autem perfricere fauces periculosum est. exulcerat enim. neq; utilia sunt quæ urinæ mouendæ sunt apta: quia possunt, dum transeunt, ibi quoq; pituitam extenuare: quam suppressi melius est. Asclepiades multarum rerum, quas ipsi quoq; secuti sumus: author bonus, acetum ait quàm acerrimum esse sorbendum. Hoc enim sine ulla noxa comprimit ulcera sed id suppressere sanguinem potest: ulcera ipsa sanare non potest. Melius huic rei licet: quod idem quoq; æque probat, uel porri, uel marrubij succus, uel nucis græcæ cum trachanto contritæ, & cum passo mixtæ, uel lini semen contritum, & cum dulci uino mixtum. exercitatio quoq; ambulandi, currendiq; necessaria est. Frictio à pectore uehemens toti inferiori parti adhibenda. Cibi uero esse debent neq; nimium acres, neq; asperi: mel, lenticula, tragum, lac, pituita, pinguis quoq; caro, præcipueq; porrum, et quicquid cum hoc mixtum est. Potionis quam minimum esse conuenit. A qua dari potest, uel pura, uel in qua malum cydoneum, palmulæ uel decoctæ sunt. Gargarizationes quoq; lenes. sin hæ parum proficiunt, reprimentes utiles sunt. Hoc genus neq; acutum est: & potest esse non longum. curationem tamen maturam, ne uehementer, & diu ledat: desiderat.

### De tussi.

Vssis uero ferè propter faucium exulcerationem molestæ est: quæ multis modis contrahitur. Itaq; illis restitutis ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoq; male habere: & uix cum uetus facta est, eliditur. ac modo arida est: modo pituitam citat. Oportet hyssopum altero quoq; die bibere. spiritum retento currere: sed minime in puluere, ac lectione uti uehementi. quæ primo impeditur à tussi, post eam uinat. tum ambulare: deinde per manus quoq; exerceri: & pectus diu perfricere. Post hæc quàm pinguius si fici uncias tres supra prunas incoctas esse. Præter hæc si humida est, præ sunt frictiones ualidæ cum quibusdam tale facientibus sic, ut caput quoq; si uel uehementer perfricetur. Item ca-



arbitula pectori admotæ. sinapi ex parte exteriori faucibus impositum: donec leuiter exulceret. potio ex menta, nucibusq; græcis, & amylo: primoq; assumptus panis aridus: deinde aliquis cibus lenis. At si sita tussis est, cum ea uehementissime urget: adiuuat uini austeri cyathus assumptus: dum ne amplius id interposito tempore aliquo, quàm ter, aut quater fiat. Item laseris quàm optimi paulum deuorare opus est: porri, uel marrubij succum assumere: scyllâ delingere: acetum ex ea uel certe acre sorbere: aut cum spica alij contriti duos uini cyathos. Vtilis etiam in omni tussi est peregrinatio, nauigatio longa, loca maritima, natationes. Cibus interdum mollis, ut malua, ut urtica: interdum acer, ut lac cum allio coctum. sorbitiones quibus laser sit adiectum: aut in quibus porrum incoctum tabuerit: ouum sorbile sulphure adiecto: potui primum aqua calida, deinde inuicem alijs diebus hæc, alijs uinum. Magis terreri potest aliquis cum sanguinē expuit. sed id modo minus, modo plus periculi habet. Exit enim modo ex ginguis, modo ex ore. & quidem ex hoc interdum etiam copiose, sed sine tussi, sine ulcere sine ginguarum ullo uitio: ita ut nihil excreetur. Verum ut ex naribus, sic ex ore aliquando prorumpit. Atq; interdum sanguis profluit: interdum simile aquæ quiddam, in qua caro recens lota est. Nonnunquam autem is à summis faucibus fertur: modo exulcerata ea pte, modo nõ exulcerata: sed aut ore uenæ alicuius ad apertum, aut tuberculis quibusdam natis ex his sanguine erumpente. quod ubi incidit, neq; lædit potio aut cibus: neq; quicquam aut ex ulcere excreatur. aliquando gutture, & arterijs exulceratis, frequens tussis sanguinem quoq; extundit. Interdum etiam fieri solet, ut aut ex pulmone, aut ex pectore, aut ex latere, aut ex iocinere feratur. Sæpe faminae quibus sanguis per menstrua non respondet: hunc expuunt: authoresq; medici fuerunt, uel exesa parte aliqua sanguinem exire: uel rupta, uel ore alicuius uenæ patefacto. Primā διαβρωσις, secundam ἰσχυρὸς ἁρρογ, tertiam ἀρασμὸς appellat. ultima minime nocet. prima grauissima. Ac sæpe quidem euenit, uti sanguinem pus sequatur. interdum autem qui sanguinem ipsum suppressit, satis ad ualitudinē profuit. Sed si secuta ulcera sunt: si pus, si tussis est, pro ut sedes ipsa est: ita uaria, et periculosa genera morborum sunt. Si uero sanguis tantum fluit: expeditius, & remedium, & finis est. Neq; ignorari oportet eis, quibus fluere sanguis solet, aut quibus spina dolet, coxæ uel, aut post cursum uehementem, uel ambulationem: dum febris absit: nõ esse inutile sanguinis mediocre profluium. idq; per urinam redditum ipsam quoq; lassitudinem soluere. Ac ne in eo quidem terribile esse, qui ex superiore loco decedit. si tamen in eius urina nihil nouabit. Neq;

uomitum huius asferre periculum etiā cum repetit, si ante confir-  
 re & implere corpus licuit: & ex toto nullū nocere: qui in corpore  
 robusto neq; nimius est: neq; tussim, aut calorem mouet. Hæc pertinen-  
 ad uniuersum. Nunc ad ea loca, quæ proposui, ueniam. Si ex ginguis  
 exit, portulacām manducasse satis est. si ex ore, continuasse eo merum  
 uinum. si parum id proficit, acetum. si inter hæc quoq; grauitè erum-  
 pit, quia consumere hominem potest: commodissimum est: impetum eius  
 admota occipitio cucurbitula sic, ut cutis quoq; incidatur: auertere. Si  
 id mulieri cui menstrua non feruntur, euenit: eandem cucurbitulam  
 in asis inguinibus eius ad mouere. At si ex fauibus, interioribus ue-  
 partibus processit, & metus maior est: et cura maior adhibenda. san-  
 guis mittendus est: & si nihilominus ex ore processit, iterum, tertioq;  
 & cotidie paulum aliquid: protinus autem debet sorbere uel acetum,  
 uel etiam cum thure plantaginis, aut porri sucum. imponendaq; ex-  
 trinsecus supra id quod dolet, lana succida ex aceto est: & id spongia  
 subinde refrigerandum. Erasistratus horum crura quoq; et femora,  
 brachiaq; pluribus locis deligabat. Id Asclepiades adeo nō prodesse,  
 ut etiam inimicum esset: proposuit. Sed id sæpe commode respondere  
 experimenta testantur. Neq; tamen pluribus locis deligari necesse est.  
 sed sat est infra inguina, & super talos, summosq; humeros, etiam  
 brachia. Tum si febris urget, danda est sorbitio et potui aqua: in qua  
 aliquid ex his, quæ aluum astringunt: decoctum sit. at si abest febris,  
 uel elota alicui, uel panis ex aqua frigida, & mole quoq; ouum dari  
 potest potui: uel idem quod supra scriptum est: uel uinum dulcè, uel  
 aqua frigida: sed sic bibendum erit, ut sciamus huic morbo sitim pro-  
 desse. præter hæc necessaria sunt quies, securitas, silentium. Caput hu-  
 ius quoq; cubātis sublime esse debet: recteq; tondetur. Facies sæpe aqua  
 frigida fouenda est. At inimici sunt uinum, balneum, uenus. in cibo  
 oleum, acris omnia. item calida fomenta. conclaue calidum, & inclu-  
 sum. multa uestimenta corpori iniecta. etiam fricationes ubi bene etiā  
 sanguis conquieuit. Tum uero incipiendum est à brachijs, cruribusq;  
 à thorace abstinendum. In hoc casu per hyemem locis maritimis, per  
 æstatem mediterraneis opus est.

De stomachi morbis, & curationibus. Caput. V.

f Aucibus subest stomachus: in quo plura longa uitia inci-  
 dere consueverunt. Nam modo ingens calor, modo inflatio  
 hunc, modo inflammatio, modo exulceratio afficit. Inter-  
 dum pituita, interdum bilis oritur. frequentissimumq;  
 est eius

est eius malum quo resoluitur: neq; ulla re magis aut afficitur: aut corpus afficit. Vt diuersa autem uitia eius, sic etiā remedia sunt. Vbi exæstuat, aceto cum rosa extrinsecus subinde fouendus est: imponendusq; puluis cum oleo, & ea cataplasmata, quæ simul & reprimunt: & molliunt. Potui, nisi quid obstat: gelida aqua præstanda. Si inflatio est, profunt admotæ cucurbitulæ: neq; incidere cutem necesse est. profunt siat, & calida fomenta, sed non uehementissima. Interponenda absinentia est. Vtilis in ieiuno potio est absinthij, aut hyssopi, aut rutæ. Exercitatio primo lenis, deinde maior adhibenda est: maximèq; quæ superiores partes moueat. quod genus in omnibus stomachi uitij aptissimum est. Post exercitationem opus est unctione, frictione: balneo quoq; nonnunquam, sed rarius: interdum alui ductione. Cibis deinde calidis, neq; inflatibus. eodemq; modo calidis potionibus: primo aquæ: post ubi resedit inflatio: uini austeri. Illud quoq; in omnibus stomachi uitij præcipiendum est, ut quo modo se quisq; æger refecerit: eo ut sanus utatur. Nam redit huic imbecillitas sua: nisi hisdem defendatur bona ualetudo, qbus reddita est. At si inflatio aliqua est: quæ ferè tumor, & dolor sequitur: prima sunt quies, & abstinentia. Iana sulphurata circumdata: in ieiuno absinthium. si ardor stomachum urget, aceto cum rosa subinde fouendus est: deinde cibis quidem utendū est modicis. Imponenda uero extrinsecus quæ simul & reprimunt: et molliunt. deinde his detractis utendum calidis ex farina cataplasmatibus: quæ reliquas digerant. Interdum aluius ducenda. Adhibenda exercitatio, & cibus plenior. At si exulceratio stomachum infestat, eadem ferè facienda sunt, quæ in faucibus exulceratis præcepta sunt. Exercitatio, frictio inferiorum partium adhibenda. Adhibendi leues, & glutinosi cibi, sed citra sacietatem. Omnia acrida, atq; acida remouenda. Vino, si febris nō est, dulci: aut si id inflat, certe leni utendum, sed neq; præfrigido, neq; nimis calido. Si uero pituita stomachus impletur: necessarius modo in ieiunio, modo post cibum uomitus est. Vtilis exercitatio, gestatio, nauigatio, frictio. Nihil edendum, bibendumq; nisi calidum: uitatis tantum his, quæ pituitam contrahere consuerunt. Molestus est: si stomachus bile uitiosus est. Solent autem hi qui sic tentantur: interpositis quibusdam diebus hanc, & quidem quod pessimum est, atram mouere. His recte aluius ducitur. potiones absinthio dantur. necessaria gestatio nauigatio est, si fieri potest ex nausea uomitus. uitanda cruditas. sumendi cibi faciles, & stomacho non alieni. uini austerum. Vulgatissimum uero, pessimumq; stomachi uitium est resolutio: id est cum cū non tenax est: soletq; desinere ali corpus: ac sic tabe consumi. Huic generi inutilissimum balneum est. Lectiones exercita-

*causa u  
uitus*



ionesq; superioris partis necessariae. Itē unctiones, frictionesq; his perfundi frigida, atq; in eadem nature: analibus eiusdem subicere etiam stomachū ipsum, et magis etiam à scapulis, id quod contra stomachū est. Consistere in frigidis, medijs capitisq; fontibus quales cutiliarū, symbrinarumq; sunt: salutare est. Cibi quoq; assumendi sunt frigidi: qui potius difficulter coquuntur: quàm facile uariantur. Ergo pleriq; qui nihil aliud concoquere possunt: bubulam coquunt. Ex quo colligi potest, neq; auem, neq; uenationem, neq; piscem dari debere: nisi generis durioris. Potui quidem aptissimum est uinum frigidum, uel certe bene calidum meracum: potissimum rheticum, uel allobrogicum: aliud uero, quod et austerum, et resina conditum est. si id non est: quàm asperum, maximūq; signinum. Si cibus non continetur, danda aqua: et eliciendus plenior uomitus est: iterumq; dandus cibus, et tum ad mouendam duobus intra stomachum digitis cucurbitula: ibiq; duabus, aut tribus horis continendae sunt. Si simul et uomitus, et dolor est, imponenda supra stomachum est lana succida, uel sponsa ex aceto, uel cataplasma, quod refrigeret. Perfricanda uero non diu, sed uoluntate brachia, et crura: et calefacienda. Si plus doloris est, infra praecordia quatuor digitis cucurbitula utendum est: protinus dandus panis ex posca frigida. Si non continuit: post uomitum lene aliquid ex his, quae non aliena stomacho sint. Si ne id quidem tenuit: singuli cyathi uini, singulis interpositis horis, donec stomachus consistat. Valens etiam medicamentum est radicle succus, ualencius acidi punici mali compari modo succi, qui ex dulci punice malo est: adiecto etiam intubi succo, et menta: sed huius minima parte: quibus tantundem quantum in his omnibus est aquae frigidae, quàm optime miscetur. Id enim plus quàm uinum ad comprimendum stomachum potest. Supprimendus autem uomitus est, qui per se uenit sic, si nausea est. Sed si coacuit intus, cibus aut computruit: quorum utrumlibet ructus ostendit: eiciendus est: protinusq; cibis assumptis hisdem, quos proxime posui: stomachus restituendus. Vbi sublatus est praesens metus, ad ea redeundum est: quae supra praecipta sunt.

## De laterum doloribus. Caput. VI.

Stomachus lateribus cingitur: atq; in his quoq; uoluntates dolores esse consueverunt. et initium uel ex frigore, uel ex ictu, uel ex nimio cursu, uel ex morbo est. sed interdum ne malum intra dolorem est. usq; modo tarde, modo celeriter soluitur. interdum ad perniciem quoq; procedit. oriturq; acu-

tus morbus, qui *πνευμονίς* à græcis nominatur. Huic dolori lateris  
 febris, & tussis accedit. & per hanc excreatur: si tolerabilis morbus  
 est: pithia si grauis sanguis. Interdum etiam siccata tussis est: quæ nihil  
 emollitur: idq; primo uitio grauius: secundo tolerabilius est. Remediũ  
 uero est magni, & recentis doloris sanguis missus. At siue lenior, siue  
 uetustior casus est: uel supernacuum, uel serum id auxilium est. con=  
 fugendũq; ad cucurbitulas est, ante summa cute inasa. Recte et sinapi  
 ex aceto super pectus imponitur: donec ulcera, pustulasq; excitet:  
 & tum medicamentum, quod humorem illuc citet. Præter hæc circun=  
 dare primum oportet latus absolantæ sulphuratæ. deinde cum pau=  
 lum inflammatio se remisit: siccis, & calidis fomentis uti. Ab his trã=  
 situs ad malagmata est. Si uetustior dolor remanet: nouissime resina  
 imposita discutitur. Utendum cibis, potionibusq; calidis. uitandum fri=  
 gus. Inter hæc tamen non alienum & extremas partes oleo, & sul=  
 phure perfricare. Si leuata tussis est: leni lectione uti. iamq; & acres  
 cibos, & uinum meracius assumere. quæ à medicis præcipiuntur: ut  
 tamen sine his rusticos nostros epota ex aqua herba trixago satis ad=  
 iuuat. Hæc in omni lateris dolore communia sunt. plus negocij est, si  
 acutus quoq; morbus is factus est. In hoc præter ea quæ supra posita  
 sunt, hæc animaduertenda sunt, ut cibus sit quàm maxime tenuis, &  
 lenis, præcipueq; sorbitio: eaq; ex ptisana potissimum, aut ius in quo  
 porrus cum pullo gallinaceo coctus sit. Idq; non nisi tertio quoq; die  
 detur: si tamen per uires licebit. potui uero aqua mulsa in qua hyssopum,  
 aut ruta decocta sit. quæ quibus temporibus danda sint: ex ra=  
 tione uel adiectæ, uel leuata febris apparebit sic, ut in remissione  
 quàm maxima dent: cum eo tamen, ut sciamus non esse eius generis  
 tussi aridas fauces committendas. sæpe enim ubi nihil est quod excrea=  
 tur: continuatur, & strangulat. Ob quam causam dixi etiam peius  
 id genus esse tussis: quod nihil, quàm quod pituitam moueret. Sed hic  
 uinum sorbere, ut supra præcepimus: morbus ipse non patitur. inui=  
 cem eius cremor ptisanæ sumendus est. Ut his autem in ipso morbi fer=  
 uore sustinendus æger est: sic ubi paulum is se remisit: alimenta plenio=  
 ra, & uini quoq; aliquid dari potest. dum nihil detur, quod aut refri=  
 geret corpus, aut fauces asperet. Si in refectioe quoq; manserit tussis,  
 intermittere oportebit uno die: posteroq; cum cibo uini paulo plus assu=  
 mere. atq; inapiente quoq; tussi tum non erit alienum, ut supra quoq;  
 positum est: uini cyathos sorbere. sed in hoc genere ualitudinis dul=  
 ce, uel certe lene commodius est. Si malum inueterauit, athletico uictus  
 corpus firmandum est.

De uiscerum morbis: Et primo de pulmone, deinde de iocinere, tum de liene, postremo de renibus. Caput. VII.

Compagne uero corporis ad uiscera transeundū est: Et  
 a in primis ad pulmonem ueniendum: ex quo uehemens  
 Et acutus morbus oritur, quem περιπνευμονιὸν græci  
 uocant. eius hæc conditio est. Pulmo totus afficitur. hunc  
 eius casum subsequitur tussis: bilem, uel pus trahens: præcordiorū, to-  
 tiusq; pectoris grauitas: spiritus difficultas, magnæ febres, continua ui-  
 gilia, cibi fastidium, tabes. Id genus morbi plus periculi, quàm doloris  
 habet. Oportet si satis ualidæ uires sunt, sanguinem mittere: si mino-  
 res, cucurbitulas sine ferro præcordijs admonere. Tum si satis ualeat,  
 gestando ægrum digerere: si parum, intra domum tamen dimouere.  
 Potionem autem hyssopi dare, cui ficus arida sit incōcta: aut aquam  
 mulsam, in qua uel hyssopum, uel ruta decocta sit. Frictione uti diu-  
 tissime in scapulis: proxime ab his in brachijs, Et pedibus, Et cruri-  
 bus, leuiter contra pulmonem. idq; his cotidie facere. Quod ad cibum  
 uero pertinet: huic nec salsis opus est, neq; acribus, neq; amaris, neq;  
 alium astringentibus: sed paulo lenioribus. Ergo primis diebus dan-  
 da est sorbitio ptisanæ, uel alicæ, uel orizæ: cum qua recens adeps co-  
 cta sit. Cū hac sorbibile ouum, nuclei pinei ex melle. panis, uel elota ali-  
 cæ ex aqua mulsæ. potui deinde non solum pura aqua, sed etiam mul-  
 sa egelida, aut si æstus est, etiam frigida: nisi quid obstat. hæc autem  
 altero quoq; die increscente morbo dare satis est. Vbi incremento  
 constitit quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est: præter-  
 quam aqua egelida. Si uires desunt, adiuuandæ sunt aqua mulsæ.  
 profumq; aduersus dolores impostæ calida fomenta, uel ea quæ si-  
 mul Et reprimunt, Et emolliunt. Prodest impostus super pectus sal  
 bene contritus, cum cerato mixtus, quia leuiter autem erodit: eoq; im-  
 petum materiæ, quo pulmo uexatur: euocat. Vtile etiam aliquod ma-  
 lagma est ex his, quæ materiam trahunt. Neq; alienum est dum pre-  
 mit morbus, clausis fenestris ægrum continere. Vbi paulum leuatus  
 est, ter, aut quater die fenestris aliquanto apertis paruum ærem re-  
 cipere. Deinde in refectioe pluribus diebus à uino alstinere. gestatio-  
 ne, frictione uti. sorbitionibus, Et prioribus cibis adijcere ex oleribus  
 porrum, ex carne ungulas, Et summa trunculorum, atq; pisciculos  
 sic, ut diu nihil molle, Et lene sumatur.



## De iocineris morbo, &amp; curatione. Caput. VIII.

Lterius quoq; uisceris morbus idest iocineris æque modo  
 a longus, modo acutus esse consuevit: ἡ παρὰ τὸν γράει uocāt.  
 Dextra parte sub præcordijs uehemens dolor est. idemq;  
 ad latus dextrum, & ad ingulum, humerumq; partis  
 eiusdem peruenit. nonnunq; manus quoq; dextra torquetur. horror  
 calidus est. Vbi male est, bilis euomitur. interdū singultus propē stran-  
 gulat. & hæc quidem acuti morbi sunt. Lōgioris uero ubi suppuratio  
 in iocinere est: dolorq; modo finitur: modo intenditur: dextra parte  
 præcordia dura sunt: & tument. post cibum maior difficultas est. acce-  
 dit maxillarum quedam resolutio. ubi inueterauit malum, uenter et  
 crura, pedesq; intumescunt: pectus, atq; humeri, arctaq; ingulū utrumq;  
 extenuatur. Initio sanguinem mittere optimum est. tum uenter soluen-  
 dus est: si non potest aliter, per nigrum ueratrū imponenda extrin-  
 secus cataplasmata, primum quæ reprimant: deinde calida, quæ de-  
 ducant. qbus recte iris, uel absinthium adiicitur: post hæc malagma.  
 Dandæ uero sorbitiones sunt: omnesq; cibi, & calidi, & qui non mul-  
 tum alant: & ferē qui pulmonis quoq; dolori conueniunt: præterq;  
 eos, qui urinam mouent: potionesq; ad id efficaces. Vtilia in hoc mor-  
 bo sunt thynum, satyria, hyssopum, nepeta, amyllum, sisamum, lauri  
 bacca, pini flos, herba sanguinalis, menta, ex malo cotoneo medium, co-  
 lumbæ iecur recens, & crudum. Ex quibus quedam per se esse, quæ-  
 dam adijcere uel sorbitioni, uel potioni licet: sic tamen ut parce assu-  
 mantur. Neq; alienum est absinthium contritum ex melle, et pipere:  
 eiusq; catapotium cotidie deuorare. abstinendum utiq; est ab omni-  
 bus frigidis: neq; enim res ulla magis iecur lædit. Frictionibus uten-  
 dum in extremis partibus. uitandus omnis labor: omnis uehementior  
 motus. ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pon-  
 dus, ictus, cursus inimici sunt. Perfusio corporis multa prodest ex  
 aqua: si hyems est, calida: si æstas, tepida. Item liberalis unctio: & in  
 balneo sudor. Si uero iecur uomica laborat, eadem faciendæ sunt, quæ  
 in cæteris interioribus suppurationibus. Quidam etiam contra id  
 scalpello aperiunt: ipsam uomicam adurunt.

## De lienis morbo, &amp; curatione. Caput. IX.

T lienis ubi affectus est, intumescit: simulq; cum eo pars si-  
 a nistra, eaq; dura est: & prementi renititur: uenter intentus  
 est: aliquis etiam cruribus tumor est. Vlcera aut omnino nō

sanesunt: aut certe cicatricem vix recipiunt. In intentā ambulatione, cursuq; dolor, & quaedam difficultas est. hoc vitium quies auget. Itaq; exercitatione, & labore opus est: habita tamen ratione ne febre mixta si nimium procefferit, excitetur. Vnctiones, frictionesq; & sudores necessarij sunt. Dulcia omnia inimica sunt: item lac, & casus. Acida autem maxime conueniunt. Ergo acetum acre per se sorbere, & magis etiam quod scylla conditum est: expedit. Edenda sunt salsamenta, uel olea ex muria dura: tincta in aceto lactuca, intubiq; & betae ex eodem. ex sinapi asparagus, armoracia, pastinaca, ungula, rostra, aues macrae, eiusdem generis uenatio. Potui uero ieiuno dari debet absinthium incoctum. at post cibum aqua à ferrario fabro: in qua candens ferrum subinde tinctum sit. Hæc enim uel præcipue lienem cohercet: quod auimaduersum est in his animalibus: quæ apud hos fabros educata, exiguos lienes habent. potest etiam dari uinum tenue, austerrum: omniaq; in abis, & potionibus, quæ urinae mouenda sunt: præcipueq; ad id ualet uel trifolij semem, uel cuminum, uel apium, uel serpillum, uel atisus, uel portulaca, uel nepeta, uel thymum, uel hyssopum, uel satureia. hæc enim inde commodissime uidentur humorem deducere. Lienis quoq; bubulus utiliter esui datur: præcipueq; erica, & nasturcium lienem extenuant. Imponenda quoq; extrinsecus sunt quæ leuent. Fit ex unguento, & palmulis, quod *μυρεσάλανος* græci uocant. Fit ex lini, & nasturcij semine, quo uinum, & oleum adiicitur. fit ex cupresso uiride, & arida ficu. fit ex sinapi, cui seui hirquini à renibus quarta pars ponderis adiicitur: teriturq; in sale, & protinus imponitur. Multisq; modis huic rei capparì aptum est. Nam & ipsum cum abo assumere, & muriam eius cum aceto sorbere, commodum est. Quin et extrinsecus radicem contritam, uel corticem eius cum furfuribus, aut ipsum capparì cum melle contritum imponere expedit. Malagnata quoq; huic rei aptantur.

De renum morbis, & curationibus. Caput. X.

**T**renes ubi affecti sunt: diu male habent. Peius est si freuens biliosus uomitus accedit. Oportet conuiescere: cibare molliter: soluere aluum. si aliter non respondet, etiam ducere. Sæpe desiderare in aqua calida: neq; aluum, neq; potionem frigidam assumere. alstinere ab omnibus salsis, acerbis, acidis pomis: bibere liberaliter: adijcere modo abo, modo potioni piper, porrum, ferulā, album papauer: quæ maxime inde urinam mouere consueverunt. Auxilio quoq; his exulceratis sunt, si adhuc ulcera purganda

sunt: cum numeris semina detractis corticibus sex aginta, nuclei ex pinis siluestri duodecim, anesi quod tribus digitis sumi possit: croci paulū, cōtrita et in duas mulsi potiones diuisa. si uero dolor tantū lenādus est: eiusdē cū numeris semina triginta, ydē nuclei niganti, nuces græcæ quiq; croci paululū, contrita, et cū lacte potui data. At sup quoq; recte quædā malagmata iniiciuntur: maximeq; ea quæ humori extrahendo sunt.

De intestinorum morbis, & primo de cholera. Caput. XI.

Visceribus ad intestina ueniēdum est: quæ sunt et acutis,  
 a & longis morbis obnoxia. Primo æque facienda mentio  
 est cholerae: quia cōe id stomachi, atq; intestinorum uitiiū  
 uideri potest. Nam simul & deiectio, & uomitus est: præ  
 terq; hæc inflatio est: intestina torquentur: bilis supra, infraq; erum-  
 pit: primum aquæ similis: deinde ut in ea recens caro lota esse uideatur:  
 interdum alba: nonnunquam nigra, uel uaria. Ergo eo nomine  
 morbi hunc χολερα græci nominarunt. præter ea uero, quæ supra  
 cōprehensa sunt: sæpe et crura, manusq; contrahuntur: urget sitis:  
 anima deficiat. quibus concurrentibus non mirū est, si subito quis mo-  
 ritur. neq; tamen ulli morbo minori momento succurritur. Protinus  
 ergo ubi ista cœperunt: aquæ tepidæ quā plurimum bibere oportet:  
 et uomere. Vix unquam sine uomitu sequitur. sed et si non incidit:  
 miscuisse tamē nouam materiā corruptæ prodest: parsq; sanitatis est  
 uomitum esse suppressum. si id incidit: protinus ab omni potione absti-  
 nendum est. si uero tormina sunt: oportet frigidis, & humidis fomen-  
 tis stomachum fouere: uel si uenter dolet: hisdem egelidis sic, ut uenter  
 ipse mediocriter calentibus innuetur. Quod si uehementer et uomitus,  
 & deiectio, et sitis uexant: & adhuc subcruda sunt, quæ uomuntur:  
 nondū uino maturum tempus est. Aqua, neq; ea ipsa frigida, sed potius  
 egelida danda est. admonendūq; naribus est puleiū ex aceto: uel po-  
 lenta uino aspersa: uel menta secundū naturam est. At cū dissoluta cru-  
 ditas est: tum magis uerendū est, ne anima deficiat. Ergo tum confugie-  
 dum est ad uinū. id esse oportet tenue, odoratū, cū aqua frigida mix-  
 tum: uel polenta adiecta, uel melle quoq; assumere expedit: quotiensq;  
 aliquid aut stomachus, aut uenter effudit: totiens p hæc uires restitue-  
 re. Erasistratus primo tribus uini guttis, aut quinis aspergendam potio-  
 nem esse dixit: deinde paulatim merū adiiciendū. Is si et ab initio ui-  
 nū dedit: et metū cruditatis secutus est: non sine causa fecit. Si uehemen-  
 tē infirmitatē adiunari posse tribus guttis putauit: errauit. At si in a-  
 nis est homo: et crura eius cōtrahuntur: interponēda potio absintij est.



Si extremæ partes corporis frigent, unguendæ sunt calido oleo: cui ceræ paulum sit adiectum: calidusq; fomentum nutriendæ. Si ne sub his qui dem quies facta est, extrinsecus contra uentriculum ipsum cucurbitula admouenda est: aut sinapi super imponendum. Vbi is constitit, dormire oportet. postero die utiq; à potione abstinerere. die tertio in balneum ire. paulatim se cibo reficere: somno: quisque facile acquiescit. itemq; lassitudine, & frigore. Si post suppressam choleram febricula manet, aluum duci necessarium est. tum cibus, uinoq; utendum est. sed hic quidem morbus & acutus est: & inter intestina, stomachumq; uersatur sic, ut cuius potissimum partis sit: non facile dici possit.

De cœliaci uentriculi morbo. Caput. XII.

Nipissus uero uentriculi portæ consistit is, qui & longus  
 i esse consuevit: non ianòs à græcis nominatur. Sub hoc uenter indurecit: dolorq; eius est. Aluus nihil reddit: ac ne spiritum quidem transmittit. extremæ partes frigescent. difficulter spiritus redditur. Commodissimum est inter initia calida cataplasmata toto uentri imponere, ut dolorem leniant. post cibum uomere: atq; ita uentrem exinanire. Proximis deinde diebus cucurbitulas sine ferro uentri, et coxis admoovere. Ventrem ipsum liquare dato lacte, & uino salso, frigido. Si tempus anni patitur, etiam uiridibus ficis: sic tamen ne quis aut cibus, aut humor uniuersus detur: sed paulatim. Ergo per interualla temporis sat est cyathos binos, ternos uel sumere: et cibum pro portione huius. commodèq; facit cyathos lactis, cyathus aquæ mixtus, et sic datus. Cibiq; instantes, & acres utiliores sunt: adeo ut lacti quoq; recte contritum allium adiciatur. Procedente uero tempore opus est gestari: maximèq; nauigare: perficari ter, aut quater die sic, ut nitrum oleo misceatur: perfundi aqua calida post cibum: deinde sinapi imponere per omnia membra excepto capite, donec arrodatur: & rubeat: maximèq; si corpus durum, & uirile est. paulatim deinde faciendus est transitus ad ea, quæ uentrem comprimunt. Assa caro danda, ualens, & quæ non facile corrumpatur. potui uero pluuialis aqua deacta: sed quæ per binos, ternos uel cyathos bibatur. Si uetus uitium est, oportet laser quàm optimum ad piperis magnitudinem deuorare. altero quoq; die uinum, uel aquam bibere: interdum interposito cibo singulos uini cyathos sorbere: ex inferiori parte infundere pluuialem gelidam aquam: maximèq; si dolor in uicinis partibus remanet.

De tenuioris

## De tenuioris intestini morbo. Caput. XIII.

i Nter ipsa uero intestina consistunt duo morbi: quoru alter in tenuiore, alter in pleniore intestino est. Prior acutus est. insequens esse longus potest. Diocles Carystius tenuioris intestini morbum  $\chi\omicron\rho\sigma\alpha\tau\omicron\nu$ , plenioris  $\epsilon\lambda\epsilon\omicron\nu$  nominauit.

A plerisq; uideo nunc illu priorem  $\epsilon\lambda\epsilon\omicron\nu$ , huc  $\kappa\alpha\lambda\iota\kappa\omicron\nu$  nominari. Sed prior modo supra umbilicum, modo sub umbilico dolorem mouet. Fit ex alterutro loco inflammatiō: nec aluus, nec spiritus infra trāsmittitur. si superior pars affecta est, cibus: si inferior sterco per os redditur. si utrunlibet uetus est, adiungitur periculo uomitus bilis: sus mali odoris, aut uariis, aut niger. Remedium est sanguinem mittere: uel cucurbitulas pluribus locis admoenere, non ubiq; cute incisa. Id enim duobus, aut tribus locis satis est. Ex ceteris spiritum euocare abunde est. Tum animaduertere oportet, quo loco malum sit. solet enim contra id timere. Et si supra umbilicum est, alui ductio utilis non est. Si infra est: aluum ducere, ut Erasistrato placuit: optimum est. Et sepe id auxiliū satis est. Ducitur autem percolato ptisane cremore cum oleo, et melle sic, ut præter ea nihil adiungatur. Si nihil timet, duas manus imponere oportet supra summum uentrem: paulatimq; deducere. Inuenietur enim mali locus, qui necesse est, renitatur: Et ex eodem deliberrari poterit ducenda nec ne aluus sit. Illa communia sunt, calida cataplasmata admoenere: eaq; imponere à mammis usq; ad inguina et spinam: ac sepe mutare: brachia, cruraq; perfricare: demittere totum hominem in calido oleo. Si dolor nō quiescit, etiam in aluum ex parte inferiore tres, aut quattuor cyathos calidi olei dare. Vbi per hæc consecuti sumus ut iam ex inferiore parte spiritus transmittatur: offerre potui mulsum tepidum non multum. nam ante magna cura uitandum est, ne quid bibat. si id commodè cessit: adicere sorbitionem. Vbi dolor, et febricula quierunt: tum demum uti cibo pleniore: sed neq; instante, neq; duro, neq; ualido: ne intestina adhuc imbecilla ledantur. potui uero nihil præterquam puram aquam. nam siue quid uiolentum, siue acidu est: id huic morbo alienum est. Ac postea quoq; uitare oportet balneum, ambulationem, gestationem, ceterosq; corporis motus. Nam facile id malum redire consuevit: Et siue cum frigus subit: siue aliqua iactatio, nisi bene iam confirmatis intestinis, reuertitur.

Aurelij Cor.

h

brachia  
crura per  
fricare

*S* autem morbus, qui in intestino plenior est: in ea maxi  
 i me parte est: quam certum esse proposui. Vehemens infla-  
 tio, uehementes dolores dextra magis parte, intestinum  
 quod uerti uidetur, propè spiritum elidit. In plerisq; post  
 frigora, cruditatesq; oritur: deinde quiescit: & per ætatem sæpe repe-  
 tens sic cruciat, ut uitæ spacio nihil demat. Vbi is dolor cœpit, admo-  
 uere sicut, & calida fomenta oportet: sed primo lenta, deinde uali-  
 diora: simulq; frictiones. ad extremas partes id est crura, brachiaq;  
 materiam reuocare. Si discussum non est: qua dolet cucurbitulas sine  
 ferro defigere. Est etiam medicamentum eius rei causa comparatum,  
 quod κωλινδὸν nominatur. id se repperisse Cassius gloriabatur. Ma-  
 gis prodest potui datum. sed impositum quoq; extrinsecus digerendo  
 spiritum, dolorē leuat. nisi finito uero tormento, recte neq; abus, neq; po-  
 tio assumitur. Quo victu sit utendum qui hoc genere tentantur: iam  
 mihi dictum est. Confectio medicamenti, quod κωλινδὸν nominatur: ex  
 his constat. Costi, anesi, castorei singulorū Pondo denariorū triū. petro-  
 selini. P. denariorum. III. piperis longi, et rotundi singulorū. P. \*. II.  
 papaueris lachrymæ, iunci rotundi, myrræ, nardi singulorū. P. VI.  
 quæ melle excipiuntur. id autem & deuorari potest: & ex aqua ca-  
 lida sumi.

## De torminibus, id est dysenteria. Caput. XV.

*P*roxima his inter intestinorū mala, tormina esse consue-  
 uerunt: δυσεντερία græce uocatur. intus intestina exul-  
 cerantur. ex his cruor manat. Isq; modo cum stercore  
 aliquo semper liquido, modo cum quibusdā quasi muc-  
 cosis excernitur. interdum simul quædam cætnosa descendunt. Fre-  
 quens deiiciendi cupiditas, dolorq; in ano est. Cum eodem dolore exi-  
 guum aliquid emittitur. atq; eo quoq; tormentum intenditur. idq; post  
 tempus aliquod leuatur. exiguaq; requies est. somnus interpellatur. fe-  
 bricula oritur. longoq; tempore id malū cum inueterauerit, aut tollit  
 hominem: aut etiam si finitur, excruciat. Oportet in primis conque-  
 scere. si quidem omnis agitatio exulcerat. deinde ieiunū sorbere uini  
 cyathum: cui contrita radix quinq; folij sit adiecta. imponere cata-  
 plasmata super uentrem, quæ reprimunt. quod in superioribus uen-  
 tris morbis non expedit. quotiensq; desedit, subluere aqua calida: in  
 qua decoctæ uerbenæ sint. portulacam uel coctam, uel ex dura muria  
 edisse. cibos, potionesq; eas, quæ astringūt alui. Si uetustior morbus est,



ex inferioribus pitibus tepidū infundere uel ptisanæ cremorē, uel lac, uel adipem liquatam, uel medullā cernuinā, uel oleum, uel cum rosa butyrum, uel cum eadē album crudum ex ouis, uel aquam: in qua lini semen decoctum sit: uel si somnus non accedit, uitellos cum aqua, in qua rosæ floris folia cocta sint. Leniant enim dolorē hæc, & mitiora ulcera efficiunt: maximeq; utilia sunt, si cibi quoq; secutiū fastidiū est. Themijon miria dura quā asperrima sic utendū memorie prodidit. Cibi uero esse debent, qui leniter uentrem destringant: & ea quæ urinam mouent. si ea consecuta sunt, in aliā partem humorē auertendo prosunt. si non sunt cōsecuta, noxam augent. itaq; nisi in quibus prompte id facere consuerunt, non sunt adhibenda. Potui, si febricula est: aqua pura calida, uel ea, quæ ipsa quoq; astringat: dari debet. si non est: uinum lene austerū. Si pluribus diebus nihil remedia alia inuerunt, uetusq; iam uitium est: aquæ bene frigida potio assumpta ulcera astringit: & initium secundæ uoletudinis facit. Sed ubi uenter suppressus est, protinus ad calidam potionem reuertendum est. Solet autem interdum etiam putris sanies, pessimiq; odoris descendere. solet purus sanguis profluere. si superius uitium est, alius aqua mulsæ duci debet: tunc deinde eadem infundi, quæ supra cōprehensa sunt. Valensq; est etiam aduersus ulcera intestinorum minij gleba, cum salis hemina contrita. si minus, mixta his aqua in aluum datur. Ac si sanguis profluit, cibi, potionesq; esse debent, quæ astringant.

## De lenitate intestinorum. Caput. XVI.

X torminibus interdum intestinorū lenitas oritur: quæ continere nihil possunt: & quicquid assumptum est, imperfectū protinus reddunt. id interdum ægros trahit: interdum præcipitat. In hoc utiq; adhibere oportet comprimentia: quo facilius tenendi aliquid intestinis uis sit. Ergo et super pectus ponetur sinapi: exulcerataq; cute malagma, quod humorē euocet: & ex uerbis decoctis aqua desinat: & cibos, potionesq; assumat, quæ aluum astringunt: & frigidis utetur persusionibus. Oportet tamen prospicere ne simul his omnibus admotis, uitium contrariū per immoediatas inflationes oriat. Iaculatim ergo firmari intestina debebunt, aliquibus cotidie adiectis. Et cum in omni fluore uentris, tum in hoc præcipue necessarium est: non quoties libet desiderare, sed quotiens necesse est: ut hæc ipsa mora in consuetudinem ferendi oneris intestina deducat. Alterum quoq; quod æque ad omnes similes affectus ptinet, in hoc maxime seruandū est, ut cum pleraq; utilia insuauia sint, qualis est plantago, et rubi,

Aurelij Cor.

h ij

et quicquid mali corio mixtum est: ea potissimum ex his dentur, quæ maxime æger uolet. Deinde si omnia ista fastidiet ad excitandam cibi cupiditatem, interponatur aliquid minus utile: sed magis gratum. Exercitationes, frictiones huic quoq; morbo necessariæ sunt: & cum his sol, ignis, balneum, uomitus ut Hippocrati uisum est: etiam albo ueratro, si cætera parum proficient: euocatus.

De lumbricis aluum occupantibus. Caput. XVII.

Omniunquam autem lumbrici quoq; occupant aluum: hiq;  
 n modo ex inferioribus partibus: modo foedius ore red-  
 duntur. Atq; interdum latos eos, qui peiores sunt, inter=  
 dum teretes uidemus. si lati sunt, aqua potui dari debet:  
 in qua lupinum, aut cortex mori decoctus sit: aut cui adiectum sit cõ-  
 tritum uel hyssopum, uel piperis acetabulũ, uel scamoneæ paulũ. uel  
 etiam pridie cum multum allium ediderit: uomat. Posteroq; die mali  
 punia tenues radículas colligat, quantum manu comprehendet: easq;  
 contusas, in aquæ tribus sextarijs decoquat, donec tertia pars super-  
 sit. Huc adijciat nitri paulum, & ieiunus bibat. Interpositis deinde  
 tribus horis, duas potiones sumat: aut aquæ, uel muriæ duræ sic adie-  
 ctæ. tum desidet subiecta calida aqua in pelue. si uero teretes sunt, qui  
 pueros maxime exercent: & eadem dari possunt, & quædam lenio-  
 ra, ut contritum semen urticæ, aut brassicæ, aut cumini cum aqua, uel  
 menta cum eadem, uel absinthium decoctum, uel hyssopum ex aqua  
 mulsæ, uel nasturcij semen cum aceto contritum. Edisse etiam & lupi-  
 num, & allium prodest: uel in aluum oleum subter dedisse.

De tenasmo intestinorum morbo. Caput. XVIII.

St autem aliud lenius omnibus proximis, de quibus su-  
 e pradiatum est: quod τεῖρεσμον græci uocant. id neq; acu-  
 tis, neq; longis morbis annumerari debet: cum & facile  
 tollatur: neq; unq; per se inolet. in hoc æque, atq; in tor-  
 minibus frequens, desidendi cupiditas est: æque dolor ubi aliquid ex-  
 cernitur. descendunt autem pituitæ, mucusq; similia: interdum etiam  
 leniter subcruenta. sed his interponuntur nonnunquam ex cibo quoq;  
 recte coacta. desiderere oportet in aqua calida. sæpiusq; ipsum manu  
 nutrire: cui plura medicamenta idonea sunt, butyrum cum rosa, aga-  
 cia ex aceto liquata, emplastrũ id, quod τεροφαρμακον græci uocant:  
 rosa liquatum, alumen lana circumdatum, & ita appositum: eademq;  
 ex inferiore

ex inferiore parte indita, quæ torminum auxilia sunt, eadem uerbenæ decoctæ, ut inferiores partes foueantur: alternis uero diebus aqua, alternis leue, & austerum uinum bibendum est. Potio esse debet egelida, & frigida. proprior ratio uictus talis, qualem in tormina supra præcepimus.

De uentris fluxu, & curatione. Caput. XIX.

Euor etiam dum recens deiectio est, ubi & liquida aluus, I & sæpius, quàm ex consuetudine fertur. atq; interdum tolerabilis dolor est: interdū grauissimus: idq; peius est. sed uno die fluere aluum sæpe pro ualitudine est, atq; etiam pluribus: dum febris absit, & intra septimum diem id conquiescat. purgatur enim corpus: & quod intus læsurum erat, uuliter effunditur. uerum spatium periculosum est. Interdum enim tormina, ac febriculas exacerbat: uiresq; consumit. primo die quiescere satis est: neq; impetum uentris prohibere: si per se desit, balneo uti: paulum cibi capere. si mansit, abstinere non solum à cibo, sed etiam à potione. Postero die, si nihilominus liquida aluus est, æque conquiescere: paulum astringentis cibi sumere: tertio die in balneum ire: uehementer omnia præter uentrem perfricare: ad ignem lumbos, scapulasq; admouere: cibi uti, sed uentrem contrahentibus: uino non multum meraco. Si postero quoq; die fluet, plus edisse: sed uomere etiam ex toto, donec conquiescat. Cōtra sitim, fame, uomitu niti. uix enim fieri potest ut post hanc animaduersionē aluus nō contrahatur. Alia uia est, ubi uelut suppressere: cænare: deinde uomere: postero die in lecto conquiescere. uespere ungi sed leniter. deinde panis circā sēlibrā ex uino amineo mero sumere. tum asū aliquid, maximeq; auem, & postea uinum idē bibere aqua pluuiali mixtum: idq; usq; quintum diē facere: iterumq; uomere. Frigidam autem assidue potionē esse debere contra priores auctores Asclepiades affirmauit, & quidem q̄ frigidissimam. Ego experimentis quenq; in se credere debere existimo calida potius, an frigida utatur. Interdum autem euenit, ut id pluribus diebus neglectū, curari difficilius possit. à uomitu oportet incipere: deinde postero die uespere tepido oleo ungi. cibū modicum assumere: uinum meracum quàm asperrimum: impositā super uentrem habere cum cærato rutam. In hoc aut affectu corporis neq; ambulatione, neq; frictione opus est. uehiculo sedisse, uel magis ēt equo prodest. neq; enim ulla res magis intestina cōfirmat. Si uero etiam medicamentis utendum est: aptissimum est id quod ex pomis fit. Vindemiæ tēpore in grande uas conijcenda sunt pira, atq;



*mala siluestria. si ea non sunt, pira tarentina uiridia, uel signina, ma-*  
*la satndiana uel amerina, myrapia: hisq; adijcēda sunt cotonea, &*  
*cum ipsis corticibus suis puniat, sorba: & quibus magis utimur etiā*  
*torminalia sic, ut hæc tertiam ollæ partem teneant. tum deinde ea*  
*musto implenda est: coquendumq; id donec omnia quæ indita sunt, li-*  
*quata in unitatem quādam coeant. Id gustui non insuauē est: & quā-*  
*docunq; opus est, assumptum leuiter sine ulla stomachi noxa uentrē*  
*tenet. duo, aut tria cochlearia uno die sumpsisse satis est. Alterum ua-*  
*lentius genus est, myrti bacas legere: ex his uinū exprimere: id deco-*  
*quere ut decima pars remaneat: eiusq; cyathū sorbere. tertium quod*  
*quādoq; fieri potest, malum punicum excauare: exemptisq; omnibus*  
*feminibus, membranas quæ inter ea fuerunt iterum coniungere. tū in-*  
*fundere cruda oua, rudiculāq; miscere: deinde malum ipsum super*  
*prunam imponere. quod dum humor intus est, non adurit. Vbi sic-*  
*cum esse coepit, remouere oportet: extractumq; cochleari, quod intus*  
*est, edisse. aliquibus adiectis maius momentum habet. Itaq; etiam in*  
*piperatum coniicitur: misceturq; cum sale, & pipere. est quid ex his*  
*edendum. est pulicula etiam, cum qua paulum est fauo uetere co-*  
*ctum sit, & lenticula cū malicorio cocta, rubiq; cacumina in aqua*  
*decocta, & ex oleo, atq; aceto assumpta, efficacia sunt. atq; ea aqua,*  
*in qua uel palmulæ, uel malum cotoneum, uel arida sorba, uel rubi*  
*decocti sunt, potata. quod genus significo, quotiens potionē dandam*  
*esse dico: quæ astringat. Tritici quoq; hemina in uino amineo austero*  
*decoquitur: idq; triticū ieiuno, ac sitienti datur. superq; id, uinū id sor-*  
*betur. quod iure ualentissimis medicamentis anumerari potest. atq; etiā*  
*potū datur uinū signinum, uel resinatum austerū, uel quodlibet au-*  
*sterum. Cōtunditurq; cum corticibus, feminibusq; suis punicū malum,*  
*uinōq; tali miscetur. idq; uel merum sorbet aliquis, uel bibit mixtum.*  
*sed medicamentis uti nisi in uehementibus malis superuacuum est.*

De uulnæ morbo, & curationibus. Caput. XX.

*X uulna quoq; foeminis uehemens malum nascitur: proxi-*  
*e meq; ab stomacho uel afficitur hæc: uel corpus afficit. Inter-*  
*dum etiam sic exanimat: ut tanquam comitali morbo pro-*  
*sternat. Distat tamen hic casus, eo quod neq; oculi uertuntur: nec spu-*  
*mæ proflunt: nec nerui distenduntur. sopor tantū est. idq; quibusdā*  
*foeminis crebro reuertens perpetuū est. ubi inadit, si satis uirium est:*  
*sanguis missus adiunat. si parum est, cucurbitulæ tamen defigendæ*  
*sunt in inguinibus. Si diutius aut iacet, aut alioqui iacere consueuit:*  
*admoovere oportet naribus extinctum ex lucerna linamentum, uel*

aliud ex his, quæ fœdioris esse odoris retuli: quod mulierem excitet. Idemq; aquæ frigida perfusio efficit. adiunatq; ruta contrita cū melle, uel ex cyprino ceratum, uel quodlibet callidum, & humidum cataplasma naturalibus pubetenus impositum. Inter hæc et perfricare coxas, & poplites oportet. deinde ubi ad se redit, circūcidendum uirū est in totum annum: et si casus idē non reuertitur. Frictione quotidie utendū totius quidem corporis: præcipue uero uentris, & poplitum. cibis ex media materia dandus. sinapi super immum uentrem tertio quoq; aut quarto die imponendum, donec corpus rubeat. Si durities manet, mollire cōmode uidetur solanum in lac demissum: deinde cōtritum, & cera alba, atq; medulla ceruina cum irino, aut seuum tau rinum, uel caprinum cum rosa mixtum. dandum potui etiam uel castoreum est, uel gut, uel anetum. Si parum pura est, purgatur iunco quadrato. si uero uulua exulcerata est, ceratum ex rosa fiet: & recēs suilla adeps, & ex ouis albū misceatur, idq; apponatur: uel album ex ouo cum rosa mixtum, adiecto: quo facilius consistat, contrita rosæ puluere. dolens uero ea sulphure suffumigari debet. At si purgatio nimia mulieri nocet, remedio sunt cucurbitulae cute incisa inguinibus uel etiam sub mammis admotæ. si maligna purgatio est, subiicienda sunt,

\*

coeuntia. Id faciunt etiā

albae oliuæ, & nigrum papauer cum melle assumptū, & gummi cū trito semine apij liquatum, & cum cyatho passi datum. Præter hæc in omnibus uesicæ doloribus idoneæ potiones sunt, quæ ex odoribus fiunt: idest spica nardi, croco, annamomo, castia, similibusq;. Idemq; et decocta lentiscus præstat. si tamen intolerabilis dolor est, & sanguis profluit, etiā sanguinis detractio apta est: aut certe coxis admotæ cucurbitulae cute incisa. At cum urina super potionum modū etiam sine dolore profluēs, maciem, & periculum facit, si tenuis est, opus est exercitatione, & frictione, maximèq; in sole, uel ad ignem. Balneum rarum esse debet: neq; longa in eo mora citius comprimens. Virum austerrum meracum, per æstatem frigidum, per hyemem egelidum, sed tantum quantum minimum sit. Infirma, aluius quoq; uel diuanda, uel late purganda est. Si crassa urina est, uehementior esse debet & exercitatio, & frictio: longior in balneo mora: citius opus est teneri: uirum idē. In utroq; morbo uitanda oīa sunt, quæ urinam mouere consueuerūt.

De nimia profusione seminis ex naturalibus. Caput. XXI

St etiā circa naturalia uitū, nimia profusio seminis. quod si ne uenere, sine nocturnis imaginibus sic fertur, ut interposito spatio tabe hominē consumat. In hoc affectu salutare sunt

uehemētes frictiones, perfusiones, natationesq; quā frigidissimæ. neq; cibi, nec potio nisi frigida assumpta. Vitare autem oportet cruditates: omnia instantia. nihil ex his assumere, quæ contrahere semen uidentur: qualia sunt, siligo, simila, oua, alia, amyllum, omnis caro glutinosa, piper, eruca, bulbi, nuclei pinei. Neq; alienum est fouere inferiores partes, aqua decocta ex uerbenis comprimentibus. ex hisdem aliqua cataplasmata imo uentri, inguinibusq; circumdare: præcipueq; ex aceto rutam vitare: & ne supinus obdormiat.

## De coxarum morbis, &amp; curationibus. Caput. XXII.

Vperest ut ad extremas partes corporis ueniam: quæ articulus inter se conferuntur. initium à coxis faciam. Harū ingens dolor esse consuevit. isq; hominem sæpe debilitat: & quosdā non dimittit. Eoq; id genus difficillime curatur: quod ferè post longos morbos uis pestifera huc se inclinât. quæ ut illas partes liberat: sic hanc ipsam quoq; affectam præhendit. Fouendum primum aqua calida est: deinde utendum calidis cataplasmatibus. Maxime prodesse uidetur aut cum hordeacea farina, aut cum ficu ex aqua decocta mixtus capparum cortex concisus, uel lolij farina ex uino diluto cocta, & mixta cum acida fecē: quæq; refrigescunt, imponere noctu malagmata commodius est. Inula quoq; radix confusa, & ex uino austero postea cocta, & late super coxam imposita, inter ualentissima auxilia est: si ista non soluerunt, sale calido, & humido utendum est. Si ne sic quidem finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute admo- uendæ sunt cucurbitulæ: mouenda urina. Alius si compressa est, du- cenda. Vltimum est, & in ueteribus quoq; morbis efficacissimum, tri- bus, aut quatuor locis super coxam cutem candentibus, feramentis ex- ulcerare. Sed frictione quoq; utendum est, maxime in sole, & eodem die sæpius: quo facilius ea quæ cœuendo nocuerunt, dirigantur. Ea- q; si nulla exulceratio est, etiā ipsis coxis, sicut & cæteris partibus adhi- benda est. Cum uero sæpe aliquid exulcerandum candenti ferramē- to sit, ut materia inutilis euocetur: illud perpetuum est, non ut primū fieri potest, huius generis ulcera sanare: sed ea trahere, donec id uiti- um, cui per hæc opitulantur, conquiescat.

## De genuum doloribus, &amp; cura. Caput. XXIII.

Oxis proxima genua sunt: in quibus ipsis nonnunquā do-  
lor esse consuevit. In hisdem autem cataplasmatibus, cucurbitu-  
lisq; præsidium est: sicut etiam cum in humeris, alij ne cō-



missurijs dolor aliquis exortus est. Equitare ei, cui genua dolent: inimicissimum omnium est. Omnes autem eiusmodi dolores ibi inueterauerunt: uix citra uestionem finiuntur.

De articulorum doloribus in manibus, pedibusq; Cap. XXIIII.

i N manibus, pedibusq; articulorum uitia frequentiora, longioraq; sunt. quæ in podagris, chiragris'ue esse consueverunt.

Ea raro uel castrator, uel pueros ante fœminæ coitum, uel mulieres, nisi quibus menstrua suppressa sunt: tentant. ubi sentiri coeperunt, sanguis mittendus est. Id enim inter initia statim factū sepe annum: nonnunquam perpetuam ualeitudinem totā præstat. Quidā etiā cum asinino lotio epoto se eluissent: in perpetuum hoc malum euaserunt. Quidam cum toto anno à uino, mulso, uenere, sibi temperassent: securitatem totius uitæ consecuti sunt. Idq; utiq; post primum dolorem seruandū est: etiā si quieuit. Quod si iam consuetudo eius facta est: potest quidem aliquis esse securior his temporibus: quibus dolor se remisit. Maiorem uero curam adhibere debent hi, quibus id reuertitur. quod ferè uere, autumno'ue fieri solet. Cum uero dolor urget, manu gestari debet: deinde ferri. in ambulatione leui se dimouere. Et si podagra est, interpositis temporibus exiguis, inuicem modo sedere: modo ingredi. tum antequam cibum capiat, sine balneo loco calido leuiter perfricari: sudare: perfundi aqua egelida: deinde cibum sumere ex media materia, interpositis rebus urinā mouentibus: quotiensq; plenior est, euomere. Vbi dolor uehemens urget: interest sine tumore is sit: an tumor cum calore, an tumor iam etiā obcaluerit. Nam si tumor nullus est: calidis fomentis opus est. A quam marinam, uel muriam duram feruefacere oportet: deinde in peluem conijcere: Et cum iam homo pati potest, pedes demittere: superq; palam dare: Et uestimento tegere: paulatim deinde iuxta labrum ipsum ex eadē aqua leuiter infundere, ne calor intus destituat: ac deinde noctu cataplasmata calefacientia imponere, maximeq; ibisci radicem ex uino coctam. Sin uero tumor, calorq; est, utiliora sunt refrigeratia: recteq; in aqua quāmfrigidissima articuli continentur. sed neq; quotidie, neq; diu fit: ne nerui lædantur. imponendum uero est cataplasma, quod refrigeret. Neq; tamen in hoc cotidie permanendum: sed ad ea transendum quæ sic reprimunt, ut emolliant. Si maior est dolor, papaueris cortices in uino coquendi: miscendiq; cum cerato sunt: quod ex rosa factum sit. Vel ceræ, Et adipis suillæ tantundem unā liquandum, deinde his uinum miscendum: atq; ubi quod ex eo impositum est, in ca-

luit, detrahendū, & subinde imponendum aliud est. Si uero tumores etiam obcaluerunt, & dolent, leuat spongia: quæ imposita subinde ex oleo, uel aceto, uel aqua frigida exprimitur: aut pari portione inter se mixta, pix, cera, alumen. sunt etiā plura idonea manibus, pedibusq; malagmata. Quod si nihil superimponi patitur, id quod sine tumore est, fouere oportet spongia: quæ in aquam calidam demittatur: in qua, uel papaueris corticis, uel cucumeris siluestris radix decocta sit. tum inducere articulis crocū cum succo papaueris, & ouillo lacte. at si tumor est, foueri qdē debet aqua egelida: in qua lentiscus, aliaue uerbena ex reprimentibus decocta sit. induci uero medicamentum ex nucibus amaris, cum aceto tritis: aut ex cerusa, cui contritæ herbæ muralis succus sit adiectus. Lapis etiam, qui carnem exedit: quē *σάπυς* *παρών* græci uocant: excusus sic ut pedes capiat: demissos eos, cum dolēt, retentosq; ibi leuare consuevit. ex quo in Asia lapidi asio gratia est. Vbi dolor, & inflammatio se remiserunt, quod intra dies quadraginta fit: nisi uitium hominis accessit: modicis exercitationibus, abstinentia, unctionibus lenibus utendum est sic, ut etiam acopo, uel liquido cerato cyprino articuli perfricentur. Equitare podagrias quoq; alienum est. Quibus uero articulorum dolor certis temporibus reuertitur: hos ante, & curioso uictu cauere oportet, ne inutilis materia corpori supersit: & crebriore uomitu, & si quis ex corpore metus est, uel alui ductione uti: uel lacte purgari. quod Erasistratus in podagrias expulit: ne in inferiores partes factus cursus pedes repletet: cum euident sit omni purgatione, non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exinaniri. Ex quocunq; autem morbo quis inualescit, si tarde confirmatur: uigilare prima luce debet. nihilminus in lecto conuiescere. circa tertiam horam leuiter unctis manibus corpus permulcere. deinde delectationis causa quantum inuat, ambulare arcuata omni negotiosa cogitatione, uel actione. tum gestari diu. multa frictione uti. loca, cælum, cibos sæpe mutare. Vbi triduo, quatuor uel uinum bibit: uno, aut etiam altero die interponere aquam. per hæc enim fiet, ne in uitia tabē inferenti incidat: & ut mature uires suas recipiat. Cum ex toto uero conualuerit, periculose uitæ genus subito mutabit: & inordinate aget. Paulatim ergo debet, commissis his legibus eò transire: ut arbitrio suo uiuat.

Ixi de his malis corporis, quibus victus ratio maxime subuenit. Nunc trāseundum est ad eā medicinae partem: quæ magis medicamentis pugnāt. His multum antiqui auctores tribuerunt: *d* & Erasistratus, & hi, qui se ἐμπειροὺς nominauerunt: præcipue tamen Erophilus, deductiq; ab illo uiri adeo, ut nullum morbi genus sine his curarent. Multaq; etiam de facultatibus medicamentorum moriæ prodiderunt. qualia sunt, uel Zenonis, uel Andriæ, uel Apollonij, qui Mys cognominatus est. Horum autem usum ex magna parte Asclepiades non sine causa sustulit: & cum omni ferè medicamentis stomachū lædant, maliq; succi sint: ad ipsius victus rationem potius omnem curam suam transtulit. Verū ut illud in plerisq; morbis utilius est, sic multa admodum corporibus nostris inadere consuerunt: quæ sine medicamentis ad sanitatem peruenire non possunt. Illud ante omnia scire conuenit, quod omnes medicinae partes ita innexæ sunt, ut ex toto separari non possint: sed ab eo nomen trahant, à quo plurimū petunt. Ergo ut illa, quæ victu curat, aliquando medicamentum adhibet: & illa, quæ præcipue medicamentis pugnāt, adhibere etiam rationem victus: debet: quæ multum admodum in omnibus malis corporis proficit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant: ac sepe simplicia opitulentur, sepe mixta: non alienum uidetur ante proponere & nomina, & uires, & mixturas eorum: quo minor ipsius curationis ex sequentibus mora sit.

De simplicibus facultatibus quarūcūq; rerum, ex quibus medicamēta fiunt: & primo de his, quæ sanguinem supprimunt. Caput. I.

Anguinem supprimunt atramentum sutorium, quod græci *σχαροῦν* appellant: chalcitis, acacia, & ex aqua liaum, thus, aloe, gummi, plumbum combustum, porrum, herba sanguinalis, creta uel amolia, uel figularis, misy, frigida aqua, uinū, acetum, alumen, melinum, squama & ferri, & æris. atq; huius quoq; duæ species sunt, alia tantum æris, alia rubri æris.

Quæ uulnus glutinant. Caput. II.

Glutinant uulnus, myrra, thus, gummi, præcipueq; a canthi-  
nū, psyllēū, tragacantha, cardamomum, bulbi, lini semen, nasturcium, onī album, gluten, ichthyocolla, uitis alba, contusæ



testis suis cochleæ, mel coctum, spongia, uel ex aqua frigida, uel ex uino, uel ex aceto expressa. ex hisdem lana succida, si leuis plaga est: etiam araneū reprimunt, alumen & scissile, quod οχιδὸν uocatur: & liquidum, melinū, auripigmentum, ærugo, chalcitis, atramentū sutoriū.

Quæ concoquunt, & mouent pus. Caput. III.

Dio. m. sp. et 70. c

Concoquunt, & mouent pus, nardum, myrrha, costus, balsamum, galbanum, propolis, styrax, thuris, & fuligo, & cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, seuum, adeps, oleum.

Quæ aperiunt uulnera. Caput. IIII.

Uulnera aperiunt tanquam ora in corporibus, quod σόμα græce dicitur: cynamomum, balsamum, panacis, iuncus quadratus, puleium, flos albæ uiolæ, bdella, galbanum, resina terebinthina, & pinea, propolis, oleum uetus, piper, pyretrum, chamæpytis, uua aminia, sulphur, alumen, rutæ semen.

Quæ purgant. Caput. V.

Urgant, erugo, auripigmentum, quod ἀρσενικὸν à græcis nominatur. Huic autem & sandaracæ in omnia eadē uis: sed ualidior est squama æris, pumex, iris, balsamū, styrax, thus, thuris cortex, resina, & pinea, & terebinthina liquida, ænæthe, lacerti sterco, sanguis columbæ, & palumbi, & hirundinis, ammoniacum, bdellium, quod in omnia idem quod ammoniacū potest: sed ualentius est abrotanum, ficus arida, coccum gindium, scobis eboris, omphaciū, radícula, coagulum, sed maxime leporinū: cui eadem quæ cæteris coagulis facultas, sed ubiq; ualidior est: fel, uitellus crudus, cornu ceruinū, gluten taurinum, mel crudum, misyos, chalcitis, crocum, uua aminia, abrotanum, spuma argenti, galla, squama æris, lapis hæmatites, minium, costum, sulphur, pix cruda, seuum, adeps, oleum, ruta, porrum, lenticula, eruū.

Quæ rodunt. Caput. VI.

Odunt alumen liquidum, sed magis rotundum: ærugo, chalcitis, mysi, squama æris, sed magis rubri, æs combustum, sandaraca, minium synopicum, galla, balsamum, myrra, thuris cortex, galbanū, resina terebinthina humida, piper. utrunq; sed rotundum magis, cardamenum, auripigmentum, calx, nitrum, & spuma eius, apij semen, narassi radix, omphacium, alcyonium, oleum ex amaris nucibus, allium, mel crudum, uinum, lentiscus, squama ferri, fel taurinum, scamonea, uua aminia, cynamomum, styrax, cicutæ semen, resina, narassi semen, fel, nuce amaræ, oleumq; earum, atramentum sutorium, chrysocola, ueratrum, cinis.

Quæ exedunt corpus. Caput. VII.

Xedunt corpus atciæ suavis, hebenus, ærugo, squama æris,  
 e chryso colla, cinis cyprius, nitrum, cadmia, spuma argenti, hy-  
 pocistis, diphryges, sal, auripigmentum, sulphur, cicuta, san-  
 daraca, salamandra, alcyonium, æris flos, chalcitis, atramentum suto-  
 rium, ochra, calx, acetum, galla, alumen, lac caprifici, uel lactucæ ma-  
 rine, quæ τὸς μύλλος à græcis nominatur: alcyonium, fel, turturis fu-  
 ligo, spodium, lenticula, mel, oleæ folia, marrubium, lapis hæmatites  
 & phrygius, & asiaticus, & scissilis, mysi, uinum, acetum.

Quæ adurunt. Caput. VIII.

a Durunt auripigmentum, atramentum sutorium, chalcitis, mysi,  
 ærugo, calx, caria combusta, sal, squama æris, fex combusta,  
 myrra, sterco & lacerti, & columbæ, & palumbi, & hirundinis, pi-  
 per, coctum gnidium, allium, diphryges, lac utrunq; quod proximo at-  
 pite supra comprehensum est: uer atrum & album, & nigrum, can-  
 tharides, cor allium, piperitru, thus, salamandra, eruct, sandaraca, uina  
 amnia, chryso colla, ochra, alumen scissile, ouillum sterco, oenanthe.

Quæ crustas ulceribus inducunt. Caput. IX.

Adem ferè crustas ulceribus tanquã igne adustis inducunt:  
 e sed præcipue chalcitis utiq; si cocta est: flos æris, ærugo, au-  
 ripigmentum, mysi, & id quo magis coctum.

Quæ crustas ulceribus resolvunt. Caput. X.

c Rustas uero has resolvit, farina triticea cum ruta, uel porro, aut  
 lenticula, cui mellis aliquid adiectum est.

Quæ discutiât ea, quæ in aliqua pte corporis coierunt. Caput. XI.

D discutienda uero ea, quæ in corporis parte aliqua coierunt:

a maxime possunt abrotanum, helenium, amaracus, alba ui-  
 la, mel, liliū, sampsucus, cyprius, lac, sertula campana, ser-  
 pillum, cupressus, cedrus, iris, uiola purpurea, narcissus, rosa, crocum,  
 passum, iuncus quadratus, nardum, cinamonum, cassia, ammoniacum,  
 cera, resina, uina amnia, spuma argenti, styrax, ficus arida, tragori-  
 ganus, lini, & narcissi semen, bitumen, sordes ex gymnasio, pyrites la-  
 pis aut molaris: crudus uitellus, amaræ nuxes, sulphur.

Quæ euocant, & educunt. Caput. XII.

Vocat, et educit ladanum, alumē rotundū, hebenus, lini semē,  
 e omphacum, fel, chalcitis, bdeliū, resina terebinthina, & pi-  
 nea, propolis, ficus arida decocta, sterco columbæ, pumex,  
 farina lolij, grossi in aqua cocti, elaterium, lauri baccæ, nitrum, sal.

Quæ exasperata leuent. Caput. XIII.

l Enat id quod exasperatum est, spodium, hebenus, gummi, oui album, lac, tragacanthum.

Quæ carnem nutriunt, & ulcus implent. Cap. XIII.

c Arnem alit, & ulcus implet resina pinea, ochra actia, uel asferica, cera, butyrum.

Quæ molliunt. Caput. XV.

m Olliunt as combustum, terra crethria, nitrum, papaueris lacryma, ammoniacum, bdellium, cera, seuum, adeps, oleum, ficus arida, sesamum, fertula campana, narcissi & radix, & semen, rosæ folia, coagulum, utellus crudus, amaræ nucis, medulla omnis, stibi, pix, chocelea acta, citrea semen, plumbi recrementum, σκοπίων, μοσχίδιον, græci uocant: panacis, cardamomum, galbanum, resina, uua amara, styrax, iris, balsamum, sordes ex gymnasio, sulphur, butyrum, ruta.

Quæ cutem purgant. Caput. XVI.

i Tem cutē purgat mel: sed magis si est cum galla, uel eruo, uel lenticula, uel marrubio, uel iride, uel ruta, uel nitro, uel ærugine.

De mixturis simplicium rerum, & de ratione ponderum, & quid malagma, et emplastrum, et pastillus inter se differant. Caput. XVII.

e Xpositis simplicibus facultatibus dicendum est quemadmodum misceantur, quæ ex his fiant. Miscentur autem uarie: neque huius ullus modus est, cum ex simplicibus alia demantur: alia adiçantur: iisdemque seruatis, ponderum ratio mutetur. Ita cum facultatum materia non ita multiplex sit: innumerabilia mixturarum genera sunt: quæ comprehendere si possent, tamen esset superuacuum. Nam et iisdem affectus intra paucas compositiones sunt: & mutare eas cuilibet cognitis facultatibus facile est: itaque contentus his ero quas accepi uelut nobilissimas. In hoc autem uolumine eas explicabo: quæ uel desiderari in prioribus potuerunt: uel ad eas curationes pertinent: quæ protinus hic comprehendam sic: ut tamē quæ magis cōia sunt, simul iungam. Si qua singulis, uel ē paruis accommodata sunt, in ipsorum locum differam. Sed & antea sciri uolo, in uncia pondus denariorum septem esse. Vnus deinde denarii pondus diuidi à me in sex partes id est sex uncias: ut idem in uncia denarii habeam, quod græci habent in eo, quem ὀβολὸν appellant. id ad nostra pondera relatum, paulo plus dimidio scrupulo facit. Malagmata uero, atque emplastra, pastilli, quos ὀρνιθίων græci uocant: cum plurima eadem habeant: differunt eo, quod malagmata maxime ex floribus, eorumque etiam surculis, Emplastra, pastilli: magis ex quibus-



dam metallicis fiunt. deinde malagmata contusa abunde mollescunt. nam super integram cutem iniiciuntur. Laboriose uero conteruntur ea, ex quibus emplastra pastilliq; fiunt: ne lædant vulnera cum imposita sunt. Inter emplastrum autem, & pastillum hoc interest: quod emplarum utiq; liquati aliquid accipit. in pastillo tantum arida medicamenta aliquo humore iunguntur. Tum emplastrum hoc modo fit. arida medicamenta per se teruntur. deinde mixtis his instillatur aut acetum aut si quis alius non pinguis humor accessurus est. & ea rursus ex eo teruntur. Ea uero quæ liquari possunt ad ignem simul liquantur: & si quid olei misceri debet: tum infunditur. Interdum etiã aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Vbi facta sunt quæ sepe ratim fieri debuerunt: in unum omnia miscentur. At pastilli hæc ratio est. Arida medicamenta contrita humore non pingui aut uino, uel aceto coquantur, & rursus cocta inarescunt. Atq; ubi utendum est eiusdem generis humore, diluuntur. tum emplastrum imponitur. pastillis illinitur, aut alicui molliori: aut cerato miscetur.

## De malagmatis. Caput. XVIII.

Malagma aduersum calidas podagras.

Is cognitis, primũ malagmata subiiciam: quæ ferè non sunt  
 h refrigerandi, sed calefaciendi causa reperta. Est tamen quod refrigerare possit ad calidas podagras aptum. Habet gallæ & immaturæ, & alterius coriãdri seminis, ciutæ, lacrimæ aridæ, gummi, singulorum plenum acetabulum, cæratiloti, quod πεπυσμὶν ῥορ græci uocant: selibram. Reliqua ferè calefaciunt. Sed quedam diggerunt materiam: quedam extrahunt, quæ πισταστὴν uocantur. pleraq; certis magis partibus membrorum accomodata sunt.

Malagma ad materiam extrahendam.

I materia extrahenda est, ut in hydropico, in lateris dolore,  
 f in incipiente abscessu, in suppuratione quoq; mediocri, aptum est id quod habet resinæ aridæ, nitri, ammoniaci, galbani singulorum pondo, ceræ pondo. Aut in quo hæc sunt, æruginis rase, thuris, singulorum. P. \*. ammoniaci salis. P. VI. squamæ æris, ceræ, singulorum. P. VIII. resinæ aridæ. P. VII. aceti cyathus. Idem præstat cumini farina cum struthio & melle. P. II.

Malagma ad iecur dolens.

I iecur dolet: id in quo est balsami lacrimæ. P. XII. costi, cin  
 f namomi, cassiæ, corticis myrræ, croci, iunci rotundi, balsami, seminis iridis illiricæ, cardamomi, amomi, nardi, singulorũ.

P. XVI. quibus adiçatur nardinum unguentum, donec cæratı crassitudo sit & huius quidem recentis usus est. Si uero seruandum est, resina terebinthina. P. XVI. cera. P. X. ex uino leni contunduntur, tum eo miscentur.

### Malagma ad lienem.

T si lienis torquet, glādis, quam βάλανον græci uocant:   
 a cortex, & nitrum paribus portionibus contunduntur:   
 resurgunturq; aceto quā acerrimo. Vbi cæratı crassitudinem habet, lınteo antea in aqua frigida madefacto illinitur: & sic imponitur: supraq; farina hordacea inijçitur: sed manere ibi non amplius sex horis debet, ne lienem consumat. satiusq; est id bis, aut ter fieri. Communem autem & icæneri, & lieni, & abscessibus, & strumæ, parotidibus, articulis, calibus quoq; suppurantibus, aut aliter dolentibus, etiam concoctioni uentris Lysias cōposuit ex hyssopi, panacis, styracis, galbani, resinae, singulorum. P. II. ammoniaci, bdellij, cære, seuı taurini, iridis aridæ. P. IIII. cæclirios acetabulo, piperis granis quadraginta. quæ contrita irino unguento temperantur.

### Malagma ad laterum dolores.

D laterum autem dolores compositio est, Apollophanis, in   
 a qua sunt resina terebinthina, turis, fuliginis, singulorū   
 P. IIII. bdellij, ammoniaci, iridis, seuı nitulini, aut capri-   
 ni à renibus sici singulorum. P. IIII. Hæc aut eadem   
 omnem dolorem leuant: dura emolliunt: mediocriter calefaciunt. Ad   
 idem latus Andreæ quoq; malagma est: quod et resoluı: educt humo-   
 rem: pus maturat: ubi id maturum est, cutem rumpit: ad cicatricem   
 perducit. prodest impositum minutis, maioribusq; abscessibus: item ar-   
 ticulis: ideoq; & coxis: et pedibus dolentibus. item si quid in corpore   
 collisum est, reficit: præcordia quoq; dura, & inflata emollit: essa ex-   
 trahit. ad omnia deniq; ualet, quæ adiunare calor potest. id habet   
 cera. P. I. uisci, sycamini, quam aliis sycomorum uocat: lacrimæ sin-   
 gulorū. P. XI. piperis & rotundi, & longi, ammoniaci, thimiamatis,   
 bdellij, iridis illyricæ, cardamomi, amomi, xilobalsami, thuris mas-   
 si, myrræ, resinae aridæ, singulorum. P. X. pyretri, cocti gnidij, spumæ   
 nitri, salis ammoniaci, aristolochiæ creticæ, radis ex cucumre agre-   
 sti, resinae terebinthinae liquidæ singulorum. P. XX. quibus adiçatur   
 u. g. uenti

unguenti irini quantum satis est ad ea mollienda, atq; coeunda.

Malagmata ad resoluenda quæ astricta sunt: & mollienda quæ dura sunt: & digerenda quæ coeunt.

Ræcipuum uero est ad resoluenda quæ astricta sunt: molliēda quæ dura sunt: digerenda quæ coeunt: id quod ad Polyarchum authorem refertur. habet iunci quadrati, cardamomi, thuris, fuliginis, amomi, ceræ, resinæ liquidæ pares portiones.

Aliud malagma ad eadem.

Liud ad eadem Nilei crocomagmatis, quod quasi recremētū eius est. P. XIIII. ammoniac, thymiamatis, ceræ, singulorū, P. XXX. ex quibus duo priora ex aceto teruntur: ceræ cū rosa liquatur: & tum omnia iunguntur.

Malagma moschi ad molliendum.

Proprie etiam dura mollit id, quod Moschi esse dicitur. habet galbani unciam, thuris fuliginis. P. Z. ceræ, ammoniac, thymiamatis trientes, picis aridæ. P. XII. aceti heminas tres.

Malagma medi ad digerenda quæ coeunt.

Eratur etiam ad digerēda quæ coeunt sub authore Me do, quod habet ceræ. P. Z. panacis. P. semis, squamæ aeris, aluminis rotundi, item scissilis, singulorum. P. Z. plumbi combusti P. I. & semis.

Malagma Panthemi ad eadem.

De eadē Panthemus utebatur calcis. P. semis, sinapis contriti, item fœni græci, aluminis, singulorum. P. I. Seui bubuli. P. II. & semis.

Malagma ad strumas.

De strumam multa malagmata inuenio. Credo autem quod peius id malum est, minusq; facile discutitur: eo plura esse tentata, quæ in personis uarie responderunt. Andreas author est, ut hæc misceantur urticæ seminis. P. XI. pipis rotundi, bdellii, galbani, ammoniac, thymiamatis, resinæ aridæ, singulorū. P. XIIII.

Aurelij Cor.



## LIBER

resinæ liquidæ, ceræ, pyretri, piperis longi, lactucæ marinæ seminis, sulphuris ignem non experti: quod ἀπυρον vocatur, fecis aridæ, aceti, spumæ nitri, salis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radices ex cucumeri silvestri, resinæ, singulorum. P. XV. Quæ ex leni iugo contunduntur.

### Aliud malagma ad id ualens.

Xpeditius ad idem fit: quod habet uiscæ, semeni, stercoris, resinæ, sulphuris ignem non experti pares portiones. Et in quo est sulphuris. P. XI. lapidis quæ πυρίτην vocât. P. XIII. cumini acetabulum. Itē in quo est lapidis eiusdem pars una, sulphuris due partes, resinæ terebinthinæ partes tres.

### Malagma ad strumam, & phymata.

Rabis autem cuiusdam est ad strumam, & orientia tubercula, quæ φύματα vocantur: quod hæc digerit. Habet myrrhæ, salis ammoniaci, thuris, resinæ & liquidæ & aridæ, crocomagmatis, ceræ, singulorum. P. XI. lapidis eius: quem πυρίτην vocât. P. XIII. quibus quidam adijciunt sulphuris. P. II.

### Malagma ad strumam, & tubera, & carcinodas.

St etiam proficiens in struma, & in his tuberculis: quæ difficiliter concoquuntur, & in his: quæ καρινώδαι vocantur: quæ ex his cōstat. sulphuris. P. XII. nitri. P. XIII. myrræ. P. XVI. fuliginis thuris. P. semis, salis ammoniaci. P. Z. ceræ. P. I.

### Malagma protarchi ad parotidas, & fauū, & mala ulcera.

Rotarchus autem ad parotidas eaq; tubercula: quæ μιλίη= pια idest faui uel φύματα nominantur: item mala ulcera, pumicis, resinæ pineæ liquidæ, thuris fuliginis, spumæ nitri, iridis, singulorum. P. XVIII. cū ceræ. P. XVIII miscebat: hisq; olei cyathum, & dimidium adijciebat.

### Malagma aduersus panum, & phymata.

T aduersus panum tum primum orientem: quod φύετλος græci uocant, & omne tuberculum: quod φύμα nominatur, miscetur ochra: quæ attice nominatur cum dualis partibus similæ, hisq; contunditur: subinde mel insullatur: donec malagmatis crassitudo sit.

Malagma aduersus phymata.

Iscitit etiā omne tuberculum: quod  $\phi\mu\alpha$  uocatur: id quod  
 d habet calcis, nutri spumæ, piperis rotundi, singulorum. P. XI.  
 galbani. P. XII. salis. P. XIII. quæ excipiuntur cerato ex ro-  
 sa facto.

Malagma ad suppressendum omne quod abscedit.

Vpprimūtq; omne quod abscedit id: in quo est galbani, fabæ  
 fresæ, singulorum. P. XI. myrræ, thuris, ex radice capparidis  
 corticis, singulorum. P. XIII. Satisq; omnia abscedentia di-  
 gerit murex combustus, & bene contritus, aceto subinde adiecto.

Malagma ad sanguinem suppressendum, & phymata.

T si satis sanguis subit: recte inponitur quod aduersus  $\phi\mu\alpha$ -  
 mata quoq; potest. Constat ex his bdellij, styracis, ammoniaci,  
 galbani, resinæ & aridæ, & liquidæ pineæ. Item ex lenti-  
 scæ, thuris, iridis singulorum p. XII.

Malagma ad carcinodas, & phymata lenienda.

$\alpha\pi\upsilon\iota\omicron\delta\alpha\upsilon$  uero, &  $\phi\mu\alpha$  commode his leniuntur: galbani,  
 uiscæ, ammoniaci, resinæ terebinthinæ in singulis. P. XI. semi-  
 taurini. P. semis, fecis combustæ quàm maxima portione, dū  
 id sciatis non faciat: quàm esse malagma oportet.

Malagma ad liuorem faciei contusæ.

Vod si facie contusa liuor subcruentus est: hæc cōpositio no-  
 tæ & die imposita tollit. Aristolochiæ, thapsiæ, singulorū.  
 P. XII. bdellij, styracis, ammoniaci, thymiamatis, galbani, re-  
 sine aridæ, & ex lentisco liquidæ, thuris masculi, iridis illyricæ, æ-  
 ræ singulorum. P. XIII. Idem faba quæq; imposita proficit.

Malagmata stomachicæ ad aperiendum.

Vnt etiam quædam malagmata: quæ  $\sigma\omicron\mu\alpha\tau\iota\kappa\alpha$  græci uo-  
 cant: quoniam aperiendi vim habent. Quale est quod ex  
 his constat. piperis longi, spumæ nutri, singulorum. P. XII  
 erisimi. P. XIII. Quæ cum melle miscentur. Idemq; etiam strumæ  
 aperiendæ sunt eius generis. Vehementiusq; ex his est id quod habet  
 calcis. P. XIII. piperis grana sex, nutri, ceræ, singulorum. P. XX. mel-  
 lis. P. Z. olei heminam.

# LIBER

Niconis malagma ad resoluendum,  
aperiendumq; ac purgandum.

n Iconis quoq; est quod resoluit: aperit: purgat. Habet alcyo-  
nium, sulphur, nitrum, pumicem paribus portionibus: qui-  
bus tantum picis, & ceræ adiçitur, ut fiat cerati crassitudo.

Malagma ad ossa, & nervos.

a D ossa autē Aristogenis fit ex his. Sulphuris. P. XI. resinæ te-  
rebinthinæ, nitri spuma, & ex scylla partis interioris, plu-  
bi eloti singulorū. P. XII. thuris fuliginis. P. XVIII. ficus ari-  
dæ quàm pinguißimæ, seui taurini, singulorū. P. XVIII. ceræ. P. XXI.  
iridis macedonicæ. P. XVI. sesami fricti acetabulum. maximèq; ner-  
uis & articulis malagma conuenit.

Malagma Euthyclei ad articulos, & ad omnem dolorem.

i Citur Euthyclei est et ad articulos, & ad omnem dolorem,  
& ad uesticæ, & ad recenti cicatrice contractos articulos:  
quas ἀγκύλας græci nominant. quod habet fuliginis thuris  
acetabulum, resinæ tantundem, galbani sine surculis sesunciam, am-  
moniaci, bdellij, singulorū. P. XIII. ceræ. P. semis. Aliud item fit: quod  
habet iridis, ammoniaci, galbani, nitri singulorū. P. XXIII. resinæ li-  
quidæ. P. XVI. ceræ. P. XXVI.

Malagma Sasogoræ ad dolores articulorum.

a D dolores articulorum Sasogoræ, plumbi combusti, papaue-  
ris lacrymæ, corticis hyoscyami, styracis, peucedani, seui, re-  
sinæ, ceræ pares portiones.

Chrysippi malagma, ad idem ualens.

c Hrysippi, resinæ liquidæ, sandaracæ, piperis singulorum  
P. XXII. quibus ceræ paulum adiçitur.

Clesipontis malagma, ad idem ualens, & ad parotidas,  
& phymata, & strumam.

c Lesyponis ceræ creticæ, resinæ terebinthinæ, nitri quàm  
ruberrimi, singulorū. p. semis, olei cyathi tres. sed id nitrū  
ante



ante per triduum instillata aqua teritur, & cum sextario eius incoquitur: donec omnis humor consumatur. Potest uero ea compositio etiā ad parotidas, phymata, strumam, omnemq; coitum humoris emolliendum.

### Malagma ad articulos.

- a** D articulos fici quoq; aridi partem nepetæ mixtam, uel unā taminiam sine seminibus, cum puleio recte aliquis imponit.

Malagma Aristonis aduersus podagras, & recētia phymata, & omnis dolores.

- c** Adem podagræ præsidia sunt. Sed ad eam fit Aristonis quoq; quod habet nardi, cinnamomi, casiae, chamæleontis, iūci rotundi, singulorum. P. ♁VIII. seu caprini ex irino liquati. P. ♁XXX. iridis. P. ♁XI. quæ in aceto quā acerrimo iacere per viginti dies debet. Idem autem etiam recētia phymata, doloresq; omnes discutit.

### Theoni malagma ad pedum dolores.

- a** T Theonus ad pedum dolores seu à renibus partem tertiā, salis partes duas miscebat, hisq; membranulā illitam imponebat: tum super iniiciebat ammoniacū, thymiamā in aceto liquatū.

Numenij malagma ad podagram cæterosque articulos induratos.

- a** T Numenius podagram, cæterosq; articulos induratos hoc mollebat. abrotani, rosæ aridæ, papaueris lacrimæ, singulorū. P. ♁III. resinæ terebinthinæ. P. ♁III. thuris, spumæ nitri, singulorum. P. ♁VIII. iridis, aristolochiæ, singulorum. P. ♁XII. ceræ. P. ♁III. qbus adiicitur cedri cyathus unus, olei laurei cyathi tres, olei acerbis sextarius.

Dexij malagma si quando callus in articulis increuit.

- f** I quando autem in articulis callus increuit Dexius docuit imponere calcis. P. ♁III. cerussæ. P. ♁VIII. resinæ pineæ. P. ♁XXX. piperis grana. XXX. ceræ. P. Z. Quibus dum contunduntur, hemina uini lenis instillatur.

De emplastris. Caput. XVIII.

- c** X emplastris autem nulla maiorem usum præstant: quā quæ cruentis protinus uulneribus iniiciuntur, & uicini græci

uocant. Hæc enim reprimunt inflammationem nisi magna uis eam cogit, atq; illius quoq; impetum minuunt, tum glutinant uulnera: quæ id patiuntur: cicatricem hisdem inducunt. Constant autem ex medicamentis non pinguibus, ideoq; ἀλιπὲρ nominantur.

Barbarum emplastrum nigrum, quod cruentis protinus uulneribus inijcitur.

Primum ex his est quod barbarum uocatur. Habet æruginis  
 o rase. P. XXXII. spumæ argenti. P. XXX. aluminis, picis aridæ, resine pineæ aridæ, singulorum. P. XI. quibus adijciuntur olei, & aceti singule hemine.

Coacton emplastrum nigrum ad idem ualens.

Iterum ad idem: quod χιανὸν uocant: habet spumæ argenti  
 a P. XC. resine aridæ tantundem. Sed spuma prius ex tribus olei heminis coquitur. His duobus emplastris color niger est: qui ferè talis fit. ex pice, atq; resina. At ex bitumine nigerrimus. ex ærugine, aut æris squama uiridis. ex minio rubet. ex cerussa albus.

Basilicon emplastrum nigrum ad idem.

Aucæ admodum compositiones sunt, in quibus aliquid mixturæ uarietas nouat. Ergo id quoq; nigrum est. quod βασιλικὸν nominatur. Habet panacis. P. XI. galbani. P. XII, picis & resine, singulorum. P. XX. olei dimidium cyathum.

Smaragdinum emplastrum ad idem.

T quod peruiride est, smaragdini appellatur. in quo sunt  
 a resine pineæ. P. XIII. ceræ. P. XI. æruginis. P. Semis. turis fuliginis. P. Z. olei tantundem, aceti, quo fuligo, & ærugo in unum cogantur.

Emplastrum ruffum ad idem.

St etiam coloris ferè ruffi: quod celeriter ad cicatricem uulnera perducere uidetur. Habet thuris. P. XI. resine. P. XII. squamæ æris. p. XIII. spumæ argenti. P. XXX. ceræ: P. X  
 c. olei heminam.

Paracollecticum emplastrum ad idem.

Rætereæ est: quàm παρακολητικὸν à glutinando uocant.  
 p Constat ex his. bituminis, aluminis scissilis. P. XIII. spumæ argenti. P. XXI. & olei ueteris hemina.

Cephalicum emplastrum Philotæ capiti conueniens.

Ræterea sunt quedam generis eiusdem: quæ: quia capitibus fractis maxime conueniunt: *νεπαλινὰ* à græcis nominantur. philotæ compositio habet terræ erythrææ, chalcitidis, singulorū. p. XIII. myrrhæ, æris combusti. p. XX. ichhyocollæ, singulorū. p. XVI. æruginis rase, aluminis rotundi, mysi crudi, aristolochiæ, singulorum. p. XVII. squamæ æris. p. XX. thuris masculi. p. XII. ceræ. p. I. rosæ & olei acerbi ternos cyathos, aceti quantum satis est: dum arida ex eo conteruntur.

Emplastrum uiride ad idem ualens.

Liud ad idem uiride: æris combusti, squamæ æris, myrrhæ ichhyocollæ, singulorum. p. XVI. mysi crudi, æruginis rase, aristolochiæ, aluminis rotundi, singulorum. p. XVII. ceræ. p. XI. olei hemina, aceti quod satis sit.

*τετραφάρμακον* emplastrum ad pus mouendum.

Vri autem mouendo non aliud melius, quam quod expeditissimum est. *τετραφάρμακον* à græcis nominatur. habet partes portiones ceræ, picis, resinæ, seni taurini: si id non est, uitulini.

Enneapharmachum emplastrum ad pus mouendum, & ad purgandum ualens.

Iterum ad idē *ἐννεαφάρμακον* nominatur: quod magis purgat. constat ex nouē rebus, cera, melle, seuo, resina, myrrha, rosa, medulla uel ceruina uel uitulina uel bubula, hyssopo, butyro. Quorum ipsorum quoq; pondera paria miscentur. Sunt autem quedam emplastra: quibus utriusq; rei facultas est. quæ si singula habenda sunt, meliora sunt. sed in copia reiicienda sunt: his potius adhibitis: quæ proprie id, quod eo tempore opus est, consequuntur. Exempli causa duo proponam.

Attalum emplastrum ad uulnera.

St igitur ad uulnera attalum: quod habet squamæ æris. p. XVI. fuliginis. p. XXV. ammoniaci tantundem. resinæ terebinthinæ liquide. p. XXV. seni taurini tantundem, aceti heminas tres, olei sextarium.



*Iudæi emplastrum fracto capiti accommodatum.*

Diadaphnidon emplastrum ad extrahendum.

Aliud δὲ ἀπορριθῶν ad extrahendum, & pus mouendum.

*Philocratis emplastrum ad extrahendum, & pus mouendum.*

ρὺ πῶδες emplastrum ad extrahendum.

Emplastrum

## Emplastrum Hecatei ad extrahendum.

*h* Ecce quoq; auctore emplastrum generis eiusdē sit ex his.  
galbani. P. XII. fuliginis thuris. P. XIII. picis. P. XVI. ceræ,  
Et resinæ terebinthinæ, singulorum. XVIII. quibus paulū  
irini unguenti miscetur.

## Alexandrinum emplastrum viride ad extrahendum.

*u* Alensq; ad idem emplastrum viride alexandrinum est.  
Habet aluminis scissilis. P. XVIII. salis ammoniaci. P. XV  
III. Z. squamæ aeris. P. XXVI. myrrhæ, thuris singulorū. P.  
XXVIII. ceræ. p. CL. resinæ colophoniacæ, aut pineæ. P. CCC. olei  
heminam, acetī sextarium

## De emplastris exedentibus.

*q* Vædam autem sunt emplastra exedentia: quæ septa græci  
uocant quale est id quod habet resinæ terebinthinæ, fuliginis,  
thuris, singulorum. P. Z. squamæ aeris. P. XI. ladanī. P.  
XII. aluminis tantundem, spumæ argenti. P. XIII.

Emplastrum quod exest corpus, Et ossa resoluit, Et  
super crescentem carnem coerct.

*e* Xest etiam uehementer corpus, atq; ossa quoq; resoluit, Et  
super crescentem carnem coerct id quod habet spumæ ar-  
genti, squamæ aeris, uncias singulas, nūtri ignem non expti,  
lapidis asy, aristolochiæ. p. sextantes, ceræ resinæ terebinthinæ, thuris  
olei ueteris, atramenti sutorij, salis ammoniaci. P. semis, æruginis, rase.  
p. bessem, acetī syllitici heminam, uini aminei tantundem.

## Emplastra aduersus morsus, Et alia recentiora vulnera.

*f* Vnt etiam aduersus morsus quedam acomodata quale est.  
Diogenis, nigrum: quod habet bituminis, ceræ, resinæ pineæ  
aride, singulorū. P. XXX. spumæ argenti. P. XC. olei sextar-  
ium. Aut in quo sunt. squamæ aeris. P. XIII. cerusæ, Et æruginis  
passæ singulorū. P. XVIII. ammoniaci. P. XXII. ceræ, resinæ pineæ.  
singulorum. P. XXV. spumæ argenti. P. XC. olei sextarium. Aut in  
quo sunt squamæ aeris. P. XIII. galbani, P. XVI. cerusæ, Et ærugi-  
nis rase, singulorum. P. XVIII. ammoniaci. P. XXII. ceræ, resinæ pi-  
neæ singulorum. P. XLV. spuma argenti concoquitur.

## LIBER

*ἑμπίον emplastrum rubrum ad idem valens.*

Vbrum quoque emplastrum, quod ἑμπίον vocatur, huc  
 aptum est. Habet resinæ terebinthinæ. P. XII. galbani. P. X  
 IIII. minij sinopici. P. XVI. thuris fuliginis. P. XVI. ceræ  
 P. XVIIII. spumæ argenti. P. XLVI. olei veteris heminam.

*Aliud emplastrum ad idem valens.*

Tē id quod ex his constat. squamæ aris: thuris fuliginis: sin  
 gulorū. P. XIII. galbani. P. XVI. salis ammoniaci. P. XXII.  
 Z. ceræ. P. XXXV. olei tribus heminis. Hæc autē alijs quoq;  
 recentioribus vulnerebus recte imponuntur.

*Λανὰ emplastra non grauibz vulnerebus accommodata, &  
 maxime senilibz.*

Vnt enim albalenia: λανὰ græci vocant. ferè nō grauibz vul  
 neribus accommodata, præcipuèq; senilibz. Quale est qđ ha  
 bet cerussæ. P. XXXXII. seu vitulini curati, & ceræ: singulo  
 rum. P. XLVIII. olei heminas tres: ex quibus ea cerussa coquitur.

*Elephantinum emplastrum.*

Lind qđ hēt cerussæ. P. XXX. ceræ. P. XXXXV. olei hemi  
 nā, aquæ sextarii. Quæ quotiens adiūtur cerussæ uel spu  
 mæ argenti: scire licet illa ex his coquēda esse. Est autē ea p  
 cādida cōpositio quæ supra posita est, ideoq; elephātina nominatur.

*Lenia emplastra.*

Enia quoq; quædam emplastra sunt, quas λιπαρὰς ferè græ  
 ci nominant: ut id quod habet minij. P. XIII. spumæ argen  
 ti. P. XXXV. ceræ et adipis suillæ. singulorum. P. XXXVII  
 vitellos quatuor.

*Emplastrum lene.*

Lia compositio generis eiusdem: ceræ, resinæ terebinthinæ,  
 singulorum. P. XVI. cerussæ. P. XVIII. spumæ argenti, plu  
 bi recrementi, sinopici, μολύβδου græci vocant, singulorum.  
 P. XXX. cicini olei, & myrti, singulorum heminæ.

*Archagathi emplastrum lene.*

Ertia quæ ad auctorem Archagathum refertur, mysi cocti,  
 aris combusti, singulorum. P. XIII. cerussæ coctæ. P. XVIII  
 resinæ terebinthinæ. P. XX. spumæ argenti. P. XVI.



Emplastra eiusdem generis ad leniendum apta.

Tiam num spumæ, argenti, ceræ, adipis suillæ singulorum  
 P. XXXVII. vitelli cocti quatuor, rosæ hemina, Aut cerati ex  
 oleo myrteo facti partes tres, adipis suillæ pars quarta, pau-  
 lum ex plumbi recremento. Aut spumæ argenti selibra ex olei hemi-  
 na, & aquæ marinæ altera cocta donec bullire desierit, cui paulum  
 ceræ sit adiectum, aut pares portiones ceræ, seui, sibi, spumæ argenti,  
 cerusæ.

De pastillis, & primo de his, qui ad recentia vulnera glutinā-  
 da, sanandaq; apti sunt. Cap. XX.

Astilli quoq; facultates diuersas habent. sunt enim ad recen-  
 tia vulnera glutinanda, sanandaq; apti. Quales est qui ha-  
 bet chalctis, mysi, spumæ nitri, floris æris, gallæ, aluminis  
 scissilis modice cocti, singulorum. P. XI. æris combusti, capitulorum ma-  
 li punia, singulorum. P. XII. Hunc oportet diluere aceto, sic, ubi vul-  
 nus glutinandū est, illinere. At si nervosus aut musculosus is locus est,  
 cōmodius est, cerato miscere sic, ut illius octo partes: nona huius sit.

Alius pastillus ad glutinanda vulnera.

Alius ad idem cōstat ex his, bituminis, aluminis scissilis, sin-  
 gulorum. P. XI. æris combusti. P. XIII. spumæ argenti. P. X.  
 XI. olei sextarium.

De sphragide pastillo: quē Polybus confecit, ad glutinandū vulnus.

Ed longe polybi celeberrimus est. σφαγῆς autē nominatur.  
 qui habet aluminis scissilis. P. XI. Z. atramenti sutorij. P. X.  
 II. myrrhæ. P. XV. aloes tantumdē, capitulorum punici mali, fellis tau-  
 rini, singulorum. P. XVI. Quæ contrita uino austero exapiuntur.

Pastillus ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, nari-  
 bus, obscenis partibus, inflammationesq; eorum:

D ulcera sordida & nigritiem in auribus, naribus, obscenis  
 partibus, inflammationesq; eorum, chrysocollæ. P. XI. atra-  
 menti sutorij, aluminis scissilis, singulorum. P. XII. halicacabi corticis.  
 P. X. III. minij. P. XVI. spumæ argenti. P. XXII. cerusæ. P. XXVI.  
 Quæ ex aceto & coguntur, & ubi utendum est: diluuntur.

## LIBER

Pastillus andronis ad uenam inflamatam, ad naturalia sordida etiam cancro laborantia.

**a** Andronis uero est ad uenam inflamatam, ad naturalia sordida etiam cancro laborantia, gallæ, atramenti sutorij, myrrhæ singulorū .P. .Xij. aristolochiæ, aluminis scissilis, singulorum .P. .XII. capitula punici mali. P. .XXXV. ex passo coacta, et cui usus exigit aceto, uel uino diluta, prout ualentius, aut lenius uitium est, cui medendum est.

Pastillus ad fissā ani, uel ora uenarum fundentia sanguinem, uel cancerum.

**p** Proprie autem ad ani fissā, uel ora uenarum fundentia sanguinē, uel cancerū, æruginis. P. .XII. myrrhæ P. .XXII. sibiis, lacrymæ papaueris, acaciæ, singulorum. P. .XXVI. Quæ ex uino, et teruntur, et in ipso usu deliquantur.

Pastillus ad expellendum calculum cum urina.

**e** Expellere autem ex uesica cum urina calculum uidetur hæc cōpositio. casia, croci, myrrhæ, costi, nardi, cinnamomi, dulcis radice, balsami, hyperici, pares portiones conteruntur. deinde uinū lene instillatur, et pastilli fiunt: qui singuli habeant. P. .XZ. hiq; singuli quotidie mane ieiuno dantur.

De pessis. Caput. XXI.

**b** Aec tria compositionū genera: idest quæ in malagmatis, pastillus, emplastrisq; sunt. maximū, præcipueq; uarium usum præstant. Sed alia quoq; utilia sunt. ut ea quæ foeminis subiiciuntur (παιδὸς græci uocant) Eorū hæc proprietas est, Medicamentis composita molli lana excipiuntur, eaq; lana naturalibus conditur.

Ad sanguinem euocandum.

**a** D sanguinem autem euocandū canneis duabus adijcitur nitri. P. .XII. aut allij semen cōteritur. adijcitur myrrhæ paululum, et unguento susino miscetur, aut cucumeris siluestris pars interior ex lacte muliebri diluitur.

Ad uulnam molliendam.

**a** D uulnam molliendam oui uitellus, et foenum græcum, et rosa, et crocum temperantur. Aut elaterij. P. .XZ. salis tantundem, uinæ taminæ. P. .XVI. melle excipiuntur.

Alia pessi compositio ad idem ualens.

a Ut Boetho auctore, croci resinæ terebinthinæ, singulorum  
P. XIII. myrræ. P. X. ZZ. rosæ. P. XI. seni uitulini. P. X. Z.  
ceræ. P. XII. miscentur.

AD inflammationes uulvæ Numenij, Pessus.

Prima autem aduersus inflammationes uulvæ Numenij com-  
positio est: quæ habet croci. P. X. Z. ceræ. P. XI. butyri. P. X.  
VIII. adipis anserinæ. P. XXII. uittellos coctos duos, rosæ  
minus cyatho.

Ad eijciendum è uulua infantem mortuum.

f I uero infans intus decessit: quo facilius eijciatur, malicorium  
ex aqua terendum: eoq; utendum est.

Si mulier uitio locorum concidit, qua curatione utendum sit.

f I concidere uitio locorum mulier solet, cochleæ cum testis suis  
comburendæ, conterendæq;: deinde his mel adijciendum est.  
Si non comprehendit, adeps leonina ex rosa mollienda est.

De medicamentis quibus aridis utimur, ad carnem super-  
crescentem exedendam. Caput. XXII.

q Vædam autem mixturæ medicamentorum sunt: quibus ari-  
dis neq; coactis utimur sic, ut inspergamus: aut cum aliquo  
liquido mixta illinamus: quale est ad carnem supercre-  
scentē exedendā. qd̄ habet squamæ, fuliginis thuris singulorū. P. XI.  
æruginis. P. XII. Hæc aut eadem cum melle purgant ulcera: cum cera  
implent. Mysi quoq; et galla si paribus portionibus misceantur, corpus  
consumunt: eaq; uel arida inspergere licet: uel excepta cadmia illinere.

Ad putrem carnem continendam ne ultra serpat, eamq;  
leniter exedendam plures compositiones.

p Vtrem uero carnē continet, neq; ultra serpere patitur, et  
leniter exest mel, uel cum lenticula, uel cum marrubio, uel  
cum oleæ folijs ante ex uino decoctis. Item sertula campana  
in mulso cocta, deinde contrita, aut calx cum cerato, aut amara nuxes  
cū allio sic, ut huius pars tertia sit: paulumq; his croci adijciatur. aut  
quod habet spumæ argenti. P. XVI. cornu bubuli combust. P. XXII.



## LIBER

aluminis scissilis, thuris, singulorum. P. XIII. gallæ. P. XVIII. aristolochiæ. P. XX. Vehementius idem facit etiam adurendo, auripigmenti cum chalcitide, aut nitro, aut calce, aut charta combusta. Item sal cum aceto. Vel ea compositio quæ habet chalcitidis, capitulorum punia mali, aloes, singulorum. P. XII. aluminis scissilis, thuris, singulorum. P. XIII. gallæ. P. XVIII. aristolochiæ. P. XX. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Vel catharides. P. XI. sulphuris. P. XI. lolij. P. XIII. Quibus adiatur picis liquidæ quantum satis est. adiungendum vel chalcitis quoque cum resina, et ruta mixta. aut cum eadem resina: diphryges, aut una aminia cum picæ liquidæ. Idem uero possunt feces uini combusta, et calcis, et nitri pares portiones, uel aluminis scissilis. P. XX. thuris sandaracæ, nitri singulorum. P. XI. gallæ. P. XVIII. aristolochiæ. P. XX. mellis quantum satis est.

### Hieræ compositio.

St etiam hieræ compositio. quæ habet myrrhæ, chalcitidis, singulorum. P. XII. aloes, thuris, aluminis scissilis, singulorum. P. XIII. Aristolochiæ, gallæ immaturæ, singulorum. P. XVIII. malicorij contriti. P. XX.

### Iudæi compositio.

St iudæi in qua sunt calcis partes duæ, nitri quæ ruberrima pars tertia. quæ urina impuberis pueri cogitur, donec strigmenti crassitudo sit. Sed subinde is locus: cui id illinitur: malefaciendus est.

### Iolæ compositio.

T iolæ, chartæ combustæ, sandaracæ, singulorum. P. XI. calcis. P. XII. auripigmenti tantumdem miscebat.

Ad sanguinis profluvia, uel ex membrana cerebri, uel alijs locis et ad cancerum, et ad inducendam cicatricem, et ad accrescendam carnem crescentem.

I uero ex membrana: quæ super cerebrum est, profluit sanguis, vitellus combustus et contritus inspergi debet. Si alio loco sanguinis profluvium est, auripigmenti, squamæ aeris, singulorum. P. XI. sandaracæ. P. II. marmoris cocti. P. XIII inspergi debet. Eadem cancro quoque obfistunt. Ad inducendam cicatricem, squamæ aeris, thuris fuliginis, singulorum. P. XII. calcis. P. III. Eadem increscentem quoque carnem coercent.

Timei compositio ad ignem sacrum, uel cancerum.

Imeus autem ad ignem sacrum, uel ad cancerum, his utebatur.  
 Myrræ. P. XII. thuris, atramenti sutorij, singulorum. P. XIII.  
 sandaracæ, auripigmenti, squamæ æris, singularium. P. XIII.  
 gallæ. P. XVI. cerussæ combustæ. P. XVIII. Eadem uel arida insper-  
 sa, uel melle excepta idem præstant.

Ad sternutamenta excitanda.

Sternutamenta uero, uel albo ueratro, uel struthio coniecto  
 in nares excitantur, uel his mixtis: piperis, ueratri albi, sin-  
 gulorum. P. XZ. castorei. P. X. spumæ nitri. P. XI. struthij. P. XIII.

Gargariationes quibus fieri debeant.

Gargariationes autem aut lenandi causa fiunt, aut reprimē-  
 di, aut euocandi. Lenat lac, cremor uel ptisanæ, uel furfurum.  
 Reprimit aqua, in qua uel lenticula, uel rosa, uel rubus, uel  
 cotoneum malum, uel palmulæ decoctæ sunt. Euocant, sinapi, piper.

De antidotis, & quibus malis opitulentur. Caput. XXIII.

Antidota raro, sed præcipue interdum necessaria sunt: quia  
 grauissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem datur col-  
 lisis corporibus uel per ictus, uel ubi ex alto deciderunt, uel  
 uiscerum, laterum, faucium, interiorumq; partium doloribus. Maxime  
 autem desideranda sunt aduersus uenena uel per morsus, uel per ci-  
 bos, aut potiones nostris corporibus inserta.

Compositio antidoti.

Num est: quod habet lacrymæ papaueris. P. XZ. acori, ma-  
 lobathri. P. XV. iridis illiyricæ, gummi, singulorum. P. XII.  
 anesi. P. XIII. nardi gallici, foliorum rosæ aridorum, carda-  
 momi, singulorum. P. p. IIII. petroselinij. P. p. IIII. Z. folij. P. p. V. cassiæ  
 nigrae, silis, bdellij, balsami, seminis piperis albi, singulorum. P. XZ. sty-  
 racis. P. V. Z. myrræ, oppoponacis, nardi syrii, thuris masculi, hypocisti-  
 dis suæ, singulorum. P. XVI. castorei. P. XVI. costi, piperis albi, galbani,  
 resinæ terebinthinæ, croci floris, iunci rotundi, singulorum. P. VI. Z.  
 dulcis radicis. P. p. VIII. Z. Quæ uel melle, uel passo excipiuntur.

## LIBER

Aliud antidotum Ambrosia nominatum, quod Zopyrus  
Ptolemæo regi composuit.

Iterum quod Zopyrus regi Ptolemæo dicitur composuisse,  
atq; Ambrosiâ nominasse: ex his constat. Costi, thuris mascu-  
li, singulorū. P. p. V. piperis albi. P. p. Z. floris iunci rotundi. P.  
II. cinnamomi. P. p. III. cassie nigrae. P. p. IIII. croci ciliij. P. p. IIII.  
Z. myrræ quàm stacten nominat. P. p. V. nardi indici. P. p. V. Z. quæ  
singula contrita melle cocto exapiuntur. Deinde ubi utendum est id:  
quod ægyptiæ fabæ magnitudinem impleat, in potione uini diluitur.

### Antidotum Mithridatis.

Obilissimum autem est Mithridatis, quod cotidie sumendo  
rex ille dicitur aduersus uenenum pericula tutum corpus  
suū reddidisse. in quo hæc sunt, costi. P. p. S. Z. acori. P. p. V.  
hypici, cumini, sarsæni, agrostis succi, iridis illyricæ, cardamomi, singu-  
lorū. P. p. II. anesi. P. p. III. nardi gallici, gentiæ aradiæ, aridorū ro-  
sæ foliorum, singulorū. P. p. IIII. papaueris lacrymæ, petroselinii, sin-  
gulorū. P. p. IIII. Z. cassie, filis loly, piperis longi, singulorū. p. XVI.  
styracis. p. V. Z. castorei, thuris hypocistidis succi, myrræ, poponacis, sin-  
gulorum. p. VI. Z. malobathri folij. XVI. floris iunci rotundi, resinæ  
teribinthinæ, galbani, dauci cretica seminis, singulorū. P. p. VI. Z. nar-  
di, opobalsami, singulorū. P. p. VI. Z. thlaspi. p. XV. ZZ. radicis pon-  
ticæ. p. VII. croci, Zinziberis, cinnamomi, singulorum. p. XVIII. r.  
Hæc contrita melle exapiuntur: et aduersus uenenum, quod magni-  
tudinem nucis græcæ impleat, ex uino datur. In cæteris autem affe-  
ctibus corporis pro modo eorū, uel quod ægyptiæ fabæ, uel quod Erui  
magnitudinem impleat, satis est.

### DE acopis. Caput. XXIIII.

Copa quoq; utilia neruis sunt: quale est quod habet floris  
iunci rotundi. p. II. ZZ. costi, iunci quadrati, lauri baacorum,  
ammōiaci, cardamomi, singulorū. p. p. IIII. Z. myrrhæ, æris  
cōbusti singulorū. P. p. VII. iridis illiricæ, cere singulorū. P. p. XIII.  
alexadrini calami, iunci rotundi, asspalathi, xylobalsami, singulorum  
P. XVIII. seu. P. I. unguenti irini cyathum.

Acopum aōdes neruis utile.

Iterum quod aōdes uocant, hoc modo fit: aræ. P. Z. olei  
tantundem, resinæ terebinthinæ ad nucis iuglandis magni-  
tudinem simul incoquantur: deinde infusa in mortario te-  
runtur;



runtur, instillaturq; subinde quàm optimi mellis acetabulum: tum iri  
ni unguenti, & rosæ terni cyathi.

Ex his ad ulcera purganda, & implenda.

χρῖστὴ autem græci uocant, liquida quæ illinuntur. Qua-  
le est quod fit ad ulcera purganda, & implenda, maximo  
inter nervos paribus portionibus inter se mixtis, butyri, me-  
dullæ uitulinae, seu uitulini, adipis anserinae, ceræ, mellis, resinae tere-  
binthinae, rosæ, olei cicini. Quæ separatim omnia liquantur: deinde  
liquida miscentur, & tum simul teruntur. Et hoc quidem magis pur-  
gat. Magis uero emollit: si pro rosâ cypirus infunditur.

### Ad sacrum ignem.

Ad sacrum ignem spumæ argenti. P. XVI. corni bubuli com-  
busti. P. XII. conteruntur, adijciturq; inuicem uinum, & id  
quod specialiter sil uocatur, & myrteū: donec utriusq; terni  
cyathi coniungantur.

### De catapotijs. Caput. XXV.

Catapodium ad somnum accersendum, & leuationem  
doloris, & simul ad concoquendum.

Catapodia quoq; multa sunt, uarijsq; de causis fiunt. ἀνάνθη  
uocant quæ somno dolorem leuant. Quibus uti: nisi nimia  
necessitas urget, alienum est. Sunt enim ex uehementibus me-  
dicamentis, & stomacho alienis. Potest tamen etiam ad concoquendū:  
quod habet papaueris lacrymæ, galbani, singulorum. P. XI. myrrhæ,  
castorei, piperis, singulorum. P. XII. Ex quibus quod erui magnitudi-  
nem habet, satis est deuorasse.

### Catapodium ualentius ad somnum.

Iterum stomacho peius, ad somnū ualentius ex his fit, mā-  
dragoræ. P. Z. apij seminis, item hyoscyami seminis, singulo-  
rū. P. XIII. Quæ ex uino teruntur. Vinum autem eiusdē  
magnitudinis: quæ supra posita est: abunde est sumpsisse.

### Catapodium ad plurimos dolores per somnum leniendos.

Sive autem capitis dolores, siue ulcera, siue lippitudo, siue  
dentes, siue spiritus difficultas, siue intestinorum tormenta,

## LIBER

sive inflammatio uulue est, siue coxa, siue iecur, aut lienis, aut latus torquet, siue uitio locorum aliqua prolabitur, & obmutescit, occurrit dolori per quietem eiusmodi catapotium. Silis, acori, rutæ siluestris seminis, singulorum. P. p. I. castorei, cinnamomi, singulorum. P. XII. papaueris lacrymæ, panaces, radices mandragoræ, malorum aridorum, iunci rotundi floris, singulorum. P. p. II. piperis grana. LVI. Hæc per se contrita, rursus instillato subinde passio, simul omnia teruntur, donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum aut deuoratur, aut aqua diluitur, & potui datur.

Catapotium aliud, ad multa ualens.

q Vin etiam siluestris papaueris, cum iam ad exapiendam lachrymam maturum est, manipulus qui manu comprehendi potest, in uas demittitur, & superinfunditur aqua: quæ id contegat, atq; ita coquitur. Vbi iâ bene manipulus is coctus est, ibidem expressus proijciatur, & cum eo humore passi pari mensura miscetur, inferuetq; donec crassitudinem sordium habeat. Cum infixit, catapotta ex eo sunt ad nostræ fabæ magnitudinem, habentq; usum multiplicem. Nam & somnû faciunt uel per se assumpta, uel ex aqua data, & aurium dolores leuant, adiectis exiguo modo rutæ succi, ac passi. Et tormina supprimunt ex uino liquata, & inflammationem uulue coercet mixta cerato ex rosa facto: cum paulum his croci quoq; accessit, & ex aqua fronti inducta, pituitam in oculos decurrentem tenent.

Catapotium ad inducendum somnû: quod uulua dolens prohibuit.

i Tem si uulua dolens somnum prohibuit, croci. P. XII. anesi, myrrhæ, singulorum P. p. I. papaueris lacrymæ. p. p. XIII. ciutæ seminis. p. XVIII. miscentur, excipiunturq; uino uetere, et quod lupini magnitudinem habet in tribus cyathis aquæ diluitur. Id tamen in febre periculose datur.

Ad iecur sanandum.

a D sanandum iecur niri. P. X. Z. croci, myrrhæ, nardi gallici, singulorum. P. XI. melle excipiuntur, daturq; quod ægyptiæ fabæ magnitudinem habeat.

Ad finiendos dolores lateris.

a d lateris dolores finiendos, piperis. aristolochiæ, nardi, myrrhæ pares portiones.

Ad thoracis dolores finiendos.

D thoracis, nardi. P. XI. thuris, casia, singulorū. P. XIII. myrrhæ, cinnamomi, singulorū. P. XVI. croci. P. XVIII. resinæ terebinthinæ quadrans, mellis heminae tres.

Catapotium Athenionis ad tussim.

D tussim Athenionis, myrrhæ, piperis, singulorum. P. p. XI. castorei, papaueris lacrymæ, singulorum. P. XI. Quæ separatim confusa postea iunguntur, & ad magnitudinem fabæ nostræ bina catapota mane, bina noctu dormituro dantur.

Catapotium Heraclidis tarentini ad tussim, & somnum.

I tussis somnum prohibet, ad utranq; Heraclidis tarentini croci. P. XI. cinnamomi. castorei, papaueris lacrymæ, singulorū. P. XI. myrrhæ, pipis longi. costi, galbani, singulorū. P. Z.

Catapotium ad purganda ulcera in faucibus tussientibus.

Vod si purganda sunt ulcera in faucibus tussientibus, panacis, myrrhæ, resinæ terebinthinæ, singulorum. P. X. galbani. P. Z. hyssopi. P. Z. conterenda sunt. huiusq; hemina mellis adiungenda, & quod digito excipi potest, deuorandum est.

Collice cassij medici.

Collice uero Cassij ex his constat, croci, anesi, castorei, singulorū. P. XIII. petroselinii. P. XIII. piperis & longi, & rotundi, singulorum. P. XV. papaueris lacrymæ, iuncea rotundi, myrrhæ, nardi, singulorum. P. XVI. Quæ melle excipiuntur. Id autem & deuorari potest, & ex aqua calida sumi.

Ad infantem mortuum, aut secundas expellendas.

i Infantem uero mortuum, aut secundas expellit aquæ potio, cui salis ammoniaci. P. XI. aut cui dictami cretici. P. XI. adiectum est.

Laborantibus ex partu quid dari debeat.

e X partu laborantibus erisimum ex uino tepido ieiunæ dari debet.

Ad adiuvandam uocem.

u Ocem adiuvat thuris. P. XI. in duobus cyathis uini datum.

Aduersus difficultatem urinae.

a Duersus urinae difficultatem, piperis longi, castorei, myrrhæ, galbani, papaueris lacrymæ, croci, costi unciæ singulae, styradis, resinæ terebinthinæ. P. sextantes, mel, absinthij cyathus. Ex quibus ad magnitudinem fabæ ægyptiæ & mane, & cœnato dari debet.

k ij



Rteriace uero hoc modo fit: *casia*, *iridis*, *cinnamomi*, *nardi*,  
 a *myrrhæ*, *thuris*, *singulorum*. P. ꝯ. I. *croci*. P. ꝯ. I. *piperis* *grana*. ꝯXX. ex passi tribus sextarijs decoquuntur: donec mel  
 lis crassitudo his fiat. Aut *croci*, *myrrhæ*, *thuris*, *singulorum*. P. ꝯI.  
 coniunguntur in passi eundem modum, eodemq; modo decoquuntur.  
 Aut eiusdem passi *hemine* tres usq; eo coquuntur: donec extracta  
 inde gutta indurescat, & adijcitur *tritæ casia*. P. ꝯI.

De quinq; generibus noxarum corporis, & primo de *uulneribus* quæ maxime per tela inferuntur. Cap. XXVI.

Vm facultates medicamentorū proposuerim, genera in quibus  
 c noxa corpori est: proponam. Ea quinq; sunt. Cum quid  
 extrinsecus læsit: ut in *uulneribus*. Cū quid intra se ipsum  
 corruptum est, ut in *canthro*. Cum quid innatum est, ut in *uestica* *calculus*. Cum quid increuit, ut *uena* quæ intumescens in *uariem* conuertitur. Cum quid deest, ut cum curata pars aliqua est. Ex his alia  
 sunt, in quibus plus medicamenta. Alia in quibus plus manus proficit. Ergo dilatis his: quæ præcipue *scalpellū*, et *manū* postulant: nunc  
 de his dicam, quæ maxime medicamentis egent. Diuidam autem hanc  
 quoq; curadi partem sicut priorem. Et ante dicam, de his quæ in quolibet  
 partem corporis incidunt. Tum de his, quæ certas partes infestant.  
 Incipiam a *uulneribus*. In his aut ante oīa scire medicus debet: quæ *isana*  
 bilia sunt: quæ difficilē curationē habeant: quæ promptiorē. Est. *na*  
 prudētis hominis: primum eū, qui seruari nō potest, non attingere, nec  
 subire speciem eius ut *ocasi*, quem sors ipsius peremit. Deinde ubi gra  
 uis metus sine certa tamen desperatione est, indicare necessarijs pericli  
 tantis in difficili rem esse: ne si uicta ars malo fuerit, uel ignorasse,  
 uel fefellisse uideatur. Sed ut hæc prudenti uiro conueniunt, sic rursum  
 histrionis est, paruā rē attollere, quo plus præstitisse uideatur. Obliga  
 riq; æquū est confessione propterea rei: quo curiosius etiā circumspiciat,  
 ne, quod per se exiguum est malum, maius curantis negligentia fiat.

Quæ uulnera in sanabilia sunt.

Eruari nō potest, cui *basis cerebri*, cui *cor*, cui *stomachus*, cui  
 f iocineris portæ, cui in *spina medulla* percussa est, cuiq; aut  
 pulmo medius, aut *ieinum*, aut tenuius *intestinum*, aut *uentriculus*, aut *renes* uulnerati sunt: cui uel circa *fauces* *grandes nene*, uel  
 arteriæ præcise sunt.

*Quæ vulnere difficilē curationem habeant.*

*Ix autem ad sanitatē perueniunt: quibus ulla parte pulmo,  
 u aut iocineris crassum, aut membrana, quæ continet cerebrū,  
 aut lienis, aut uulua, aut uestica, aut ullum intestinum, aut se-  
 ptum transuersum vulneratū est. Hi quoq; in præcipiti sunt: in qui-  
 bus usq; ad grandes intusq; conditas uenas in alis, uel poplitibus  
 mucro descendit. Periculosa etiam vulnere sunt, ubicunq; uenæ maio-  
 res sunt. quoniam exhaurire hominem profusione sanguinis possunt.  
 Idq; euenit non in alis tantum, atq; poplitibus, sed etiam in his ue-  
 nis, quæ ad anum, testiculosq; perueniunt. Præter hæc malum vulnus  
 est, quodcunq; in alis uel foeminibus, uel inanibus locis, uel in articu-  
 lis, uel inter digitos est. Item quodcunq; musculum, aut neruum, aut ar-  
 teriam, aut membranam, aut os, aut arthilaginem læsit.*

*Quæ vulnere tutiorē curationem habeant.*

*6 Utissimum omnium quod in carne est. Et hæc quidem loco  
 uel peiora uel meliora sunt. modo uero periculū facit quod-  
 cunq; magnum est.*

*Observationes quædam et ætatis, et corporis, et uitæ,  
 et temporis in uulneribus.*

*Liquid etiam in uulneris genere, figurq; est. Nam peius  
 a est quod etiā collisum, quā quod tantū discissum est. adeo  
 ut acuto quoq; quā retuso telo uulnerari commodius sit.  
 Peius etiā vulnus est, ex quo aliquid excisum est: ex quo uel atro alia  
 parte abscissa, alia dependet: pessima quæq; plaga in orbē est: tutissi-  
 ma quæ lineæ modo recta est. Quo deinde propius huic, illi uel figu-  
 ræ vulnus est: eo uel deterius, uel tolerabilius est. Quin etiam confert  
 aliquid et ætas, et corpus, et uitæ propositum, et anni tempus, quia  
 facilius sanescit puer uel adolescens, quā senior: ualens quā infir-  
 mus: neq; nimis tenuis, neq; nimis plenus, quā si alterum ex his est.  
 integri habitus, quā corrupti: exercitatus, quā iners: sobrius, et tem-  
 perans, quā uino, ueneriq; deditus. Opportunissimumq; curationi tem-  
 pus uernum est, aut certe: neq; feruens neq; frigidum, siquidem uulne-  
 ra et nimis calor, et nimium frigus infestant: maxime tamen horū  
 uarietas: ideoq; perniciosissimus autumnus est. Sed pleraq; ex uulne-  
 ribus oculis subiecta sunt: quorundam ipsæ sedes indices sunt, quas  
 alio loco demonstraui, cum positus interiorum partiū ostendimus.  
 Veruntamen quia quædam uicina sunt, interest quoq; vulnus in sum-*

*Aurelij Cor.*

*k ij*

ma parte sit, an penitus penetrauerit: necessarium est notas subijcere, per quas quid intus actum sit, scire possimus: & ex quibus uel spes, uel desperatio oritur.

Signa percussæ cordis.

*i* Citur corde percusso, sanguis multus effertur: uenæ languescunt: color pallidissimus: sudores frigidi, maliq; odor: tamquam irrorato corpore oriuntur: extremisq; partibus frigidis matura mors sequitur.

Signa pulmonis icti.

*p* Vlmone uero icto, spirandi difficultas est: sanguis ex ore spumas: ex plaga rubens: simulq; etiam spiritus cum sono fertur in uulnus inclinari inuat: quidam sine ratione consurgunt. Multi, si in ipsum uulnus inclinati sunt, loquuntur: si in aliam partem, obmutescunt.

Signa iocineris uulnerati.

*i* Ocineris autem uulnerati notæ sunt, multus sub dextra parte præcordiorum profusus sanguis: ad spinam reduta præcordia: in uentrem cubandi dulcedo: punctiones, doloresq; usq; ad iugulum, iunctumq; ei latus scapularum: os intentum. Quibus nonnunquam etiam biliosus uomitus accedit.

Signa percussorum renium.

*r* Enibus uero percussis, dolor ad inguina, testiculosq; descendit: difficulter urina redditur: eaq; aut est cruenta, aut cruor fertur.

Signa uulnerati lienis.

*a* T liene icto sanguis niger à sinistra parte prorumpit: præcordia cum uentriculo ab eadem parte indurescunt: sitis ingens oritur: dolor ad iugulum, sicut iocinere uulnerato uenit.

Signa percussæ uulue.

*a* T cum uulua percussa est, dolor inguinibus, & coxis, & femoribus est. Sanguinis pars per uulnus, pars per naturale descendit: uomitus bilis insequitur. Quædam obmutescunt: quædam mente labuntur: quædam sui compotes: neruorum, oculorumq; dolore urgeri se confitentur: moriētesq; tandem eadē, quæ corde uulnerato, patiuntur.



Signa percussi cerebri, uel membranæ eius.

In cerebrum membranæ uel eius uulnus accepit: sanguis per  
f nares, quibusdam etiam per aures exit: fereq; bilis uomitus  
insequitur. Quorundam sensus obtunduntur: appella-  
tiq; ignorant. Quorundam trux uultus est: quorundam oculi quasi  
resoluti huc, atq; illuc mouentur. fereq; tertio, uel quinto die delirium  
accedit. multorum etiam nervi distenduntur. Ante mortem autem ple-  
riq; fascias, quibus caput deligatum est: lacerant: ac nudum uulnus  
frigori obijciunt.

Signa percussi stomachi.

Bi stomachus autem percussus est: singultus, & bilis uomitus  
u insequitur. Siquid cibi, uel potionis assumptum est, ea red-  
ditur cito. Venarum motus elanguescunt: sudores tenues ori-  
untur: per quos extremæ partes frigescent.

Signa ieiuni intestini, & uentriculi uulnerati,

& aliorum intestinorum.

Ommunes uero ieiuni intestini, & uentriculi uulnerati no-  
c tæ sunt. Nam abus, & potio per uulnus exeunt: præcor-  
dia indurescunt. nonnunquam bilis per os redditur. inte-  
stino tantum sedes inferior est. Cætera intestina iccta uel ster-  
cus, uel odorem eius exhibent.

Signa percussæ medullæ, quæ in spina est.

m Edulla uero quæ in spina est discussa, nervi resoluuntur: aut  
distenduntur. sensus intercidit: interposito tempore aliquo si-  
ne uoluntate inferiores partes uel semen, uel urinam, uel etiam ster-  
cus excernunt.

Signa septi transuersi percussi.

a T si septum transuersum percussum est, præcordia sursum  
contrahuntur: spina dolet: spiritus rarus est: sanguis spumans  
fertur.

Signa uesicæ uulneratæ.

Uesica uero uulnerata dolent inguina. quod super pubem  
u est: intenditur. pro urina sanguis, aut ex ipso uulnere urina  
descendit: stomachus afficitur. itaq; aut bilem uomunt: aut  
singultiant: frigus, & ex eo mors sequitur.

De sanguine, & sanie, & pure, & eorum specielus quan-  
do uel meliora, deteriora uel sint.

h Is cognitis etiam nunc quædam alia noscenda sunt ad cîa  
uulnera, ulceraq; de quibus dicturi sumus: pertinentia. Ex  
his aut exit sanguis, sanies, pus. Sanguis omnibus notus est.

Sanies est tenuior hoc, uarie crassa, & glutinosa, & colorata. Pus crassissimum, albidissimumq; glutinosius & sanguine, & sanie. Exit aut sanguis ex ulnere recenti, aut iam sanescente. sanies est inter utriusq; tempus. pus ex ulcere iam ad sanitatem spectante. Rursus & sanies, & pus quasdam species græcis nominibus distinctas habent. Est enim quedā sanies quæ uel ἰχθὺς, uel μείλικπος nominatur. Est pus quod ἐλαῶδες appellatur. ἰχθὺς tenuis, subalbidus ex malo ulcere exit: maximeq; ubi nervo læso inflammatio secuta est. μείλικπος crassior, & glutinosior subalbida, melliq; albo subsimilis fertur. Hæc quoq; ex malis ulceribus ubi nervi circa articulos læsi sunt, & inter hæc loca maxime ex genibus. ἐλαῶδες tenue subalbidum quasi unctum colore, atq; pinguitudine, oleo albo non dissimile apparet in magnis ulceribus sanescentibus. Malus autem est sanguis nimium aut tenuis, aut crassus, colore uel liuidus uel niger, aut pituita mixtus, aut uarius. Optimus calidus, rubens, modice crassus, non glutinosus. Itaq; protinus eius ulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit. Itemq; postea spes in his maior est, ex quibus melioris generis quæq; proveniunt. Sanies igitur mala est multa, nimis tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quæ & ipsum ulcus & iunctam ei cutem erodit. Melior nō multa modice crassa, subrubicunda, aut subalbida. ἰχθὺς autem peior est multus, crassus, subliuidus, aut subpallidus, glutinosus ater, calidus, mali odoris. Tolerabilior est subalbidus, qui cætera omnia contraria prioribus habet. μείλικπος autem mala est multa, & percrassa: melior quæ & tenuior, & minus copiosa est. Pus inter hæc optimum est. Sed id quoq; peius est multum, tenue, dilutum, magisq; si ab initio tale est. Itemq; si colore sero simile, si pallidum, si liuidum, si feculentum est. Præter hæc si male olet, nisi tamen locus hunc odorem excitat. Melius est, quo minus est, quo crassus, quo albidus. Itemq; si leue est: si nihil olet: si æquale est. modo tamen convenire & magnitudini ulneris, & tempori debet. Nam plus ex maiore, plus nondum solutis inflammationibus naturaliter fertur. ἐλαῶδες quoq; peius est multum, & parum pingue, quo minus etiam quoq; id ipsum pinguius, eo melius est.

#### Curatio aduersus profusionem sanguinis in ulneribus.

Vibis exploratis ubi aliquis ictus ē, qui seruari potest: protinus prospicienda duo sunt: ne sanguinis sit profusio: ne ue  
 q inflammatio interimat. Si profusionem timeamus, quod ex se de ulneris, & magnitudine eius, & ex impetu ructus sanguinis in-

telligi potest, sicut linamentis vulnus implendum est: supraq; imponenda spongia ex aqua frigida expressa: ac manu super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescit, sæpius linamenta mutanda sunt. Et si siat parum valent, aceto madefacienda sunt. id uehemens ad sanguinem suppressendum est. Ideoq; quidam id vulneri infundunt. Sed alius rursus metus subest: ne nimis ualenter ibi retenta materia magnam inflammationem postea moueat. quæ res effiat neq; rodentibus medicamentis, neq; adurētibus: & ob id ipsum inducentibus crustam, sit utendum: quanuis pleraq; ex his sanguinem supprimunt. Sed si semel ad ea decurritur, potius quæ mitius idē efficiunt. Quod si illa quoq; profusio uincuntur. uenæ, quæ sanguinem fundunt, apprehendendæ: circaq; id quod ictum est, duobus locis deligendæ, intercidendæq; sunt, ut in se ipsæ coeant: et nihilominus ora præclusa habeant. ubi ne id quidem res patitur: possunt ferro candenti aduri. Sed etiam satis multo sanguine effuso ex eo loco, quo neq; nervus, neq; musculus est, ut puta in fronte, uel superiore capitis parte. commodissimum tamen est cucurbitulam admonere à diuersa parte, ut illuc sanguinis cursus reuocetur.

*Curationes aduersus vulnorum inflammationem.*

**T** aduersus profusionem quidem in his auxilium est. Aduersus inflammationem autem in ipso sanguinis cursu ea timeri possunt, ubi læsum ē uel os, uel nervus, uel cartilago, uel musculus: aut ubi parum sanguinis pro modo uulneris fluxit. Ergo quotiens quid tale erit, sanguinem mature suppressere non oportebit: sed pati fluere dum tutum erit: adeo ut si parum fluxisse uidebitur: mitti quoq; ex brachio debeat, utiq; si corpus iuuenile, & robustum, & exercitatum est: multoq; magis si id vulnus ebrietas præcessit. Quod si musculus læsus uidebitur, præcidendus erit. Nam percussus mortiferus est: præcisus sanitatem recipit.

*De glutinatione vulnorum.*

**A**nguinē autem uel suppresso, si nimis erumpit: uel exhausto, si per se parum fluxit: longe optimum est, vulnus glutinari. Potest autem id uel quod in cute uel etiam in carne est: si nihil ei præterea mali accedit. Potest atro alia parte dependens, alia inherens: si tamen etiam nunc integra est, & coniunctione corporis fouetur. In his uero quæ glutinantur duplex curatio est. Nam si plagæ in molli parte, sui debet: maximeq; si discessa auris ima est: uel immus nasus, uel frons, uel buccæ, uel palpebra, uel labrum, uel circa



guttur cutis, uel uenter. si uero in carne uulnus est, hiatq; neq; in unū oræ facile attrahuntur: futura quidem aliena est. Imponendæ uero fibulæ sunt, ἀντὶρρῶες græci nominant: quæ oras, paulum tamen contrahunt: quo minus lata postea ciatrix sit. Ex his autem colligi potest, id quoq; quod alia parte dependens, alia inhaerebit: si alienatum adhuc non est: futuram, an fibulam postulet. Ex quibus neutra ante debet imponi, quàm intus uulnus purgatum est: ne quid ibi concreti sanguinis relinquatur. Id enim & in pus uertitur: & inflammationem mouet: & glutinari uulnus prohibet. ne linamentum quidē, quod supprimendi sanguinis causa inditum est: inibi relinquendum est. nam id quoq; inflammat. Compræhendi uero futura, uel fibula non cutem tantum, sed aliquid etiam ex carne: ubi suberit hæc, oportebit quo ualentius hæreat, neq; cutem abrumpat. Vtraq; optima est ex acia molli non nimis torta, quo mitius corpori insadat. Vtraque neq; nimis rara, neq; nimis crebra inicienda est. Si nimis rara est, nō continet: si nimis crebra est, uehementer affiat: quia quo sæpius acus corpus transit, quoq; plura loca iniectum uinculum mordet, eo maiore inflammationes oriuntur: magisq; æstate. neutra etiam uim ulam desiderat. sed eatenus utilis est, qua cutis ducentem quasi sua sponte subsequitur. Ferè tamen fibulæ latius uulnus esse patiuntur. Sutura oras iungit: quæ ne ipsæ quidem inter se contingere ex toto debent: ut si quid intus humoris concreuerit, sit qua emanet. Si quod uulnus neutrum horum recipit, id tamen purgari debet: deinde omni uulneri primo imponenda est spongia ex aceto expressa. si sustinere aliquis aceti uim non potest: uino utendum est. Leuis plaga immatur etiam si ex aqua frigida expressa spongia imponitur. sed ea, quocumq; modo imposita est: dum madet, prodest. itaq; ut inarescat, non est committendum. Licetq; sine peregrinis, & conquisitis, & compositis medicamentis uulnus curare. sed si quis huic parum confidit, imponere medicamentum debet: quod sine seuo compositum sit ex his, quæ cruentis uulneribus apta esse proposui. Maximèq; si caro est: barbarum: si nerui, uel cartilago, uel aliquid ex eminentibus, quales aures, uel labra sunt, polybi sphragidem. Alexandrinum quoq; uiri de neruis idoneum est: eminentibusq; partibus ea, quam græci πόλινον οὐρ uocant. Solet etiam collo corpore exigua parte findi cutis. quod ubi incidit, non alienum est, scalpello latius aperire: nisi muscoli, neruiq; iuxta sint: quos incidi non expedit. ubi satis deductum est, medicamentum imponendum est. At si id quod collosum est, quanuis parum diductum est: latius tamen aperiri propter neruos, aut musculos non licet: adhibenda sunt ea, quæ humorem leniter extrahant, præ

capueq; ex his id quod *ῥωδης* vocari proposui. Non alienum est etiam ubiunq; *vulnus* graue est, impositum, quo id iuuetur, in super circundare lanam succidam ex aceto, & oleo: uel *cataplasma*, si mollis is locus est, quod leniter reprimat. Si *neruosus*, aut *musculosus*: quod emolliat.

Quomodo *vulnus* ligari conueniat.

*f* *Ascia* uero ad *vulnus* deligandum *lindea* aptissima est: eaq; lata esse debet, ut semel iniecta non *vulnus* tantum, sed partem utrinq; etiam oras eius comprehendat. Si ab altera parte caro magis recessit, ab ea melius attrahitur. Si aeq; ab utraq; transuersa comprehendere oras debet: aut si id *vulneris* ratio non patitur: media primum iniicienda est, ut tum in utraq; partem ducatur. sic autem deliganda est: ut & contineat, neq; astringat. quod non continetur, elabatur. quod nimis astrictum est, cancro periclitatur. Hyeme saepius *fascia* circuire debet: aestate quotiens necesse est: tum extrema pars eius inferioribus acu assuenda est. nam nodus *vulnus* laedit: nisi tamen longe est. illo neminem decipi decet, ut propriam uiscerum curationem requirat: de quibus supra posui. Nam *plaga* ipsa curanda extrinsecus uel *sutura*, uel alio *medicinae* genere est. In uisceribus nihil mouendum est: nisi aut si quid ex iocinere, aut liene, aut pulmone dumtaxat extremo dependeat: praecidatur. alioquin *vulnus* interius ea uictus ratio, eaq; *medicamenta* sanabunt: quae cuiq; uisceri conuenire superiore libro proposui.

De ratione uictus, & notis *vulnerum*, curationibusq; eorum.

*h* Is ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est: uq; si graue *vulnus* est: abstinere quantum uires patiuntur ante inflammationē a cibo debet. bibere donec sitim finiat aquā calidam. uel si aestas est, neq; febris, neq; dolor est: et frigidam. adeo tamen nihil perpetuum est. sed semper pro uiribus corporis aestimandum ut imbecillitas etiam cibum protinus facere necessarium possit: tenuem scilicet & exiguum, qui tantum sustineat. Multiq; etiam ex profluvio sanguinis inter morientes ante ullam curationem uino reficiendi sunt: quod alioquin inimicissimum *vulneri* est. nimis uero intumescere *vulnus*, periculosum: nihil intumescere: periculosissimum est. illud inditum est magnae inflammationis: hoc emortui corporis. Protinusq; si mens homini consistit: si nulla febris accessit: scire licet mature *vulnus* sanum fore. Ac ne febris quidem terrere debet,

si in magno vulnere, dum inflammatio est: permanet. Illa perniti-  
sa est, quæ vel leui vulnere superuenit: vel ultra tempus inflammatio-  
nis durat: vel delirium mouet: vel si nervorū rigor, aut distentio, quæ  
ex vulnere orta est: eam non finit. Vomitus quoq; biliosus non uolun-  
tarius, vel protinus ut percussus est aliquis, vel dum inflammatio ma-  
net, malum signum est, in his duntaxat, quorum vel nervi vel etiam  
nervosi loci vulnerati sunt. Spōte tamen uomere non alienum est, præ-  
cipue his, quibus in consuetudine fuit: sed neq; protinus post cibum, neq;  
iam inflammatione orta: neq; cum in superioribus partibus plaga est.  
Biduo sic vulnere habito, tertio die id aperiendum, detergendaq; sa-  
nies ex aqua frigida est: eademq; rursus iniicienda sunt. Quinto iam  
die quanta inflammatio futura est, se ostendit. Quo die rursus detecto  
vulnere considerandus color est. Quod si liuidus, aut pallidus, aut va-  
rius, aut niger est: scire licet malum vulnus esse. idq; quandoq; ani-  
ma duersum est terrere nos potest. album, aut rubicundum esse ulcus,  
commodissimum est. Item cutis dura, crassa, dolens, periculū ostendit.  
bona signa sunt ubi hæc sine dolore tenuis & mollis est. Sed si gluti-  
natur vulnus, aut leniter intumuit, eadem sunt imponenda, quæ pri-  
mo fuerunt. Si grauis inflāmatio est, neq; glutinādis spes est, ea quæ pus  
moueant: aquæ quoq; calidæ necessarius usus est, ut & materiam dige-  
rat: & duritiā emolliat: & pus citet. Ea sic temperanda est, ut &  
manu contingenti iocunda sit: usq; eo adhibenda, donec aliquid ex tu-  
more minuisse, coloremq; ulceri magis naturalem reddidisse videatur:  
maximèq; si grande vulnus est, *τετραπλόον*: si in articulis, digitis,  
locis cartilaginosis *πρωδεις*. Post id fomentum si lata plaga non pa-  
tet: imponi protinus emplastrum debet: & si latius hiat, illud empla-  
strum liquari ex irino unguento oportet: eoq; illita linamenta disponi  
per plagam: deinde emplastrum supra dari, & super id succadam la-  
nam: minusq; etiam, quàm primo fossicæ astringendæ sunt.

#### Curationes propriæ articulorum.

Propriæ quædam in articulis uisenda sunt: in quibus si præ-  
cipi nervi sunt, qui continebant: debilitas eius partis sequitur.  
Si id dubium est: & ex acuto telo plaga est: ea transversa  
commodior est. Si retuso & graui est, nullum in figura discrimen est.  
At uisendum est pus supra articulum, an infra nascatur. Si sub eo na-  
scitur: albumq; & crassum diu fertur: nervum præcisum esse credibi-  
le est. Magis quoq; maiores dolores, inflammationesq; quo maturius  
excitatæ sunt. Quauis autem non alscissus nervus est: tamen si cir-  
ca tumor durus diu permanet: necesse est & diuturnum ulcus esse:



Et sano quoq; eo tumorem permanere: futurumq; est, ut tarde membrum id extendatur uel contrahatur. Maior tamen in extendendo mora est, ubi recuruato articulo curatio adhibita est, quam in recuruando eo, quod rectum continuerimus. Colligari quoq; membrum: quod ictum est ratione certa debet. Si glutinandum est, ut superius sit: si in inflammatione est: ut in neutram partem inclinatum sit. Si iam pus profluit, ut deuexum sit. Optimum etiam medicamentum quies est: moveri et ambulare nisi sanis alienum est. Minus tamen his est periculosum, qui in capite uel brachijs, quam qui inferioribus partibus uulnerati sunt. Minimèq; ambulatio conuenit: foemine, aut crure, aut pede laborante. Locus in quo cubabit, tepidus esse debet. Balneum quoq; dum parum uulnus purum est: inter res infestissimas est. Nam id et humidum et sordidum reddit: ex quibus ad cancerum transitus esse consuevit. Lenis frictio recte adhibetur, sed his partibus, quæ longius absunt à uulnere.

Vulnus quomodo purgandum est.

i Inflammatione finita, uulnus purgandum est. Id optime faciunt tincta in mell linamenta, supraq; id, emplastrum, uel *ερεαπαρμακον* dandum est. Tum demum uero purum uulnus est: cum rubet, ac nimium neq; siccum neq; humidum est, ac quodcumq; sensu atret, quod non naturaliter sentit, quod nimium aut aridum, aut humidum est. Quod aut pallidum, aut albidum, aut lividum, aut nigrum est: id purum non est.

Quomodo uulnus implendum est.

p Vrgato, sequitur ut impleatur, iamq; calida aqua eatenus necessaria est, ut sanies remoueat. Lance succidæ supernacius usus est. Lota melius circumdatur. Ad implendum autem uulnus proficiunt quidem etiam medicamenta aliqua. Itaq; ea adhiberi non alienum est, ut butyrum cum rosa: exigua mellis parte, aut cum eadem parte, aut cum eadem rosa *τεροαπαρμακον*, aut ex rosâ linamenta. Plus tamen proficit balneum rarum. Cibi boni succi, uitatis omnibus acribus, sed iam plenioribus. Nam et auis, et uenatio, et suilla elixa dari potest. Vinum omnibus dum febris, dum inflammatio est, alienum est. Itemq; usq; ad cicatricem, si nervi, musculi uel uulnerati sunt, etiam si alte caro, aut si plaga in summa cute generis tutioris est: potest non peruectus, modice tamen datum ad implendum quoq; proficere. si quid molliendum est: quod in nervosis locis musculosisq; necessarium est: cerato quoq; super uulnus utendum est. At si caro supercreuit, modice reprimi: si autem linamentum, uehementius squama æris. si plus est quod tolli opus est: adhibenda sunt etiam uehementio-

percreuit, modice reprimat: sicut linamentum, uehementius squamis aeris. Si plus est quod tolli opus est, adhibenda sunt etiamnum uehementiora, quæ corpus exedunt. Cicatricem post omnia hæc commode inducit lycum ex passò, aut lacte dilutum, uel etiam per se impostum sicut linamentum.

De uulneribus: quæ exiisecus per uulnera incidunt, curationibusq; eorū.

h I cordo felicitas curationis est. Sed quædam tamen periculosa incidere consueverunt. Interdum enim uetus ulcus occupat, induciturq; ei callus, & circum oræ crassæ liuent. post quæ quicquid medicamentorū ingeritur, parum proficiat, quod ferè negligenter curato ulceri superuenit. Interdum uel ex nimia inflammatione, uel ob æstus immodicos, uel ob nimia frigora, uel quia nimis uulnus astrictū est, uel quia corpus aut senile, aut mali habitus est cancer occupat. Id genus à græcis diductum in species est, nostris uocabulis non est. Omnis autem cancer non solum id corrumpit: quod occupauit, sed etiam serpit: deinde alijs, alijsq; signis decernitur. Nam modo super inflammationem rubor ulcus ambit. isq; cum dolore procedit. ἐπιστῆναι græci nominant. Modo ulcus nigrum est: quia caro eius corrupta est. Idq; uehementius etiam putrescendo intenditur. Vbi uulnus humidum est, & ex nigro ulcere humor pallidus fertur, maliq; odoris est, caruncula corrupta, interdum etiam nerui ac membranae resoluuntur, specillumq; demissum descendit, aut in latus, aut deorsum, &eq; uittio nonnunq; os quoq; afficitur. modo oritur ea: quàm græci γάγγραινα appellant. Priores in qualibet parte corporis fiunt. Hoc in prominentibus membris idest inter ungues & alas, uel inguina, ferèq; in senibus, uel his, quorū corpus mali habitus est. Caro in ulcere uel nigra, uel liuida est: sed siccæ & arida, proximaq; cutis plerumq; sub nigris pusulis impletur, deinde ei proxima uel pallida, uel liuida, ferèq; rugosa sine sensu est. Vltior in inflammatione est, omniaq; ea simul serpunt, Vlcus: in locum pusulæsum. Pusula: in eum, qui pallet aut liuet. Pallor aut liuor: in id quod inflammatum est. Inflammatio: in id quod integrum est, transit. Inter hæc deinde febris acuta oritur, ingensq; sitis. quibusdam etiam delirium accedit. alij quauis mentis suæ cōpotes sunt, balbutiendo tamen uix sensus suos explicant. Incipit affici stomachus. Fit foedi spiritus ipse odoris. Atq; initium eius quidem mali recipit curationem. Vbi uero penitus insedit, insanabile est. plurimiq; sub frigido sudore moriuntur.

Curatio ulceris.

a C pericula quidem uulnerum hæc sunt. Vetus autem ulcus scalpello conijciendum est, excidendaq; eius oræ, & quicq;

quid super eas liuet, æque incidendum. si varicula intus est: quæ his sanari prohibet, ea quoq; excidenda. Deinde ubi sanguis emissus, nouumq; vulnus est, eadem curatio adhibenda: quæ in recentibus vulneribus exposita est. Si scalpello aliquis uti non vult: potest sanare id emplastrum: quod ex ladano fit, & cum ulcus sub eo exesum est: id, quo cicatrix inducitur.

#### Curatio erysipelarum.

i D autem quod ἐρυσιπέλας vocari dixi: non solum vulneri si peruenire: sed sine hoc quoq; oriri consuevit: atq; interdum periculum maius affert: utiq; si circa ceruices aut caput constitit. Oportet si vires patiuntur sanguinem mittere: deinde imponere simul reprimentia & refrigerantia, maximeq; cerussam solani succo: aut amoliam cretam aqua pluviali exceptam, aut ex eadem aqua subactam farinam cupresso adiecta, aut si tenerius corpus est: lentikulam. Quicquid impositum est: betæ folio contegendum est, & super linteolum frigida aqua madens imponendum. Si per se refrigerantia parum proderunt, miscenda erunt hoc modo. sulphuris. P. XI. cerussæ & croci, singulorum. P. XII. eaq; cum uino conterenda sunt, & id his illinendum: aut si durior locus est, solani folia contrita suillæ adipi miscenda sunt, & illita linteolo super iniicienda. At si nigrities est: neq; dum serpit: imponenda sunt, quæ carnem putrem lenius exedunt: repurgatumq; ulcus sic, ut cætera nutriendum est. Si magis putre est: iamq; proædit ac serpit: opus est uehementius erodentibus. Si hæc quidem euincunt, aduri locus debet, donec ex eo nullus humor feratur: nam quod sanum est: sciatum est cum aduritur: post unctionem putris ulceris superponenda sunt, quæ crustas à uino resoluant, eas ῥοαῖ παρὰ γράκι vocant. ubi exciderunt, purgandum ulcus maxime melle et resina ust. sed alijs quoq; purgari potest: quibus purulenta curantur, eodemq; modo ad sanitatem perducendum est.

#### Curatio Gangrenæ.

g Angrenam nero si nondum planè tenet, sed adhuc incipit: curare non difficillimum est, utiq; in corpore iuuenili, et magis etiam si masculi integri sunt: si nervi uel læsi non sunt: uel leuiter affecti sunt: neq; ullus magnus articulus nudatus est: aut carnis in eo loco paulum est: ideoq; non multum, quod putresceret, fuit, consistitq; eo loco vitium quod maxime fieri in digito potest. In eiusmodi casu primum est, si vires patiuntur, sanguinem mittere. Deinde quicquid aridum est & intentione quadam proximum quoque locum male habet: usque eo sanum corpus conadere.



Medicamenta uero, dum malum serpit, adhibenda nulla sunt: quæ prius mouere consuerunt. ideoq; ne aqua quidem calida. Grauius quoque: quanuis reprimentia, aliena sunt. Sed his quàm leuissimis opus est. si perq; ea, quæ inflāmata sunt: utendum est refrigerantibus. Si nihilo magis malum constitit, uri id quod est inter integrū ac uitiatum locum debet. Præcipueq; in hoc casu petendū non à medicamentis solum, sed etiam à uictus ratione præsidium est. Neq; enim id malum nisi corrupti uitiosiq; corporis est. Ergo primo, nisi imbecillitas prohibet, abstinentia utendum. Deinde danda quæ per cibum potionemq; aluum: ideoq; etiam corpus astringant, sed ea leuia. Postea si uitium constitit: imponi super uulnus eadem debent: quæ in putri ulcere præscripta sunt. Ac tum quoq; plenioribus cibis uti licebit ex media materia, sic tamen non nisi aluum corpusq; sitiantibus. aqua uero pluuiali frigida. balneum nisi iam certa fiducia redditæ sanitatis est, alienum est, si quidem emollitum in eo uulnus cito rursus eodem malo afficitur. Solent uero nonnunq; nihil omnia auxilia proficere, ac nihilo minus serpere his cancer. Inter quæ miserum sed unicum auxilium est, ut cætera pars corporis tuta sit, membrum quod paulatim emoritur, abscedere. Hæ grauissimorum uulnorum curationes sunt. Sed ne illa quidem negligenda, ubi integra cute interior pars collisa est, aut ubi dera sum, ac tritum uel aliquid est, aut ubi surculus corpori infixus est, aut ubi tenue, sed altum uulnus infedit. In primo casu commodissimum est malicorium ex uino coquere, interioremq; eius partem contere, & cerato miscere ex rosa facto, idq; supponere. deinde ubi cutis ipsa exasperata est, inducere lene medicamentum. quale λιπαρόν est. Dera so uero detritumq; imponendum est emplastrum τετραπόλεμον, minus endusq; cibis, & uinum subtrahendum. Neq; id: quia non habebit altiores ictus, contemnendum erit. Si quidem ex eiusmodi casibus sæpe canceri fiunt. Quod si leuius id erit, & in parte exigua, contenti esse poterimus eodem leni medicamento. Surculum uero, si fieri potest, oportet uel manu, uel etiam ferramento eicere. Si uel præfractus est, uel altius descendit: quàm ut ita fieri possit, medicamento euocandus est. Optime autem educit super imposta arundinis radix, si tenera est, protinus contrita, si iam durior, ante in mulso decocta. Cui semper mel adijciendum est, aut aristolochia cum eodē melle. Perissima ex surculis arundo est, quia aspera est. Eademq; offensa etiam in filicis ha stula est. Sed usu cognitum est utranq; aduersus alteram medicamentum esse. si contrita super imposta est. Facit autem idem in omnibus surculis quodcumq; medicamentum extrahedi uim habet. Idem altis tenuibusq; uulneribus aptissimum est. Priori rei Philocratis huic He-

cati emplastrum maxime conuenit.

Quo modo cicatrix uulneri inducenda, purgandaq; sit.

Bi uero in quolibet uulnere uentum ad inducendum cicatricem est: quod perpurgetis iam repletisq; ulceribus necessarium est: primum ex aqua frigida linamentum, dum caro alitur, deinde cum iam continenda est: sicutum imponendum est, donec cicatrix inducatur. Tum deligari super album plumbum oportet: quo & reprimatur cicatrix, et colorem maxime sano corpori similem accipit. Idem radix siluestris cucumeris præstat. Idem compositio, quæ habet elaterij. P. XI. spumæ argenti. P. XII. unguenti pond. XIII. Quæ excipiuntur resina terebinthina: donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat. Ac nigras quoq; cicatrices leniter purgât paribus portionibus mixta, ærugo, plumbum elotum, eademq; rosa cotta, siue ungatur cicatrix: quod in facie fieri potest: siue id ut emplastrum imponitur: quod in alijs partibus commodius est. At si uel excreuit cicatrix, uel concava est, stultum est decoris causa rursus & dolorem, & medicinam sustinere. Alioqui res utriq; suaurri patitur: si quidem utraq; cicatrix exulcerari scalpello potest. si medicamentum aliquis manuunt: idem efficiunt compositiones hæ: quæ corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnem exedentia medicamenta coniicienda sunt. Super concavam, implentia: donec utrumq; ulcus sanæ cuti æquetur, & tum cicatrix inducatur.

De uulneribus quæ per morsus inferuntur, eorumq; curationibus. Caput XXVII.

Idi de his uulneribus, quæ maxime p tela inferuntur. Sequitur ut de his dicam, quæ morfu fiunt, interdû hominis, interdum simiæ, sæpe canis, nonnunquam ferorum animalium, aut serpentium. Omnis autem ferè morsus habet quoddam uirus. Itaq; si uehemens uulnus est: cucurbitula admouenda est. Si leuius: protinus emplastrum iniiciendum, præcipueq; Diogenis. si id non est, quodlibet ex his, quæ aduersus morsus proposui. si ea non sunt. uiride alexandrinum. si ne id quidem est, quodlibet non pingue ex his quæ recentibus uulneribus accomodantur. Sal quoque his, præcipueq; ei, quod canis fecit, medicamentum est: si manus uulneri impositum r, superq; id duobus digitis uerberatur (Exsaniet enim) ac salsamen tum quoq; recte super id uulnus deligatur.

Aurelij Cor.

l

Tiq; autem si rabiosus canis fuit, cucurbitula uirus eius ex-  
 trahendum est. deinde si locus neq; nervosus, neq; musculo-  
 sus est, uulnus id adurendum est. si uri non potest, sanguinē  
 homini mitti non alienum est. tum usto quidem uulnere super im-  
 ponenda, quæ cæteris istis sunt. ei uero quod expertum ignem nō est,  
 ea medicamenta, quæ uehementer exedunt. post quæ nullo nouo ma-  
 gisterio, sed iam supra posito, ulcus erit implendum: & ad sanitatem  
 perducendum. Quidam post rabiosi canis morsum protinus in bal-  
 neum mittunt: ubiq; patiuntur desudare, dum uires corporis sinunt  
 ulcere adaperto: quo magis ex eo quoq; uirus desillet. deinde multo  
 meraciq; uino excipiunt. quod omnibus uenenis contrarium est: idq;  
 cum ita per triduum factum est, tutus esse homo à periculo uidetur.  
 Solet autem ex eo uulnere, ubi parum occursus est, aquæ timor nasci.  
 ὀφὸς ὀφός græci appellant. Miserrimum genus morbi. in quo simul  
 æger & siti, & aquæ metu cruciatur. quo oppressis in angusto spes  
 est. Sed unicum tamen remedium est: nec opinantem in piscinam non  
 ante ei prouisam proijcere. Et si natandi scientiam non habet modo  
 mersum bibere pati, modo attollere. Si habet, interdum deprimere, ut  
 inuitus quoq; aqua satietur. sic enim simul & sitis, & aquæ metus  
 tollitur. Sed aliud periculum excipit: ne infirmum corpus in aqua fri-  
 gida uexatum, nervorum distentio absumat. Id ne incidat, à piscina  
 protinus in oleum calidum demittendus est. Antidotum autem præci-  
 pue id quod primo loco posui. ubi id non est, aliud si nondum æger  
 aquam horret, potui ex aqua dandum est: & si amaritudine offen-  
 ditur: mel adijciendum est. Et si iam is morbus occupauit: per catapo-  
 tia sumi potest.

Curationes communes aduersus omnes morsus serpentium.

Serpentium quoq; morsus non nimium distantem curatio-  
 nem desiderant: quantum in ea multum antiqui uariarunt,  
 ut in singula genera anguium singula medēdi genera præ-  
 ciperent: atq; alijs alia. sed in omnibus eadem maxime proficiunt.  
 Igitur in primis super uulnus id membrum deligandum est: non ta-  
 men nimium uehementer, ne torpeat. Dein uenenum extrahendū est.  
 id cucurbitula optime facit. Neq; alienū est ante scalpello circa uul-  
 nus incidere: quo plus uitiat i iam sanguinis extrahatur. Si cucurbi-  
 tula non est: quod tamen uix incidere potest: tum quodlibet simile uas  
 quod idem possit. Si ne id quidem est, homo adhibendus est, qui uul-  
 nus eo figat.



nus exsugāt. Neq; hercules scientiam præcipuam habent hi qui psilli nominantur: sed audaciam usu ipso confirmatam. Nam uenenum serpentis, ut quædam etiā uenatoria uenena, quibus galli præcipue utuntur: non gustu, sed in ulnere nocent. Ideoq; colubra ipsa tuto estur: ictus eius occidit: & si stupente ea, quod per quædam medicamenta circulatores faciunt: in os digitum quis indidit: neq; percussus est: nulla in ea salina noxa est. Ergo quisquis exemplum psilli secutus id uulnus exsuxerit, & ipse tutus erit: & tutum hominem præstabit. Illud ne intereat, ante debet attendere: ne quod in gingiuis, palato'ue, alia'ue parte oris ulcus habeat. Post hæc is homo loco calido collocandus est sic, ut id, quod percussum erit, in inferiorem partem inclinetur. Si neq; qui exsugāt: neq; cucurbitula est: sorbere oportet ius anserinum, uel ouillum, uel uitulinum, & uomere. Vinum autem gallicum pullum per medium diuidere: & protinus calidum super uulnus imponere sic, ut pars interior corpori iungatur. Facit id etiā hædus, agnus'ue discissus, & calida eius caro statim super uulnus imposita. emplastra quoq; quæ supra comprehensa sunt. Aptissimumq; est uel ephesium, uel id quod ei subiectum est. præsensq; in aliquo antidoto præsidium est. Sin id non est: necessarium est exsorbere portionem meri uini cum pipere, uel quidlibet aliud, quo calor mouendus est: ne humore intus coire patiatur. Nam maxima pars uenenorum frigore interimit. Omnia etiā urinam mouentia, quia materiam extenuant: utilia sunt.

Speciales curationes aduersus ictus serpentium,

& primo aduersus ictum Aspidis.

**h** Acc aduersus oēs ictus cōmunia sunt. Vnus tamen ipse docuit, eum, quē aspis percussit: acetum potius bibere debere.

Quod demonstrasse dicitur casus cuiusdam pueri: qui cum ab hac ictus esset: et partim ob ipsum uulnus, partim ob immodicos æstus siti premeretur: ac locis siccis alium humorem nō reperiret: acetum, quod forte secum habebat, ebibit: & liberatus est. Credo qm id, quantum refrigerandi nimis habet, tamen habet etiā dissipandi. Quo fit ut terra respersa eo, spumet. Eadem ergo uicinerisimile est, spississimam quoq; intus humorem hominis ab eo disciti: & sic dari sanitatē.

Aduersus ictum scorpionis.

**i** N quibusdam etiam alijs serpentibus certa quædā auxilia satī nota sunt. Nam scorpio sibi ipse pulcherrimū medicamentum est. Quidam contritum cum uino bibunt: quidam eodē modo contritum super uulnus imponunt: quidā super prunā

eo imposito vulnus suffumigant undiq; ueste circumdata, ne is fumus dilabatur: tum carbonem eius, super vulnus deligant. Bibere autem oportet herbe solaris, quam ἡλιοτρόπιον græci uocant: semen, uel certe folia ex uino. Super vulnus uero etiam fursures ex aceto, uel ruta siluatica recte imponitur, uel cum melle sal tostus. Cognoui tamen medicos, qui ab scorpione ictis nihil aliud, quàm ex brachio sanguinem miserunt.

**Aduersus aranei & scorpionis ictum.**

**c** T ad scorpionis autem & ad aranei ictum allium cum ruta recte miscetur, ex oleoq; contritum super imponitur.

**Aduersus Ceraſtis, & Dipsæ, & Hæmorrhoidis ictum.**

**a** T si Ceraſtes, aut Dipsas, aut Hæmorrhoids percussit: catapotium, quod ægyptiæ fabæ magnitudinem æquet, arefactum in duas potiones diuidendū est sic, ut ei rutæ paulum adiiciatur. Trifolium quoq; & mentastrum, & cum aceto panaces æque proficiunt. Costumq; & casia, et cinnamomū recte per potionem assimuntur.

**Aduersus Chersydri ictum & cerasſtis.**

**a** Duerſus Chersydri uero ictum, panacis, aut laser, quod sit scrupulorum. IIIS. XI. uel porri suauis cum hemina uini sumendus est, et edenda multa satureia. Imponendum autē super vulnus stercus caprinum ex aceto coctum, aut ex eodem hordeacea farina, aut ruta, uel nepeta cum sale contrita melle adiecto. Quod in eo quoq; ulnere, quod cerasſtes fecit, æq; ualet.

**Aduersus Phalangij ictum.**

**u** Bi uero phalangium nocuit, præter eam curationem, qua manu redditur, sæpe homo demittendus in solium est, dandusq; ei myrrhæ & uicæ taminie par modus ex passi hemina: uel radiculæ semen, aut lolij radix ex uino, & super vulnus fursures ex aceto coctæ: imperandumq; ut is conquiescat.

**Aduersus ictus italorū anguinū, qui minus terribiles peregrinis sunt.**

**u** Erum hæc genera serpentium & peregrina, & aliquanto magis pestifera sunt, maximèq; æstuosos locis gignuntur. Italia, frigidioresq; regiones hac quoq; parte salubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. Aduersus quos satis proficit

herba betonica, uel cantabrica, uel centaurion, uel agrimonia, uel trixago, uel personina, uel marinae pastinacæ singulæ, binæ uel tritæ et cum uino potui datæ: & super uulnus impositæ. Illud ignorari nõ oportet, ois serpentis ictum & ieiuni, & ieiuno magis nocere. Ideoq; perniciosissimæ sunt, cum incubant. Vtilissimumq; est, ubi ex anguib; metus est, non ante progredi, quàm quid aliquis assumpsit.

Remedium generale aduersus omnia uenena, uel cibo,  
uel in potione assumpta.

n On tam facile his opitulari est, qui uenenum, uel in cibo, uel  
in potione sumpserunt. Primum, quia non protinus sentiunt,  
ut ab angue icti, ita ne succurrere quidem statim sibi pos-  
sunt. Deinde, quia noxa non à cute, sed ab interioribus partibus inci-  
pit. Commodissimum est tamen ubi primum sensit aliquis, protinus  
oleo multo epoto uomere. Deinde, ubi præcordia exhaustit, bibere an-  
tidotum. si id non est, uel merum uinum.

specialia remedia aduersus quædam uenena, & primo  
aduersus cantharidas.

s Vnt tamen quædã remedia propria aduersus quædam uene-  
na, maximeq; leuiora. Nam si cantharidas aliquis ebibit: pa-  
nace cū lacte cōtusa, uel galbano, uino adiecto dari, uel lac p se debet.

Aduersus acutam.

s I acutã: uinum merum calidum cum ruta quamplurimum  
ingerendum est: deinde is uomere cogendus. posteaq; laser  
ex uino dandum. Isq; si febre uacat: in calidum balneum  
mittendus. Si non uacat: ungendus ex calefacientibus est. post quæ  
quies ei necessaria est.

Aduersus hyoscyamum.

s I hyoscyamum: feruens mulsum bibendum est: aut quodlibet  
lac, maxime tamen asinum.

Aduersus cerussam.

s I cerussam: ius maluæ, uel ius glandis ex uino contritæ maxi-  
me profunt.

Aduersus sanguisugam si epota est: & lac quod intus cõit.

s I sanguisuga epota est, acetum cum sale bibendum est. si lac in-  
tus cõit, aut passum, aut coagulum, aut cum aceto laser.

Aurelij Cor.

l iij



## LIBER

### Aduersus fungos inutiles.

**S** I fungos inutiles quis assumpserit, radícula aut epota, aut cum sale & aceto edenda est. Ipsi uero hi & specie quidem discerni possunt ab utilibus, & cocturæ genere idonei fieri. Nam siue ex oleo inferuerūt, siue piri surculus cum his inferuit, omni noxa uacant.

De adustis corporis locis, & quomodo curari debeant.

**A** DUSTIS quoq; locis extrinsecus uis infertur. Itaq; sequi uidetur, ut de his dicam. Hæc autem optime curantur folijs, aut lilij, aut linguae caninæ, aut betæ in uetere uino, oleoq; decoctis. Quorum quidlibet protinus impositum ad sanitatem perducit. Sed diuidi quoq; curatio potest in ea, quæ mediocriter exedentia reprimentiq; primo & pustulas prohibeant, & summam pelliculā exasperent. Deinde ea quæ lenia ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lenticulæ cum melle farina, uel myrrha, uel uino: creta amolia cum thuris cortice contrita & aqua coacta, atq; ubi usus necessitas incidit: aceto diluta. Ex insequentibus quælibet *λίπαρον*. Sed idonea maxime est, quæ uel plumbi recrementum, uel uitellos habet. Est etiā illa adustorum curatio, dum inflammatio est: impositam habere cum melle lenticulam. Vbi ea declinauit, farina cum ruta, uel porro, uel marrubio, donec crustæ cadant. Tum eruū cum melle, aut irim, aut resinam terebinthinam, donec ulcus purum sit. Nouissime si atum linamentum.

De interioribus ulceribus, quæ aliqua corporum parte corrupta nascuntur. Cap. XXVIII.

De carbunculo, & eius curatione.

**A** B his quæ extrinsecus incidunt ad ea ueniendum est, quæ interius corrupta aliqua corporū parte nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo peius. eius hæ notæ sunt. Rubor est: superq; eum non nimium pustulæ eminet: maxime nigræ: interdum subliuidæ, aut pallidæ. In his sanies esse uidetur: infra color niger est. Ipsum corpus aridum & durius quàm naturaliter oportet. Circa quem quasi crusta est: eaq; inflammatione cingitur: neq; in eo loco leuari cutis potest: sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus urget: nonnunquam horror, aut febris oritur: aut utrumq;. Idq; uitium subter actis quasi quibusdam radicibus serpit: interdum celerius, interdum tardius: supra quoq; procedens in albescit: deim liuidum fit, circumq; exiguae pustulæ oriuntur. Et si circa stomachum, fauces ue

incidit, subito spiritum sepe elidit. Nihil melius est, quam protinus adurere. Neq; id graue est (nam non sentit: quoniam ea caro mortua est) finisq; adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde vulnus, sicut cætera adusta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta undiq; à uiua carne diducta, quæ trahit secum quicquid corruptum erat: purusq; iam sinus curari potest implentibus. At si in summa cute uitium est: possunt succurrere quedam uel exedentia tantum, uel etiam adurentia. Vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcumq; uero medicamentum positum est: si satis proficiet, protinus à uiua corruptam partem resoluit. Certaq; esse fiducia potest ferè, ut undiq; uitiosa caro excedat: qua huiusce rei medicamen exest. Si id non fit, medicamentum malo uincitur, utiq; ad uisionem properandum est: sed in eiusmodi casu abstinendum à cibo, à uino est. A quam liberaliter bibere expedit: magisq; ea seruanda sunt, si febricula quoq; accessit.

De caranomate, & eius curatione.

On idem periculum caranoma affert, nisi imprudentia curantis agitatum est. Id uitium fit maxime in superioribus partibus, circa faciem, nares, aures, labra, mammas foeminarum. Et iecore autè, aut splene hoc nascitur. Circa locum, aliqua quasi puncta sentiuntur: isq; immobilis, inæqualis tumet: interdum etiam torpet. Circa eum inflatae uenæ quasi recuruantur: hæq; pallent, aut linent: nonnunquam etiam in quibusdam delitescunt. Tactusq; is locus alijs dolorem affert, in alijs eum non habet. Et nonnunquam si ne ulcere durior aut mollior est, quam esse naturaliter debet: nonnunquam hisdem omnibus ulcus accedit. Interdumq; nullam habet proprietatem, interdum simile his est, quæ uocantur græci κορυμβοματæ: aspredine quadam & magnitudine sua. Colorq; eius ruber est, aut lenticula similis neq; tuto fertur. Nam protinus aut resolutio neruorum, aut distentio insequitur. Sæpe homo ictus obmutescit, atque eius anima deficit. Quibusdam etiam si id ipsum pressum est, quæ circa sunt: intenduntur & intumescunt. Ob quæ pessimum id genus est: ferèq; primum id fit quod κακόνες à græcis nominatur. Deinde ex eo id caranoma quod sine ulcere est. Deinde ulcus ex eo thymum. Tolli nihil nisi κακόνες potest: reliqua curationibus irritantur. Et quo maior uis adhibita est, eo magis quidam uisi sunt medicamentis adurentibus. Quidam ferro adusserunt: quidam scalpello exciderunt. Neque ulli unquam mediana proficit: sed adusta protinus conata sunt & increuerunt, donec occiderent. Exasta etiam post indu-

etiam ciatricem tamen reuenterunt: & causam mortis attulerunt. Cū interim pleriq; nullam vim adhibēdo, qua tollere id malum tentent: sed imponendo tantum lenia medicamenta, quæ quasi blandiātur: quo minus ad ultimam senectutem perueniant, non prohibentur. discernere autem uariōnes quod curationē recipit à carcinomate, quod non recipit: nemo scire potest. sed tempore, & experimento. Ergo ubi primum id uitium notatum est: imponi debēt medicamenta adurentia. si lenatur malum, minuunturq; eius inditia, procedere curatio potest & ad scalpellum, & ad uisionem. Si protinus irritatum est, scire licet iam carcinoma esse: remouendāq; sunt omnia acria, omnia uehementia. Sed si sine ulcere is locus durus est: imponi ficum quā pinguis simam, aut πῦρ δ' es emplastrum satis est. Si ulcus æquale est, ceratū ex rosa iniiciendum est: adiiciendusq; ei puluis ex contrita testa: ex qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est. si id nimium supercreuit: tentanda squama æris est: quæ lenissima ex adurentibus est: eatenus nequid eminere patiatur: sed ita, si nihil exacerbauit. sin minus, eodem cerato contenti esse debemus.

#### De Theriomate, & eius curatione.

St etiam ulcus, quod θηρίωμα græci uocant. Id & per se nascitur: & interdum ulceri ex alia causa factō superuenit: color est uel liuidus, uel niger: odor foedus, multus, & mucī similis humor. Ipsum ulcus neq; tactum, neq; medicamentum sentit: prurigine tantum mouetur. at circa, dolor est, & inflammatio. Interdū etiam febris oritur. Nonnunquam ex ulcere sanguis erumpit. ad id quoq; malum serpit. quæ omnia sepe intenduntur. Fitq; ex his ulcus, quod ἑρπητιὰ θάσιον, ueror græci uocant: quia celeriter serpendo, penetrandoq; usq; ossa, corpus uorat. id ulcus inæquale est, cœno simile: inestq; multus humor glutinosus: odor intollerabilis, maiorq; q̃ pro modo ulceris inflammatio. Vtrunq; sicut omnis cancer, fit maxime in senibus: uel his, quorum corpora mali habitus sunt. Curatio utriusq; eadem est: sed in maiore malo magis necessaria. Ac primum à uictus ratione ordinandus est: ut quiescat in lectulo: ut primis diebus à cibo abstineat: aquā quā plurimam assumat. alius quoq; ei ducatur. deī post inflammationē, cibum boni succi capiat: uitatis omnibus acribus, potionis quantum uolet sic, ut interdū quidem aqua contentus sit. in cœna etiam uini austeri aliquid bibat. non æ que tamen fame in his, quos ἑρπης urget: atq; his qui θηρίωμα adhuc habebūt, utendum erit. & uictus quidem talis necessarius est. Super ulcus uero



inſpergenda arida aloë oenanthe eſt: & ſi parum proficiet, chalcitis. Ac ſi quis neruus exefa carne nudatus eſt: contegendus ante linteolo eſt: ne ſub eo medicamento aduratur. Si ualidioribus etiam num re medijs opus eſt: ad eas compoſitiones ueniendum eſt, quæ uehementius adurunt. Quicquid autem inſpergitur, auerſo ſpecillo inſundi debet. Super danda cum melle ſunt uel linamenta, uel oleæ folia ex uino de cocta, uel marrubium eaq; linteolo contegenda in aqua frigida ma= deſacto, dein bene expreſſo. Circaq; qua tumor ex inflammatione eſt, imponenda quæ reprimant cataplaſmata. Si ſub his nihil proficiatur: ferro locus aduri debet: diligenter neruus, ſi qui apparent: ante contextis. Aduſtum uel medicamentiſ, uel ferro corpus primum purgandū, deinde implendū eſſe: apparere cuilibet ex prioribus poteſt.

### De ſacro igne, & eius curatione.

Acer quoq; ignis malis ulceribus annumerari debet. eius  
 ſ duæ ſpecies ſunt. Alterum eſt ſubrubicundum, aut mixtum  
 rubore, atq; pallore: exaſperatumq; p puſtulas continuas,  
 quarum nulla, altera maior eſt, ſed plurimæ perexiguæ. In his ſem  
 per ſerè pus, & ſæpe rubor cum calore eſt: ſerpiťq; id nonnunquam  
 ſaneſcente eo, quod primum uitiatum eſt: nonnunquam etiam exulce  
 rato: ubi ruptis puſtulis ulcus continuatur: humorq; exit: qui eſſe in=  
 ter ſaniem, et pus uideri poteſt. Fit maxime in pectore, aut lateribus,  
 aut eminentibus partibus, præcipueq; in plantis. Alterum autem eſt  
 in ſummæ cutis exulceratione, ſed ſine altitudine, latum, ſubliuidum,  
 inæqualiter tamen, mediumq; ſaneſcť extremis procedentibus: ac ſæ  
 pe id quod iam ſanum uidebitur, iterum exulceratur. At circa pro  
 xima cutis, quæ uitium receptura eſt: tumidior, & durior eſt: colo=  
 remq; habet ex rubro ſubiugrum. Atq; hoc quoq; malo ſerè corpo  
 ra ſeniora tentantur: aut quæ mali habitus ſunt, ſed in cruribus ma  
 xime. Omnis autem ſacer ignis ut minimum periculum habet ex his  
 quæ ſerpunt: ſic propè diffiſillime tollitur. Medicamentum eius for  
 tuitum eſt: uno die febris, quæ humorem noxium abſumat. Cuius  
 quo craſſius, & albidius eſt: eo periculi minus eſt. Prodeſt etiam  
 infra os ulcerum lædi: quo plus purus exeat, & id, quod ibi corru=  
 ptum corpus eſt: extrahat: ſed tamen ſi febricula acceſſit, abſtinentia,  
 lectulo, alui duſtione opus eſt. In omni uero ſacro igni neq; lenibus, et  
 glutinoſis cibis, neq; ſaliſis, & acribus utendum eſt: ſed his quæ inter  
 utrumq; ſunt: qualis eſt panis ſine fermento, piſcťs, hedus, aues, exce  
 ptoq; apro omnis ſerè uenatio. ſi non eſt febricula, & geſtatio utilis

est, & ambulatio, & uinum austerū & balneum. Atq; in hoc quoq; genere potio magis liberalis esse, quā cibis debet. Ipsa autem ulcera si mediocriter serpunt: aqua calida. Si uehementius, uino calido fouenda sunt. Deinde acu pusula quæcūq; sunt aperiendæ. Tum imponenda ea: quæ putrem carnem exedunt. Vbi inflammatio sublata, ulcusq; purgatum est: imponi leue medicamentum debet. In altero autem genere possunt proficere mala cotonea in uino cocta atq; contrita. Potest emplastrum uel Hieræ, uel *τεροαρχμανορ*, cui quinta pars thuris adiecta sit. Potest nigra hederæ ex uino austero cocta. Ac si celeriter malum serpit: non aliud magis proficiat. Purgato ulcere: quod in summa cute esse proposui: satis ad sanitatem eadem lenia medicamenta proficiunt.

De Chironeo ulcere, & eius curatione.

*c* Hironeum autem ulcus appellatur, quod & magnum est, et habet oras duas, collosas, tumentes. Exit sanies non multa, sed tenuis. Odor malus neq; in ulcere, neq; in eius humore est. Nulla inflammatio, dolor modicus est. nihil serpit: ideoq; nullum periculum affert, sed non facile sanescit. Interdum tenuis acatrix inducitur: deinde iterum rumpitur: ulcusq; renouatur. Fit maxime in pedibus & cruribus. Super id imponi debet, quod & lene aliquid, & uehemens, & reprimens habeat. Quale eius rei causa fit ex his. Squamæ æris: plumbi eloti combusti, singulorum. P. XIII. Cadmiæ, ceræ: singulorum. P. XVIII. rosæ quantum satis est ad ceram simul cum eis molliendam.

De ulceribus quæ ex frigore in pedibus & manibus oriuntur, & eorum curationibus.

*le buga*  
*ale. la*  
*fino. fus*  
*nis*  
*f* Iunt etiam ex frigore hiberno ulcera: maxime in pueris, et præcipue pedibus, digitisq; eorum, nonnunq; etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est. Interdum pustula oriuntur, deinde exulceratio. Dolor autem modicus. Prurigo maior est: nonnunquam humor exit: sed non multus, qui referre uel pus, uel saniem uidetur. In primis multa calida aqua fouendum est: in qua rapa decocta, aut si ea non sunt: aliqua uerbenæ ex reprimentibus. Si nondum ad apertum ulcus: æs, q̄ maxime calidum quis pati potest, admouendum est. Si iam exulceratio est: imponi debet alumen æqua portione cum thure contritum, cum uino adiecto: aut malicorium in aqua coctum, deinde contritum. Si summa detracta pellicula est: hic quoq; melius lenia medicamenta proficiunt.

## De struma, &amp; eius curatione.

*S*truma quoq; est tumor, in quo subter concreta quædam ex pure & sanguine quasi glandulæ oriuntur. Quæ uel præcipue fatigare medicos solent: quoniam & febres mouent, nec unquam facile maturescunt, et siue ferro, siue medicamentis curantur. Plerumq; iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoq; post medicamento est opus. Quibus id quoq; accedit: quod longo spatio detinent. Nascuntur maxime in cervice, sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoq; sæminarum se repperisse chirurgus Megethes auctor est. Propter hæc et album ueratrum recte datur: atq; etiam sæpius, donec ea digerantur. Et medicamenta imponuntur: quæ humorem, uel educant, uel dissipent: quorum supra mentio facta est. Adurentibus quoq; quidam utuntur: quæ exedunt: crustaq; eum locum astringunt: tunc uero ut ulcus curant. Quæcunq; autem ratio curandi est: corpus puro ulcere exercendum atq; alendum est: donec ad cicatricem perueniat. Quæ cum medici doceant, quorundã rusticorum experimento cognitum: quem struma male habet, eum: si anguem edit: liberari.

## De furunculo, &amp; eius curatione.

*F*urunculus uero est tuberculum acutum cum inflatione & dolore, maximeq; ubi iam in pus uertit. Qui ubi adaper tus est: & exit, super apparet pars carnis in pus uersa: pars corrupta subalbida, subrubra: quem uentriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiam si nulla curatio adhibeatur. Maturescit enim per se atq; erumpit. Sed dolor efficit, ut potior medicina sit, quæ maturius liberet. Proprium eius medicamentum galbanum est: sed alia quoq; supra comprehensa sunt. Si cetera desunt: imponi debent primum non pingue emplastrum, ut id reprimat: deinde si non repressit: quodlibet puri mouendo accommodatum. Si ne id quidem est, uel resina, uel fermentum. Expresso pure nulla ultra curatio necessaria est.

## De phymate, &amp; eius curatione.

*P*hyma uero nominatur tuberculum furunculo simile: sed rotundius & planius: sæpe etiam maius. Nam furunculus oui dimidij magnitudinem raro explet, nunquam excedit. Phyma etiam latius patere consuevit: sed inflammatio, dolorq; sub eo minores sunt. Vbi emulsum est pus: eodẽ modo, apparet uentriculus:



quod in furunculo non inuenitur. Verum omnis corrupta atro in pus uertitur. Id autem in pueris & sepius nascitur, & facilius tollitur: in inuenibus rarius oritur, & difficilius curatur. Vbi ætas indurauit, ne nascitur quidem. Quibus uero medicamentis discenteretur, supra propositum est.

De phygelo, & eius curatione.

ὕπετρον autem est tumor non altus, latus, in quo quiddam pusulæ simile est. Dolor, distentiōq; uehemens est: & maior quàm pro magnitudine tumoris: interdum etiam febricitans: idq; tarde maturescit, neq; magnopere in pus conuertitur. Fit maxime aut in uertice, aut in alis, aut inguinibus. Panem ad similitudinem figuræ nostri uocant. atq; id ipsum quo medicamento tolleretur, supra demonstrauimus. Sed cum omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius uitium ad suppurationē spectans. Idq; ferè fit aut post febres, aut post dolores partis alicuius: maximèq; eos, qui uentrem infestant. sepiusq; oculis expositum est. siquidem latius aliquid intumescit ad similitudinem eius, quod phyma uocari proposui: rubetq; cum calore, & paulopost etiam cum duritia, magisq; innocenter indolescit: & sitim, uigiliamq; exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute deprehendi potest: maximeq; ubi altius pus mouetur. Sed cum siti, uigiliæq; sentiuntur intus aliqua punctiōnes, & quod desubito durius non est, melius est: & quamuis non rubet: coloris tamen aliter mutati est. quæ signa iam pure oriente nascuntur. Tumor, ruborq; multo ante incipiunt. Sed si locus mollis est, auertendus is materiæ aditus est per cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & refrigerant: qualia et aliàs & pauloante in erysipela proposui. si iam durior est, ad ea ueniendum est, quæ digerant, & re soluant: qualis est ficus arida confusa, aut fex mixta cum cerato, quod ex adipe suilla coactum sit: aut cucumeris radix, cui ex farina duæ partes adiectæ sint, ante ex mulso decoctæ. Licet etiā miscere æquis portionibus ammoniacum, galbanum, propolim, uiscum: pōdusq; adijcere myrrhæ dimidio minus, quàm in prioribus singulis erit. Atque emplastra quoque & malagmata idem efficiunt: quæ supra explicui. Quod per hæc discussum non est, necesse est maturescat: idq; quo celerius fiat, imponenda est farina hordeacea, ex aqua cocta recte miscetur. Eadem autem hæc in minoribus quoque abscessibus, quorum nomina, proprietatesq; supra reddidi, recte fiunt. eademq; omnium curatio. tantum modo distat. Crudum est autem, in quo magis quasi uenarum motus est, & grauitas, & ardor, & distentiō, & dolor, & rubor, & durities. Et si maior abscessus est, horror,

aut etiam febricula permanet, Penitusq; condita suppuratio. si pro his, quæ alibi cutis ostendit, punctiones sunt, ubi ista se remiserunt, iamq; is locus prurit, & aut sublividus, aut subalbidus est: matura suppuratio est: eaq; ubi uel per ipsa medicamenta, uel etiã ferro aperta est: pus debet emitti. Tum si qua in alis uel inguinibus sunt: sine linamento nutrienda sunt. In cæteris quoq; partibus, si una plaga exigua est, si mediocris suppuratio fuit, si non alte penetrauit, si febris non est, si ualet corpus, æq; linamenta supernuacua sunt. In reliquis parce tamen: nec, nisi plaga est, imponi debent. Commode uero uel super linamenta, uel sine his imponitur lenticula ex melle, aut malicorium ex uino coctum. Quæ & per se, & mixta idonea sunt. Si qua circa duriora sunt, ad ea mollienda, uel malua contrita: uel fœni græci, lini uel semen ex passo coctum super dandum est. Quicquid deinde impositum est, non astringi sed modice deligari debet. illo neminẽ deapi decet, ut in hoc genere cerato utatur. Cætera quæ pertinent ad purgandum ulcus, ad implendum, ad cicatricem inducendam: conueniunt, quæ in uulneribus exposita sunt.

#### De fistulis & earum generibus, & curationibus.

Omnumquam autem ex eiusmodi abscessibus, & ex alijs ulcerum generibus fistulæ oriuntur. Id nomen est ulcero alto: angusto: colloso. Fit in omni ferè parte corporis: habetq; quedam in singulis locis propria: prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt. siquidem aliæ breues sunt: aliæ altius penetrant, aliæ rectæ intus feruntur, aliæ multoq; plures transuersæ, aliæ simplices sunt, aliæ duplices, triplices uel ab uno ore intus orisse: quæ tres fiunt, aut etiam in plures sinus diuiduntur: aliæ rectæ: aliæ flexæ, & tortuosæ sunt. Aliæ intra carnem desinunt. Aliæ ad ossa: aut cartilagine[m] penetrant, aut ubi neutrum horum subest: ad interiora perueniunt. Aliæ deinde faciles, aliæ cum difficultate curantur. Atq; etiam quedam insanabiles reperiuntur. Expedita curatio est in fistula simplici, recenti, intra carnem, adiuuatq; ipsum corpus si iuuenile: si firmum est. Inimicæ, contraria his sunt. Itemq; si fistula os uel cartilagine[m], uel neruum, uel musculos læsit: si articulum occipauit: si uel ad uesicam, uel ad pulmone[m], uel ad uulnam, uel ad grandes uenas, arterias uel, uel ad inania, ut guttur, stomachum, thoracem penetrauit. Ad intestina quoq; eam tendere semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit: si corpus uel ægrum, uel senile, uel mali habitus est. Ante omnia autem demitti specillum in fi-

fistulam conuenit: ut quo tendat & quam alte perueniat, scire possi-  
 mus. Simul etiam protinus humida, an siccior sit. quod extracto spe-  
 cillo patet. Si uero os in uicino est, id quod disci potest: si iam nec ne  
 eo fistula penetrarit, quatenus nocuerit. Nam si molle est, quod ulti-  
 mo specillo contingitur: intra carnem adhuc uitum est. Si magis id  
 renititur, ad os uentum est. ibi deinde si labitur specillum, nondum  
 caries est. si non labitur, sed aequali innititur: caries quidem, uerum  
 adhuc leuis est. Si inaequale quoque et asperum subest: uehementius os  
 exesum est. At cartilago ubi subhæsit, ipsa sedes docet: peruenitumque  
 esse ad eam ex renixu patet. Sed ex his quidem colliguntur fistula-  
 rum sedes, spatia, noxæ. Simples uero hæc sint, an in plures partes  
 diducantur: cognosci potest ex modo puris: cuius si plus fertur, quam  
 quod simplici spatio conuenit: plures sinus esse manifestum est. Cumque  
 ferè iuxta sint, caro, & nervus, & aliqua nervosa: quales ferè tunicae,  
 membranæque sunt: genus quoque puris docebit, num plures sinus intus  
 diuersa corporis genera perroserint. si quidem ex carne pus leue, al-  
 bum, copiosius fertur. At ex nervoso loco: coloris quidem eiusdem,  
 sed tenuius, & minus. Ex nervo, pingue & oleo non dissimile. Denique  
 etiam corporis inclinatio docet, num in plures partes fistulae pene-  
 trarint: quia sæpe cum quis aliter decubuit: aliterque membrum collo-  
 cauit: pus ferri, quod iam desierat, iterum incipit: testaturque non solum  
 aliū sinum esse ex quo descendat: sed etiā in aliam corporis partem  
 eum tendere. Sed si & in carne & recens, & simplex est: ac neque  
 rugosa, neque cava sede, neque in articulo, sed in eo membro, quod per se  
 immobile, non nisi cum toto corpore mouetur: satis proficiet empla-  
 strum, quod recentibus uulneribus imponitur: dum habeat uel salē,  
 uel alumen, uel squamā æris, uel æruginem, uel ex metallicis aliquid.  
 exque eo collirium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo ple-  
 nius. idque ea parte qua tenuius est: altera antecedente demitti oportet  
 in fistulam, donec sanguis purus se ostendat. quæ in omnibus fistula-  
 rum collirijs perpetua sunt. idem deinde emplastrum in linteolo su-  
 perimponendum: supraque inijcienda spōgia est in acetiū ante demissa.  
 soluique quinto die satis est. genusque uictus adhibendum est: quo car-  
 nem ali docui. Ac si longus à præcordijs fistula est: ex intervallo icin-  
 num radículas edisse: deinde uomere necessarium est. uetustate callo-  
 sa fit fistula. Callus autem neminem fallit, quia durus est: & aut al-  
 bus, aut pallidus. sed tum ualidioribus medicamentis opus est. Qua-  
 le est, quod habet papaueris larymæ. P. XI. gummi. P. XIII. cadmiae  
 P. XIII. atramenti sutorij. P. XVIII. Ex quibus aqua coactis colliri-  
 um fit. aut in quo sum gallæ. P. XI. æruginis, sandaracæ, aluminis



ægyptij, singulorum .P. XI. atr. amēti sutorij combusti .P. XII. aut quod constat ex chalcitide, & saxo calcis quibus auripigmenti dimidio manus, quàm in singulis prioribus est: adiçatur. eaq; melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex præcepto Megetis, æruginis rase .P. XII. conterere: deinde ammoniac, thymiamatis .P. XII. aceto liquare: eoq; infuso ex ærugine colligere. idq; ex primis medicamentis est. sed ut hæc maximi effectus sunt: sic cui ista non adsunt, facile tamen est callum quibuslibet adurentibus medicamentis proderet: aut quibus hæc maxime in effectu sunt, erodere. Satiusq; est uel papyrū intortum, uel aliquid ex penicillo in modum collirij astrictum eo illinere. scylla quoq; cocta, & mixta cum calce callum exest. si quando uero longior & transuersa fistula est: demisso specillo contra principium huius incidi commodissimum est: & collirium utrunq; demitti. At si duplicem esse fistulam, aut multiplicem existimamus, sic tamen ut breuis, intrāq; carnē sit: collirio uti non debemus: quod unam partem curet: reliquas omittat. sed eadem medicamenta arida in calamentum scriptorium coniicienda sunt: usq; ori fistulæ aptandus: inspirādumq; ut ea medicamenta intus compellantur. aut eadem ex uino liquanda vel si sordidior fistula est, ex mulso: si callosior, ex aceto sunt: atq; intus infundendum quicquid inditum est. superponenda sunt quæ refrigerent, & reprimant. nam ferè quæ circa fistulam sunt, habent aliquid inflammationis. Neq; alienum est ubi quis resoluuerit, anteq̃ rursus alia medicamenta coniçiat: per oricularium clysterem fistulā eluere. si plus purus fertur, uino. si callus durior est, aceto. si iam purgatur, mulso, uel aqua, in qua eruum coctum sit sic, ut huic quoq; mellis paulum adiçatur. Ferè uero fit, ut ea tunica quæ inter ferrumentum, & integram carnem est, uicta medicamentis tota exeat: infraq; ulcus purum sit. quod ubi contigit, imponenda glutinantia sunt: præcipueq; sponsa melle cocto illita. Neq; ignoro multis placuisse linamentum in modum collirij compositum, tinctum melle demitti. sed celerius id glutinatur, quàm impletur. Neq; uerèdum est ne purum corpus puro corpori iunctum, non coeat: adiectis quoq; medicamentis ad id efficiatibus: cum sæpe exulceratio digitorum, nisi magna cura prospeximus: sanescendo in unum eos iungat.

## De melicera.

e St etiam ulceris genus: quod à fani similitudine *μελις* nuncupatur: à græcis nominatur: idq; duas species habet. Alterum subalbidum furunculo simile, sed maius, et cum dolore maiore. quod ubi maturascit, hæt foramina, p quæ fertur humor glutinosus, et

purulentus. Nec tamen ad iustam maturitatem peruenit. Si diuisum est, multo plus intus corrupti, quam in furunculo apparet, altiusq; descendit. Raro fit nisi in scapulis. Alterum est minus super corpus emnens, durum, latum subviride, subpallidum, magis exulceratum. Si quidem ad singulorum pilorum radices foramina sunt: per quæ fertur humor glutinosus subpallidus: crassitudinem mellis aut uisci referens: interdum olei. Si inciditur, uiridis intra caro apparet. Dolor autem & inflammatio ingens est, adeo ut acutam quoq; febrem mouere consuerit. Super id quod minus crebris foraminibus exasperatum est: recte imponitur & ficus arida, & lini semen quod in uino coctum: & emplastra, ac malagmata materiam educentia: aut quæ proprie huc pertinentia supra posui. Super alterum, & ea medicamenta & farina ex mulso cocta sic, ut ei dimidium resinæ terebinthinæ miscetur, & ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adiectum, & uinæ taminicæ pars quarta fisco adiecta. Quod si parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt: totum ulcus usq; ad sanam carnem excidi oportet, & ulcere ablato super plagam medicamenta danda sunt: primum quæ pus citent: deinde quæ purgent: tum quæ impleant.

De acrochordone & Thymio, & Myrmecio, & Clauo,  
curationibusq; eorum.

Vnt quædam uero uerrucis similia: quorum diuersa nomina ut uitia sunt: ἀποχόρδωνες græci uocant ubi sub cute coit aliquid durius, & interdum paulo asperius coloris eiusdem: infra tenue: ad cutem latius: idq; modicum est: quia raro fabæ magnitudinem excedit. Vix unum tantum eodem tempore nascitur: sed ferè plura, maximq; in pueris, eaq; nonnunquam subito desinunt, nonnunquam mediocrem inflammationem excitant. Sunt quæ etiam in pus conuertuntur. At thymion nominatur, quod super corpus quasi uerrucula eminet, ad cutem tenue: supra latius, subdurum, & in summo perasperum. Idq; summum colorem floris thymi representat. Vnde ei nomen est. Ibiq; facile finditur & cruentatur, nonnunquam aliquantum sanguinis fundit: ferèq; circa magnitudinem fabæ ægyptiæ est: raro maius: interdum per exiguum: modo unum, modo autem plura nascuntur, uel in talis, uel palmis, uel inferioribus pedû partibus. Pessima tamè in obscœnis sunt: maximq; ibi sanguinem fundunt. Myrmecia autem uocantur, humiliora thymio durioraq; quæ radices altius exigunt, maioremq; dolorem mouent: infra lata: super autem tenuia: minus sanguinis mittunt: magnitudine uix unquam lupini modum

pinii modum excedunt. Nascuntur ea quoq; aut in palmis, aut in inferioribus partibus pedum. Clauus autem nonnunquam quidem etiā alibi: sed in pedibus tamen maxime nascitur: præcipue tamen ex contuso: quanuis interdum aliter, doloremq; etiam, si non aliis: tamen ingredienti mouet. ex his acrochordon: siue thymium sæpe etiam per se finiuntur: & quo minora sunt: eò magis Myrmecia & clauus sine curatione nix unquam desinunt. Acrochordon, si excisa est nullam radiculam relinquit, ideoq; ne renascitur quidem. Thymio, clauoq; excisis subter rotunda radícula nascitur: quæ penitus descendit ad carnem, eaq; relicta idem rursus exigit. Myrmecia latissimis radicibus inhæret: ideoq; ne excidi quidem sine exulceratione magna possunt. Clauum subinde deradere commodissimum est. Nam sine ulla ui sic emollescit: ac si sanguinis quoq; aliquid emissum est: sæpe emoritur. Tollitur etiam, si quis eum circum purgat, deinde imponit resinam, cui miscuit pulueris paulum: quem ex lapide molari contrito fecit. Cætera uero genera medicamentis adurenda sunt. Alijsq; id qd ex fese uini, myrmecijs id quod ex alumine, & sandaraca fit: aptissimum. Sed ea: quæ circa sunt: folijs contegi debent: ne ipsa quoq; exulcerentur. Deinde postea lenticula imponi solet. Tollit thymium etiam ficus in aqua cocta.

De pustularum generibus, & earum curationibus.

**P**ustulæ maxime uernis temporibus oriuntur: earum  
 a plura genera sunt. Nam modo circa totum corpus, partem  
 ue aspredo quædam fit similis his pustulis: quæ ex urtica,  
 uel ex sudore nascuntur. ἐξ ὀρίματῳ græci uocant: eaq; modo rubet:  
 modo colorem cutis non excedunt. Nonnunquam plures similes uariis  
 oriuntur, nonnunquam maiores pustulæ liuidæ, aut pallidæ, aut  
 nigrae, aut aliter naturali colore mutato: subestq; his humor. Vbi hæ  
 ruptæ sunt, infra quasi exulcerata caro apparet φλυκταῖναι græce  
 nominatur. fiunt uel ex frigore, uel ex igni, uel ex medicamentis. Pst  
 diacion autem paulo durior, pustula est subalbida: acuta ex qua ipsa  
 quod exprimitur, humidum est. Ex pustulis uero nonnunq; etiā ulcus  
 scula sunt, aut aridiora, aut humidiora, & modo tantum cum prurige,  
 modo etiam cum inflammatione aut dolore, Exitq; aut pus, aut  
 sanies, aut utrūq;. Maximeq; id euenit in ætate puerili, raro in medio  
 corpore: sæpe in eminentibus partibus. Pessima pustula est: quæ ἐπι-  
 ρυκτὴ uocatur. Ea colore uel subliuida, uel subnigra, uel alba esse con-  
 suevit. Circa hanc autem uehemens inflāmatio est, et cum adaper-  
 ta



est: reperitur intus exulceratio mucosa. Color est humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem eius est. Neq; enim ea, faba maior est. Atq; hæc quoq; oritur in eminentibus partibus; & ferè noctu. Vnde nomen quoq; à græcis ei ἐπιπυρρῆς impositum est. In omni uero pustularum curatione primum est, multum ambulare atq; exerceri. Si quid ista prohibet, gestari. Secundum est, cibum minuere: abstinere ab omnibus acribus & extenuantibus: eademq; nutrices facere oportet: si lactens puer ita affectus est. Præter hæc: is, qui iam robustus est: si pustulæ minutæ sunt: desudare in balneo debet, simulq; super eas nitrum inspergere: oleoq; uinum miscere: & sic ungi. Tum descendere in solium. Si nihil sic proficitur, aut si maius pustularum genus occupauit: imponenda lenticula est: detractaq; summa pellicula: ad medicamenta lenia transeundum. ἐπιπυρρῆς post lenticulam recte herba quoq; sanguinali, uel uiridi coriandro curatur. Vlcera ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine fœni græci mixta sic, ut his inuicem rosa atq; intubi suauis adiiciatur: donec mellis crassitudo fiat. Proprie ad eas pustulas: quæ infantes male habent: lapidis: quem πυρίτιον uocant P. XVIII. cum quinquaginta amaris nucibus miscetur, adiungunturq; olei cyathi tres. Sed prius ungi ex cerussa pustulæ debent: tum hoc illini.

## De scabie, &amp; eius curatione.

Scabies uero est humor cutis rubicundus: ex qua pustulæ oriuntur: quædam humidiores, quædam sicciores. Exit ex quibusdam fames, fitq; ex his continue exulceratio pruriens. Serpitq; in quibusdā cito. Atq; in alijs quidem ex toto desinit: in alijs uero certo tempore anni reuertitur. Quo asperior est, quoq; prurit magis, eo difficilius tollitur. Itaq; eam: quæ talis est, ἀρσενία, idest ferè græci appellant. In hac quoq; uictus ratio eadem: quæ supra necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est: qd fit ex spodij, croci, æruginis, singulorum. P. XI. piperys albi: omphacij: singulorum. P. XI. cadmiæ. P. XVIII. Aut ubi iam exulceratio est: id quod fit ex sulphuris. P. XI. ceræ. P. XIII. picis liquidæ hemina: olei sextarijs duobus. Quæ simul incoquantur, dum crassitudo mellis fiat. Est etiam quod ad Protarchum authorem refertur. Habet hoc farina lupinorum sextarium: nitri cyathos quattuor: picis liquidæ heminam: resine humide selibram: aceti cyathos tres. Crocum quoq; licium, ærugo, myrrha, cinis æquis portionibus recte miscentur, & ex passo coquantur. Idq; omnē pituitam ubiq; sustinet. At si nihil aliud

est, amurca ad tertiam partē decocta, uel sulphur pice liquida mixtū  
sicut in pectoribus proposui: hominibus quoq; scabie laborantibus opi  
tulantur.

De impetiginis speciebus & curationibus.

Impetiginis uero species sunt quattuor. Minime mala est,  
i quæ similitudine scabiem representat. Nam & rubet &  
durior est, & exulcerata est & roditur. Distat autem ab ea  
quia magis exulcerata est, & uariis similes pustulas habet, uideturq;  
esse in ea quasi bullulæ quædam ex quibus interposito tempore squa  
mulæ resoluntur: certioribusq; hoc temporibus reuertitur. Alterum  
genus peius est simile papulæ ferè: sed asperius, rubicundiusq;: figu  
ras uarias habens. Squamulæ ex summa cute discedunt: roseo maior  
est: celerius & latius procedit: certioribusq; etiam nonnunquam pri  
or temporibus & fit et desinit: rubrica cognominatur. Tertia etiam  
num deterior est. Nam & crassior est, & durior, et magis tumet: in  
summa cute finditur: & uehementius rodit. Ipsa quoq; squamosa, sed  
nigra procedit: & late & tarde eminus serpit. In temporibus, aut  
oritur, aut desinit, neq; ex toto tollitur: nigra cognomen est. Quartum  
genus est, quod curationem omnino non recipit: distans colore. Nam  
subalbidum est & recenti cicatrici simile, squamulasq; habet palli  
das, quasdam subalidas, quasdam lenticulæ similes. quibus demptis  
nonnunquam profluit sanguis. Alioquin uero humor eius albidus est,  
cutis dura atq; fissa est, proceditq; latius. Hæc uero omnia maximo  
genera oriuntur in pedibus et manibus, atq; ungues quoq; infestant.  
Medicamentum non aliud ualentius est, quam quod ad scabiem quoq;  
pertinere sub auctore. Protarcho retuli. Serapion autem nitri. P. XII.  
sulphuris. P. XIII. excipiebat resina copiosa, eoq; utebatur.

1. species

2. species

3. species

4. species

De papulis, & earum curatione.

Papularum uero duo genera sunt. Altera est, in qua per mi  
nimas pustulas cutis exasperatur & rubet, leuiterq; rodi  
tur: medium habet pauxillo leuius: tarde serpit, idq; uitiū  
maxime rotundum incipit, eademq; ratione in orbem procedit. Alte  
ra autem est, quam ἀρσάρ, græci appellant. In qua similiter qui  
dem, sed magis cutis exasperatur, exulceraturq; ac uehementius  
& roditur & rubet: interdum etiam pilos remittit. Quæ minus  
rotunda est: difficilius sanescit: nisi sublata est, in impetigné uertitur:



sed levis papula, etiam si ieiuna salina quotidie defricatur: sanescit. Maior commodissime murali herba tollitur, si sub ea detrita est. Ut uero ad composita medicamenta ueniamus, idem illud Protarchi tanto ualentius in his est, quanto minus in his uitij est: alterum ad idem Myronis: nitri rubri, thuris, singulorum. P. XI. cantharidum purgatum. P. XII. sulphuris ignem non experti tantundem, resinae terebinthinæ liquidæ. P. XXX. farinæ lolij sext. iij. githiathos tres: picis crydæ sext.

De uutilignis speciebus, idest de Alpho & Mela, et leuce, & earum curatione.

Utiligo quoque, quamuis per se nullum periculum affert: tamen foeda est, & ex malo corporis habitu fit. Eius tres species sunt. *Alphos* uocatur, ubi color albus est fere subasper et non continuus, ut quædam quasi guttæ dispersæ esse uideatur. Interdum etiam latius, & cum quibusdam intermissionibus serpit. *Melasma* colore ab hoc differt: quia niger est, & umbræ similis. Cetera eadem sunt. *Aluon* habet quiddam simile *alpho*, sed magis albida est, & altius descendit, in eaq; albi pili sunt, & lanugini similes. Omnia hæc serpunt. Sed in alijs celerius, in alijs tardius. *Alphos* & *Melas* in quibusdam uarijs temporibus & oriuntur, & desinunt. *Leuce* quæ occupauit: non facile dimittit. Priora curationem non difficillimam recipiunt: ultimum uix unquam sanescit: ac si quid ei uitio demptum est: tamen non ex toto sanus color redditur. Vtrum autem aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acu pungi. Si sanguis exit: quod fere fit in duobus prioribus, remedio locus est. Si humor albidus, sanari non potest. Itaque ab hoc quidem abstinendum est. Super id uero: quod curationem recipit, imponenda lenticula mixta cum sulphure & thure sic, ut ea contrita ex aceto sit. Aliud ad idem: quod ad *Hireneum* auihorē refertur. *Alcyonium*, nitrum, cuminum, fici folia arida paribus portionibus contunduntur adiecto aceto. Hæc in sole uutiligo perungitur: deinde non ita multo post: ne nimis erodatur: eluitur. Proprie quidem Myrone auihorē eos: quos *alphos* uocari dixi, hoc medicamento perungunt. sulphuris. P. p. Z. aluminis scissilis. P. p. Z. nitri. P. XIII. myrti radice contrita acetabulum miscent: deinde in balneo super uutilignem inspergunt farinā ex faba: tum hæc inducunt. Hi uero, quos *melanas* uocari dixi: curantur: Cum simul contrita sunt *alcyonium*, thus, hordeum, faba sine oleo, in balneo ante sudorē insperguntur: tum genus id uutilignis defricatur.

*Alphos et Leuce differunt leuiter magis et minus leuiter albus leuendit*

*no.*



## De vitij singularum corporis partium. Cap. I.

## De capillis fluentibus.

d Ixi de his vitij, quæ per totum corpus orientia: medicamentorum auxilia desiderat. nunc ad ea ueniam, quæ non nisi in singulis partibus incidere consuerunt orsus à capite. In hoc igitur capillis fluentibus maxime quidem sæpe radendo succurritur. adiicit enim uim quædam ad continendum ladanum cum oleo mixtum. nunc de his capillis loquor, qui post morbum ferè fluunt. nam quo minus caput quibusdā ætate nudetur, succurri nullo modo potest.

## De porrigne &amp; eius curatione. Cap. II.

p Orrigo autem est ubi inter pilos quedam quasi squamulæ surgunt, eæq; à cute resolvuntur, & interdū madent: multo sæpius sicca sunt. Idq; euenit modo sine ulcere, modo ex-ulcerato loco: huic quoq; modo malo odore, modo nullo accidente: ferèq; id in capillo fit, rarius in barba: aliquando etiam in supercilio. ac neq; sine aliquo corporis vitio nascitur, neq; ex toto inutile est. nam bene integro capite non exit. Vbi aliquid in eo vitium est, non incommodum est, summam cutem potius subinde corrumpi: quàm id quod nocet in aliam partem magis necessariam uerti. Commodius est ergo subinde pectendo repurgare: quàm id ex toto prohibere. Si tamen ea res nimium offendit: quod humore sequente fieri potest, magisq; si id etiam mali odoris est, caput sæpe radendum est, dein id super adiuvandum aliquibus ex leniter reprimentibus: quale est nitrum cum aceto, uel ladanum cum myrteo uino, uel myrobalanum cum uino. Si parum per hæc proficitur uehementioribus uti licet, cum eo, ut sciamus utiq; in recenti vitio id inutile esse.

## De sycofi &amp; eius curatione. Cap. III.

e St. etiam ulcus, quod à fici similitudine σύκοις à græcis nominatur. caro excrescit: & id quidem generale est. sub eo uero duæ species sunt. alterum ulcus durum & rotundum est, laterum humidum & inæquale. ex duro exiguum quiddam &

glutinosum exit: ex humido plus, & mali odoris. Fit uero utrunq; in his partibus, quæ pilis conteguntur: sed id quidem, quod callosum & rotundum est, maxime in barba. Id uero quod humidum, præcipue est in capillo. Super utrunq; oportet imponere elaterium, aut lini semen contritum & aqua coactum, aut ficum in aqua decoctam, aut emplastrum tetrapharmacum ex aceto subactum: terra quoq; erithrea ex aceto liquata recte illinitur.

De Arcis & earum curationibus. Cap. IIII.

Rearum quoq; duo genera sunt. commune utriq; est: quod  
a emortua summa pellicula, pili primum extenuantur: dein de excidunt: ac si ictus is locus est, sanguis exit liquidus et mali odoris, increscitq; utrunq; in alijs celeriter, in alijs tarde: Peius est quod densam cutem & subpinguem, & ex toto glabram facit: sed ea quæ ἀλωτὴν α nominatur: sub qualibet figura dilatatur, fit et in capillo & in barba. Id uero quod à serpentis similitudine ὀφθαλμοῖς appellatur: incipit ab occipitio: duorum digitorum latitudinem non excedit: ad aures duobus capitibus serpit: quibusdam etiam ad frontem: donec se duo capita in priorem partem committant. Illud uitiū in qualibet ætate est: hoc ferè in infantibus. Illud uix unquam sine curatione: hoc per se sæpe finitur. quidam hæc genera arearū scalpello exasperant. quidam illinunt adurētia ex oleo, maximeq; chartam combustam. quidam resinam terebinthinam cum tapsia inducunt. sed nihil melius est, quàm nonacula quotidie radere: qua cum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur pilorū radiculæ. neq; ante oportet desistere, quàm frequentem pilū nasci apparuerit. Id autem, quod subinde raditur: illini atramento scriptorio satis est.

De Varis, et Lenticulis, & Ephelide, & eorū curationibus. Cap. V.

enè ineptiæ sunt: curare Varos, et Lenticulas, & Ephelidas.  
p sed eripi tamen foeminis cura cultus sui non potest. Ex his autem quas supra proposui, uari, lenticulæq; uulgo notæ sunt: quamuis rarior ea species est, quàm ξένιον græci uocant: cum sit ea lenticula rubicundior et inæqualior. ἐφελὶς uero à plerisq; ignoratur: quæ nihil est: nisi asperitas quædam & durities mali coloris. cætera non nisi in facie, Lenticulæ etiam in alia parte nonnunquam nasci solent. de qua per se scribere alio loco uisum operæ præcui non est. sed Vari commodissime tolluntur imposita resina, cui nō nisi

nus quàm ipsa est: aluminis, scissilis, & paulum mellis adiectum est. Lenticulam tallunt galbanum et nitrum, cum pares portiones habet, contritaq; ex aceto sunt: donec ad mellis crassitudinem uenerint. His corpus illinendum, & interpositis pluribus horis mane eluendū est: oleoq; leuiter unguendum. Epheliden tollit resina, cui tertia pars salis fossilis, & paulum mellis adiectum est. Ad omnia uero ista atq; etiā ad colorandas cicatrices potest ea compositio, quæ ad Tryphonem patrem auctorem refertur. In ea pares portiones sunt myrobalani, crocomagmatis, cretæ amoliæ subcerulæ, nucum amararum, farinæ hordei atq; erui, struthij albi: sertulæ campanæ seminis. quæ omnia contrita, melle quàm amarissimo coquantur, illitumq; à uespere usq; mane eluitur.

De oculorum morbis, curationibusq; eorum: & primo de his morbis qui lenibus medicamentis curantur. Cap. VI.

Ed hæc quidem mediocria sunt. Ingentibus uero et varijs casibus oculi nostri patens. qui cum magnam partem ad uitæ simul & usum & dulcedinem conferant: summa cura tuendi sunt. protinus autem orta lippitudine quædam notæ sunt: ex quibus quid euenturum sit: colligere possimus. nam simul & lacryma, & tumor, & crassa pituita cœperint, si ea pituita lacrymæ mixta est: & ea lacryma calida est: pituita uero alba & mollis, tumor non durus: longæ ualeitudinis metus non est. at si lacryma multa & calida: pituitæ paulum, tumor modicus: idq; in uno oculo est: longum id, sed sine periculo futurum est. Idq; lippitudinis genus minime cum dolore est, sed uix ante uigessimum diem tollitur: nonnunq; per duos menses durat: sed quandoq; finitur. Si pituita alba et mollis esse incipit, lacrymæq; miscentur, aut si simul hæc utrunq; oculum inuaserunt: potest esse breuior, sed periculum ulcerum est. Pituita autem si atrox & arida dolorem quidē mouet, sed maturius desinit, nisi quid exulcerauit. tumor magnus si sine dolore est & siatus, sine ullo periculo est. si siatus quidem: sed cum dolore est, ferè exulcerat, & nonnunq; ex eo casu fit, ut palpebra cum oculo glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor in palpebris, pupillis uel est: ubi super magnum dolorem lacrymæ falsæ, calidæq; eunt, aut etiam si timore infinito diu lacryma cum pituita profluit. peius etiam nimis est, ubi pituita calida, aut liuida est, lacryma calida aut multa profluit, caput calet, à temporibus ad oculos dolor peruenit: nocturna uigilia urget. siquidem sub his oculis plerunq; rumpitur: notumq; est, ut tantum exulceretur. In-



tus ruptum oculum febricula inuat. Si forasiam ruptus procedit: si-  
 ne auxilio est: si de nigro aliquid albidum factum est, diu manet. at  
 si asperum, crassum est: etiam post curationem uestigium aliquod re-  
 linquit. Curari uero oculos sanguinis detractio, medicamento, bal-  
 neo, uino uetustissimus auctor Hippocrates memorie prodidit. sed  
 eorum tempora & causas parum explicuit. In quibus medicine sum-  
 ma est. neq; minus in abstinentia & alui ductione sepe auxilij est.  
 Hos igitur interdum inflammatio occupat: ubi cum tumore in his do-  
 lor est, sequiturq; pituitae cursus nonnunquam copiosior uel acrior:  
 nonnunq; utraq; parte moderatior. In eiusmodi casu prima omnium  
 sunt, quies & abstinentia. Ergo primo die loco obscuro cubare debet,  
 sic ut a sermone quoq; abstineat. nullum cibum assumere: si fieri po-  
 test ne aquam quidem: sin minus, certe quam minimum eius. Quod  
 si graues dolores sunt: commodius secundo die: si tamen res urget: etiā  
 primo sanguis mittendus est: utiq; si in fronte uenae tumunt, si firmo  
 corpori materia superest. si uero minor impetus, minus acrem cura-  
 tionem requirit, aluum, sed non nisi secundo, tertio uel die ducto opor-  
 tet. At modica inflammatio neutrum ex his auxilium desiderat. sa-  
 tisq; est uti quiete & abstinentia. Neq; tamen in lippientibus longum  
 ieiunium necessarium est: ne pituita tenuior atq; acrior fiat. sed secū-  
 do die dari debet id quod leuissimum uideri potest ex his, quae pitui-  
 tam faciunt crassiores: qualia sunt oua sorbilia. si minor uis urget:  
 pulicula quoq; aut panis ex lacte. Insequentibusq; diebus quantum  
 inflammationi detrahetur: tantum adijci cibis poterit. sed generis eius-  
 dem: utiq; ut nihil falsum, nihil acre, nihil ex his: quae extenuant, su-  
 matur: nihil potui praeter aquam. Et uictus quidem ratio talis ma-  
 xime necessaria est. Protinus autem primo die croci. P. XI. & farinae  
 candidae quam tenuissimae. P. XII. excipere oportet oui albo: donec mel-  
 lis crassitudinem habeat: idq; in linteolum illinere & fronti agglu-  
 tinare, ut compressis uenis pituitae impetum cohibeat. si crocum non  
 est, thus idem facit: Linteolo an lana excipiat: nihil interest. Super-  
 iungi uero oculi debent: sic ut croci quantum tribus digitis compre-  
 hendi potest: sumatur: myrrhae: ad fabae papaueris lacrymae ad len-  
 ticulae magnitudinem. eaq; cum passo conterantur, & specillo super  
 oculum inducatur. Aliud ad idem: Myrrhae. P. XI. Mandragorae suc-  
 ci. P. XII. papaueris lacrymae. P. XII. foliorum rosae, cicutae seminis:  
 singulorum. P. XIII. acaciae. P. XIII. gummi. P. XVII. Et haec qui-  
 dem interdum. noctu uero: quo commodior quies ueniat: non alienum  
 est superimponere candidi panis interiorem partem ex uino suba-  
 ctam. Nam & pituitam reprimat: & siquid lacrymae proccssit, ab-  
 sorbet,

forbet: & oculum glutinari non patitur. Si graue id et durum propter magnum oculorum dolorem uidetur: oni & album & uitellus in uas disfundendum est, adiiciendumq; eò mulsi paulum: idq; digito permiscendum. Vbi facta unitas est, demitti debet lana mollis bene apta. quæ id excipiat, superq; oculos imponi. Ea res & leuis est: & refrigerando pituitam coerct, & non exarescit, et glutinari oculum non patitur. Farina quoq; hordeacea cocta, & cum malo cotoneo cocto mixta commodè imponitur. neq; ab ratione abhorret etiam penicillo potissimum uti expresso: si leuior impetus est, ex aqua: si maior, ex posca. Priora fasciæ deliganda sunt, ne per somnam cadant, et hoc superimponi satis est, quia & reponi ab ipso commodè potest, et cum inaruit, iterum madefaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu prohibeat: eorum aliquid dandum est: quæ ἀνώδυνα græci uocant. satisq; est puero, quod erui, uiro, quod fabæ magnitudinem impleat. In ipsum uero oculum primo die, nisi modica inflammatio est, nihil rectè conijciatur. sepe enim potius concitatur eò pituita, quàm minuitur. A secundo die graui quoq; lippitudini per indita medicamentum rectè succurritur, ubi uel iam sanguis missus, uel aluus ducta est, aut ubi neutrum necessarium esse manifestum est.

#### De diuersis oculorum collirijs.

Vltæ autem, multorumq; auctorum colliria ad id apta sunt: m nouisq; etiam nunc mixturis temperari possunt, cum lenia medicamenta & modicè reprimentia facile et uarie miscetur. Ergo nobilissima exequar.

##### Philonis collirium.

St igitur Philonis quod habet cerussæ elotæ: spodij, gummi, e singulorum. P. XI. papaueris lacrymæ combustæ. P. XI. Illud scire oportet, hic quoq; omnia medicamenta, singula primum per se teri: deinde mixta iterum adiecta paulatim, uel aqua, uel alio humore: gummi cum quasdam alias facultates habeat, hoc maxime præstare, ut ubi colliria facta inaruerunt, glutinata sint, neque fricentur.

##### Dionysij collirium.

d Dionysij uero collirium est, papaueris lacrymæ combustæ donec tenerescat. P. XI. thuris combusti, gummi: singulorum. P. XII. spodij P. XIII.

**LIBER**  
**Cleonis collirium.**

Leonis nobile admodum: papaueris lacrymæ frictæ. P. XI. croci. P. XI. gummi. P. XI. quibus cum teruntur: adiçitur rosæ succus. aliud eiusdem ualentius: squamæ æris quod σόμωμα appellant. P. XI. croci. P. XII. spodij. P. XIII. plumbi & eloti & combusti. P. XVI. gummi tantundem. eius aliud quoq; id idem est: maxime ubi multa pituita profluit. castorei. P. XX. aloes. P. XL. croci. P. XXI. myrrhæ. P. XII. lycij. P. XIII. cædmæ curatæ. P. XVIII. stibis tantundem: acaciæ succi. P. XXII. quod cum gummi miscuit id quod habet liquidum in pixidecula seruatur. Theodotus uero huic compositioni adiecit papaueris lacrymæ combustæ. P. X. æris combusti et eloti. P. XII. nucleos palmarum combustos numero. XX. gummi. P. XXII.

**Theodoti collirium, Acharistum appellatum.**

T ipsius Theodoti, quod à quibusdā αχάριστον nominatur: eiusmodi est. castorei: nardi indicij: singulorum. P. XI. lycij. P. XII. papaueris lacrymæ tantundem: myrrhæ. P. XII. croci, cerussæ elotæ: aloes, singulorum. P. XIII. cædmæ, botryodis elotæ æris combusti singulorum. P. XVIII. gummi. P. XVIII. acaciæ succi. P. XXX. stibis tantundem: quibus aqua pluuialis adiçitur.

**Cythion, uel tephron collirium.**

Ræter hæc ex frequentissimis collirijs est id quod quidam αὐτίον: quidā à cinereo colore τέφρον appellant: amyli, tragacanthæ, acaciæ succi, gummi, singulorum. P. XI. papaueris lacrymæ. P. XII. cerussæ elotæ. P. XVIII. spumæ elotæ. P. XXIII. quæ æque ex aqua pluuiatili conteruntur.

**Euelpidis collirium, trygodes nominatum.**

Velpides autem, qui ætate nostra maximus fuit oculus medicus utebatur eo, quod ipse composuerat: πυρῶδες nominabat. castorei. P. XII. lycij, nardi, papaueris lacrymæ, singulorum. P. XI. croci, myrrhæ, aloes, singulorum. P. XIII. æris combusti. P. XVIII. cædmæ & stibis: singulorum. P. XXII. acaciæ succi. P. XXXVI. gummi tantundem. quo grauior uero quæq; inflammatio est: eò magis leniri medicamentum debet, adiecto uel albo oni, uel mæ



liebri lacte. at si neq; medicus, neq; medicamentum præsto est, sæpius utrumlibet horum in oculis penicillo ad id ipsum facto infusum, id malum lenit. Vbi uero aliquis releuatus est: iamq; cursus pituitæ constitit: reliquias fortasse leniores futuras disentiunt balneum, & uinum. Igitur lauari debet leniter ante ex oleo perfrictus, diutiusq; in cruribus & feminibus, multaq; calida aqua fouere oculos: deinde per caput prius calida, tum e gelida perfundi, à balneo cauere ne quo frigore afflatu ue lædatur. post hæc cibo paulo pleniore, quàm ex eorū dierum consuetudine uti, uitatis tamen oībus pituitam extenuantibus. uinū bibere lene: subausterū, modice uetus, neq; effuse, neq; timide, ut neq; cruditas ex eo, & tamen somnus fiat, lenianturq; intus latentia acria. Sed si quis in balneo sensit maiorem oculorum perturbationem, quàm attulerat: quod inadere his solet: qui manente adhuc pituitæ cursu, festinarunt, quàm primū discedere debet: nihil eo die uini assumere: cibi minus etiam quàm pridie. deinde cum primum satis pituita substat, iterum ad usum balnei redire. Solet tamen euenire nonnunquam siue tempestatum uitio, siue corporis, ut pluribus diebus neq; dolor, neq; inflammatio, & minime pituitæ cursus finiatur. quod ubi inadit, iamq; ipsa uetustate res matura est, ab his hisdem auxilium petendum est: id est balneo ac uino. hæc enim ut in recentibus malis aliena sunt: quia concitare ea possunt & accendere, sic in ueteribus, quæ nullis alijs auxilijs cesserunt: admodum efficacia esse cōfuerunt. uidelicet hic quoq; ut alibi, cum secunda uana fuerint contrarijs adiuantibus. Sed ante tonderi ad cutem conuenit. deinde in balneo aqua calida q̄ plurima caput atq; oculos fouere: tum utrumq; penicillo detergere, & ungere caput irino unguento, continereq; in lectulo se, donec omnis calor qui conceptus est finiatur, desinatq; sudor, qui necessario in capite collectus est. tum ad idem cibi uiniq; genus ueniendum sic, uti potiones meracæ sint: obtegendumq; caput & quiescendum. sæpe enim post hæc grauis somnus, sæpe sudor, sæpe alui deiectio pituitæ cursum finit. Si leuatum malum est, quod aliquanto sæpius fit: per plures dies idem fieri oportet, donec ex toto sanitas restituitur. si diebus hisdem alius nihil reddit: ducenda est: quo magis superiores partes leuentur. Nonnunq̄ autem ingens inflammatio tanto impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat: proprie enim ὀφθαλμοὶ id, quoniam oculi prociunt, græci appellant. His utiq; si uires patiantur, sanguinē mitti: si id fieri non potest, aluum duci, longioremq; in diem indici necessarium est. Opus autem lenissimis medicamentis est. Ideoq; Cleonis collirio quidam, quod ex duobus ante positum est: utuntur. Sed optimum est Nilei. neq; de ullo magis inter omnes auctores conuenit.

## LIBER

Nilei collirium omnium optimum.

**D** habet nardi indici, papaueris lacrymæ, singulorum. **P.**

**i** **XI.** gummi. **P.** **XI.** croci **P.** **XII.** foliorum rosæ recentium. **P.**

**XIII.** quæ uel aqua pluuiatili, uel uino leni subaustero coguntur. Neq; alienum est malicorium, uel fertulam campanam ex uino coquere, deinde conterere: aut myrrham nigram cum rosæ folijs misere, aut hyoscyami folia cum oui cocti uitello, aut farinam cum acacie succo, uel passo, aut mulso. quibus si folia quoq; papaueris adiunguntur, aliquanto ualentiora sunt. Horum aliquo præparato penicillo fouere oculos oportet ex aqua calida expresso: i qua ante mel myrti, uel rosæ folia decocta sint. deinde ex illis aliquid imponi. præter hæc ab ocapitio inasa cute cucurbitula admouenda est. Quod si per hæc restitutus oculus in sedem suam non est: eodẽq; modo prolapsus permanet: scire oportet lumen esse amissum. deinde futurum ut inarescat is, aut in pus uertatur. Si suppuratio se ostendit, ab eo angulo qui propior tempore est: incidi oculus debet: ut effuso pure & inflammatio ac dolor finiatur: et intus tunicæ residat quo minus foeda postea facies sit. Utendum deinde uel hisdem collirijs est ex lacte, aut ouo uel croco, cui album oui misceatur. Ac si induruit & sic emortuus est, ne in pus uerteretur: quatenus foede prominebit excidendum erit: sic ut hamo summa tunica apprehendatur, infra id deinde scalpellus incidat: tum eadem medicamenta erunt coniicienda: donec omnis dolor finiatur. Hisdem medicamentis in eo quoq; oculo utendum est: qui primum procidit: deinde per plura loca fissus est.

De carbunculis oculorum, & eorum curatione.

**S**olent etiam carbunculi ex inflammatione nasci: nonnunq̃ in ipsis oculis, nonnunq̃ in palpebris: & in his ipsis oculis modo ab interiore, modo ab exteriori. In hoc casu alius ducenda est: ciuis minuendus: lac potui dandũ, ut acria quæ læserunt leniatur. Quod ad cataplasmata & medicamenta pertinet: his utendum, quæ aduersus inflammationes proposita sunt. Atq; hic quoq; Nilei collirium optimum est. si tamen carbunculus in exteriori palpebræ parte est, ad cataplasmata aptissimũ est lini semen ex mulso coctum: aut si id non est, tritici farina eodem modo cocta.

De pustulis oculorum, et curatione earum.

**P**ustulæ quoq; ex inflammationibus interdum oriuntur: quod si inter initia protinus incidit: magis etiam seruanda sunt quæ de sanguine et quiete supra posui. sin serius quàm ut sanguis

mitti possit: alius tamen ducenda est. si id quoque aliqua res inhibet, utique victus ratio seruanda est. Medicamentis autem hic quoque lenibus opus est, quale Nilei: quale Cleonis est.

φιλαιθοῦς collirium ad pustulas oculorum.

**i** D quoque: quod philalethos uocatur: huic aptum est. Myrrhæ, papaueris lacrymæ: singulorum. P. XI. plumbi eloti, terræ samæ, quæ ἀσπρ uocatur: tragacanthæ: singulorum. P. XIII. sibiis cocti, amyli: singulorum. P. XVI. spodij eloti, cerussæ elotæ, singulorum. P. XVIII. Quæ aqua pluuiali excipiuntur. Vfus collirij, uel ex oño, uel ex lacte est.

De ulceribus oculorum, et eorū curatione, et de διαβαλάρυ collirio:

**e** X pustulis ulcera interdum fiunt, ea quæ recentia æque lenibus medicamentis nutrienda sunt, et hisdem ferè quæ supra in pustulis posui. Fit quoque proprie ad hæc quod διαβαλάρον uocatur. Habet æris combusti, et eloti papaueris lacrymæ frictæ: singulorum. P. XI. spodij eloti, thuris, sibiis combusti et eloti, myrrhæ gummi, singulorum. P. XII.

Curatio oculorum aliquo casu immunitorum.

**e** Venit etiam ut oculi, uel ambo, uel singuli minores fiant quàm esse naturaliter debeant: Idque et acer pituitæ cursus in lippitudine efficit, et continuati fletus, et ictus parum bene curati. In his quoque hisdem lenibus medicamentis: ex muliebri lacte utendum est. Cibus uero his, qui maxime corpus alere et implere consueverunt. Vitandaque omnimodo causa: quæ lacrymas excitet: curaque domesticorum, quorum etiam si quid tale incidit: eius notitiæ subtrahendum: atque acris quoque medicamenta, et acres cibi non alio magis nomine his nocent: quàm quod lacrymas mouent.

De pediculis palpebrarum.

**g** Enus quoque uitij est: qui inter pilos palpebrarum pediculi nascuntur. Id φθρίαισι græci nominant. Quod cum ex malo corporis habitu fiat: raro non ultra procedit. Sed ferè tempore interposito pituitæ cursus acerrimus sequitur: exulceratisque uehementer oculis aciem quoque ipsam corrumpit. His alius ducenda, atque ad cutem tondendū, diuque quotidie ieiunis perficiendum. His:



ambulationibus, alijsq; exerationibus diligenter utendum, gargarizandumq; ex mulso, in quo nepeta, & pinguis fici decocta sit: sepe in balneo multa calida aqua fouendum caput. Vitandi acres cibi, laete uinoq; pingui utendum, bibendumq; liberalius, quàm edendum est. Medicamenta uero intus quidem lenia danda sunt, ne acriorem pituitam contant. Super ipsos uero pediculos alia, quæ necare eos et prohibere: ne similes nascentur, possint. Ad id ipsum spumæ niri: P. XI. sandaracæ. P. XI. uinæ taminæ. P. XI. simul teruntur, adijciturq; uetus oleum pari portione atq; acetum donec ei mellis crassitudo sit.

De oculorum grauioribus morbis, qui ex inflammationibus oriuntur, & ualidioribus medicamentis curantur: & de Andree collirio, & de δια νέπατος.

h Aetienus oculorum morbi lenibus medicamentis natrium =  
tur. Genera deinde alia sunt: quæ diuersam curationem de  
siderant, ferèq; in inflammationibus nata sunt, sed finitis  
quoq; his manentia. Atq; in primis in quibusdam perseverat tenuis  
pituitæ cursus: quibus alius ab inferiore parte euocanda est: demen-  
dum aliquid ex cibo: neq; alienum est illini frontem compositione An-  
dree, Quæ habet gummi. P. XI. cerussæ, sibiis, singulorum. P. XII. spu-  
mæ argenti & coctæ & elotæ. P. XIII. Sed & ea spuma ex aqua  
plumbi atili coquitur, & arida hæc medicamenta ex succo myrti conte-  
runtur. His illita fronte, cataplasma quoq; super iniiciendum est ex  
farina, quæ frigida aqua coacta sit: cuiq; aut acacie succus, aut cupres-  
sus adiecta sit. Cucurbitula quoq; inciso uertice recte accommodatur,  
aut ex temporibus sanguis emittitur. Inungi uero eo debet, quod ha-  
bet squamæ æris: papaueris lacrymæ: singulorum. P. XI. ceruini cor-  
nus combustus, & eloti plumbi, eloti gummi: singulorum. P. XIII. ihu-  
ris. P. XXII. Hoc collirium: quia cornum habet, δια νέπατος nomina-  
tur. Quotienscunq; non aduicio quod genus humoris adijciendum sit:  
aquam intelligi uolo.

Memnigenon Euelpidis collirium.

a D idem Euelpidis: quod μεμνιγενον nonnabat. In eo pa-  
paueris lacrymæ, et albi piperis singulæ uncia sunt: gum-  
mi libra: æris combusti. P. XI. Inter has autē curationes post  
intermissionem aliquam profunt balneum & uinum. Cumq; omni-  
bus lippientibus uitandi cibi sunt, qui extenuant, tum præcipue qui-  
bus tenuis humor diu fertur. Quod si iam fastidium est eorum, quæ  
pituitam crassationem reddunt: sicut in hoc genere materiæ maxime

promptum est: confugiendum est ad ea: quæ quia uentrem, corpus quoq; astringunt.

De oculorum ulceribus supercrescentibus, sordidis, cauis, ueteribus, & de curationibus singulorum.

**T**ulcera, si cum inflammatione finita non sunt, aut supercrescentia, aut sordida, aut caua, aut certe uetera esse consuevunt. Ex his supercrescentia collirio: quod *μυμυμένον* uocatur: optime reprimuntur. Sordida purgantur et eodem, ex eo, quod *σμήλιον* nominatur.

*σμήλιον* collirium.

**h**abet æruginis. P. XIII. gummi tantundem: ammoniaci, mānij sinopia: singulorum. P. XXVI. Quæ quidam ex aqua, quidam quo uehementiora sint, ex aceto terunt.

*Phynon* collirium *Euelpidis*.

**D** quoq; *Euelpidis*, quod *phynona* appellabat, huic utile est *Croci*. P. XI. *papaueris lacrymæ*, gummi, singulorū. P. XII. *æris combusti* & *eloti*, *myrrhæ*: singulorum. P. XIII. *piperis albi*. P. XVI. Sed ante linitum hoc, unguendum est.

*Sphærian* collirium *Euelpidis*.

**D** quoq; eiusdem, quod *sphærian* nominabat: eodem ualet. *Lapis hæmatitis eloti*. P. XII. *piperis grana sex*: *cadmiæ elotæ*, *myrrhæ*, *papaueris lacrymæ*: singulorū. P. XIII. *croci*. P. XIII. gummi. P. XVIII. Quæ cum uino amineo conteruntur.

*Liquidum* *Euelpidis* collirium.

**I**quidum quoq; medicamentum ad idē componebat: in quæ erant hæc. *Æruginis*. P. X. *minij combusti*, *atramenti sutorij cinnamomi*: singulorum. P. XIII. *croci*, *nardi*, *papaueris lacrymæ*: singulorum. P. XI. *myrrhæ*. P. XII. *æris combusti*. P. XIII. *anæris ex odoribus*. P. XIII. *piperis grana*. XV. Hæc ex uino austero teruntur. Deinde cum passis tribus heminis decoquantur. donec corpus unum sit. Idq; medicamentum uetustate efficacius fit.

De cauis oculorum ulceribus, & curationibus.

**A**ua uero ulcera commodissime implent ex his quæ supra posita sunt, *sphærian*, & id quod *φιλανθοῦς* uocatur. Idem *sphærian* uetustis ulceribus & uix ad cicatricem uementibus optime succurrit.

**LIBER**  
**Hermonis collirium.**

**e** St etiam collirium, quod cum ad plura valeat: plurimum  
tamen proficere in his ulceribus uidetur. Refertur ad her-  
monem authorem: habet piperis longi. P. XIZ. albi. P. XV.  
cinnamomi: costi: singulorum. P. XI. atramenti sutorij: nardi, castæ, ca-  
storei: singulorum. P. XII. gallæ. P. XV. myrrhæ, croci, thuris, lycij, ce-  
rusæ: singulorum. P. XVIII. papaueris, lacrymæ. P. XXII. aloes: æris  
combusti, cadmiæ singulorum. P. XXVI. acatiæ, sibi, gummi: singulo-  
rum. P. XXXV.

**De cicatrici oculorum: quæ ex ulceribus fi etæ sunt: & quomodo  
curari debeant: & de Asclepia, et Canopite, & Pyxino collirijs.**

**f** A etæ uero ex ulceribus cicatrices duobus uitijs periclitan-  
tur: ne aut caua, aut crassæ sint. Si caua sunt, potest eas im-  
plere id, quod sphæron uocari dixi, uel id, quod asclepias  
nominatur: habet papaueris lacrymæ. P. XII. sagapeni, opopanax:  
singulorum. P. XIII. eruginis. P. XIII. cumini. P. XVIII. piperis. P.  
XXII. cadmiæ elotæ: cerusæ: singulorum. P. XXVI. At si crassæ cic-  
trices sunt: extenuant uel Smilion, uel Canopite collirium: quod habet  
cinnamomi, acatiæ: singulorum. P. XI. Cadmiæ elotæ, croci, myrrhæ:  
papaueris lacrymæ: gummi: singulorum. P. XII. piperis albi, thuris,  
singulorum. P. XIII. æris combusti. P. XVIII. cum aqua plunitali.  
uel Eulpidis Pyxinum: quod ex his constat. Salis fossilis. P. XIII.  
ammoniaci: thymiamatis. P. XVIII. papaueris lacrymæ. P. XXII. ce-  
rusæ. P. XXV. piperis albi, croci siculi: singulorum. XXXXI. gum-  
mi. P. XIII. cadmiæ elotæ. P. XVIII. Maxime tollere cicatricem ui-  
detur id quod habet gummi. P. XII. eruginis. P. XI. crocomagna-  
tis. P. XIII.

**De alio genere inflammationis oculorum.**

**e** St etiam genus inflammationis: in qua, si cui tument ac di-  
stenduntur cum dolore oculi, sanguinem ex fronte emitti  
necessarium est: multaq; aqua calida caput, atq; oculos fove-  
re: gargari ex lenticula, uel ex fici cremore: inungi acribus mudi-  
camentis, quæ supra comprehensa sunt: maximeq; eo quod sphæron  
nominatur, quod lapidem hæmatitem habet. Atq; alia quoq; utilia  
sunt, quæ ad extenuandam aspritudinem fiunt: de qua protinus di-  
cam. Hanc autem inflāmatio oculorum fieri sequitur: inter dū maior,  
interdum



interdum leuior, nonnunquam etiam ex aspritudine lippitudo fit: deinde aspritudinem ipsam auget, siq; ea in alijs breuis, in alijs longa, & quæ nix unquam finiatur. In hoc genere ualitudinis quidam crassas, durasq; palpebras & ficulneo folio, & asperato specillo, & interdum scalpello eradunt: uersasq; quotidie medicamentis sufficiunt. Quæ neq; nisi in magna: uetustaq; aspritudine, neque sæpe facienda sunt. Nam melius eodē, ratione uictus & idoneis medicamentis peruenitur. Ergo exercitationibus utemur, & balneo frequentiore, multaq; oculorum palpebras aqua calida fouebimus. Cibos autem sumemus acres, & extenuantes.

### Cæsarianum collirium.

**T** medicamentum id quod cæsarianum uocatur, habet atramenti sutorij. P. XI. mysi. P. X. piperis albi. P. XV. papaueris lacrymæ gummi: singulorum. P. XII. cadmiæ lotæ P. XIII. stibis. P. XVI. Satisq; constat hoc collirium aduersus omne genus oculorum ualitudinis idoneum esse, exceptis his, quæ lenibus nutriuntur.

### Hieracis collirium.

**I**demq; quod Hieracis nominatur ad aspritudinem potest. habet myrrhæ. P. XI. ammoniaci. thymiamatis. P. XII. æruginis rasæ. P. XIII. cum aqua pluuiali. Ad idem idoneū est etiam id quod Canopite est: & id quod smilion uocatur, & id quod pyxinum, et id quod St. hærion. Si composita medicamenta nō adsunt, felle capriuo, uel quam optimo melle satis cōmode aspritudo curatur.

### De Xerophthalmia.

**E**t etiam genus aridæ lippitudinis: ξηροφθαλμία, græci appellant: neq; tument, neq; fluunt oculi, sed rubent tantum, et cum dolore quodam grauescunt, & noctu prægrauī pituita inhaerescunt, quantoq; minor generis huius impetus: tanto finis minus expeditus est. In hoc uitio multum ambulare, multum exerceri, lauari sæpe, ibiq; desudare, multaq; frictione uti necessarium est. Abi qui neq; implent, neq; nimium acres, apti sunt: sed inter hos mediū: mane ubi conuexisse manifestum est, non alienum est ex sinapi gargarizare: tum deinde caput, atq; os diutius defricare.

Aurelij Cor.

n

## LIBER

### Rhinion collirium.

**C**ollirium uero aptissimum est, quod Rhinion uocatur. habet myrrhæ. P. XI. papaueris lacrymæ: acaciæ succi, pipis, gummi: singulorum. P. XI. lapidis hæmatitis: lapidis phrygii, lycij, lapidis scissilis singulorum. P. XII. aeris combusti. P. XIII. ac pyxinum quoq; eodem accommodatum est.

### Ad oculos scabros colliria.

**S**i uero scabri oculi sunt, quod maxime in angulis esse consuevit, potest prodesse Rhinion id, quod supra positum est: potest similiter prodesse id, quod habet æruginis rasæ: piperis longi, papaueris lacrymæ: singulorum. P. XII. piperis albi, gummi, singulorum. P. XIII. admixtæ elotæ, cerussæ, singulorum. P. XVI. nullum tamen melius est quàm Euelpidis quod βασιλινδὲν nominabat. habet papaueris lacrymæ, cerussæ, lapidis asij, singulorum. P. XII. gummi. P. XIII. piperis albi. P. XIII. croci. P. XVI. psorici. P. XIII. Nulla autem per se materia est: quæ psoricum nominetur: sed chalcitidis aliquid, & admixtæ dimidio plus ex aceto simul conteruntur, idq; in uas fictile additum, et contactu ficulneis folijs sub terra reponitur: sublaturq; post dies uiginti rursus teritur, & sic appellatur. Verùm in basilico quoq; collirio conuenit ad omnes affectus oculorum id esse idoneum: qui non leuibus medicamentis curantur. Vbi non sunt autem medicamenta composita, scabros angulos leuant, et mel, et uinum. suauitq; & his, & aridæ lippitudini si quis panem ex uino subactum super oculum imponit. nam cum ferè sit humor aliquis, qui modo ipsum oculum, modo angulos aut palpebras exasperat, sic et si quid prodit humoris: extrahitur, & si quid iuxta est, repellitur.

### Ad caligationem oculorum, quæ propter lippitudinem oritur remedia & colliria.

**A**ligre uero oculi nonnunquam ex lippitudine, nonnunq; etiam sine hac propter senectutem, imbecillitatem uel aliâ consuerunt: si ex reliquijs lippitudinis id uitiû est, adiunat collirium, quod asclepias nominatur, adiunat id quod ex crocomagmate fit.

### Διὰ πρόνου collirium.

**P**ropriè etiam ad id componitur: quod διὰ πρόνου uocant. habet piperis. P. XI. croci alidis, papaueris lacrymæ, cerussæ, singulorum. P. XII. psorici, gummi: singulorum. P. XIII.

Ad caligationem oculorum, quæ propter senectutem, aut  
 aliam imbecillitatem fit.

**T** si ex senectute, alia uel imbecillitate id est, recte inungi po-  
 test, & melle quàm optimo, et cyprino, et oleo uetere. Cômô-  
 dissimum tamen est balsami partem unam: & olei ueteris,  
 aut cyprini partes duas, mellis quàm acerrimi partes tres miscere.  
 Vtilia quoq; huic medicamenta sunt, quæ ad caliginē proximè, quæq;  
 ad extenuandas cicatrices supra comprehensa sunt. Cuicunq; uero oca-  
 li caligabunt: huic opus erit multa ambulatione atq; exeratione,  
 frequenti balneo, ubi tutum quidem corpus perficiendum est: præci-  
 pue tamen caput, & quidem irino donec insudet: uelandumq; postea;  
 nec detegendum antequam sudor, & calor domi conquierint. ium a  
 bis utendum acribus & extenuantibus, interpositisq; aliquibus die-  
 bus ex sinapi gargarizandum.

#### De suffusione oculorum.

**S**uffusio quoq; quam græci ὑπόχυσιν nominant: interdum  
 oculi potentia, qua cernit, se opponit. Quod si inueteraue-  
 rit, manu curandum est. Inter initia nonnunquam etiam  
 certis observationibus discutitur. sanguinem ex frōte uel naribus mit-  
 tere, in temporibus uenas adurere: gargarizando pituitam euocare;  
 suffumigare oculos acribus medicamentis, inungere expedit. uictus  
 optimus est qui pituitam extenuat.

#### De resolutione oculorum, quæ paralysis dicitur.

**C**ne resolutio quidē oculorum: quàm παραλυσιν græci no-  
 minant, alio uictus modo, uel alijs medicamentis curanda est.

Exposuisse tantum genus uirij satis est. Igitur interdum eue-  
 nit modo in altero oculo, modo in utroq; aut ex ictu aliquo, aut ex  
 morbo comitali, aut ex distentione neruorum, qua uehementer oculus  
 ipse concussus est, ut his neq; quoquam intendi possit, nec omnino con-  
 sistat, sed huc illuc uel sine ratione moveatur, idcirco ne conspectum  
 quidem rerum præstet.

#### De mydriasi oculorum.

**N**on multū ab hoc malo distat id, quod μυδρίασιν græci no-  
 mant. Pupilla effunditur, & dilatur, aciesq; eius hebetat,  
 ac penē difficillime genus id imbecillitatis eliditur. i utraq;  
 uero id est, et paralysi, & mydriasi pugnandum est p eadē oia, quæ in  
 caligine oculorū præcepta sunt, paucis tantū mutatis: siq; dem ad caput



irino interdum acetum, interdum nitrum adiiciendum est: melle inu-  
 g. satis est. quidam in posteriore uitio calidis aquis usi, releuatiq.  
 quidam sine ulla manifesta causa subito obcaeci sunt. ex quibus nō  
 nulli cum aliquandiu nihil uidissent, repentina profusione alui, lumē  
 receperunt: quo minus alienum uidetur, ex recenti re & interposito  
 tempore medicamentis quoq; moliri deiectiones: quæ omnem noxiā  
 materiam in inferiora depellant.

### De imbecillitate oculorum.

Ræter hæc imbecillitas oculorum est: ex qua quidam inter-  
 p  
 diu satis, noctu nihil cernunt: quod in foeminam bene respo-  
 dentibus menstruis non cadit: sed sic laborātes inungi oportet  
 humore iocineris maxime hircini: si minus, caprini, ubi ad assum not  
 coquitur, excepto: atq; edi quoq; ipsum iecur debet. Licet tamen etiam  
 hysdem medicamentis non inutiliter uti, quæ uel cicatrices, uel aspri-  
 tudinem extenuant: quidam contrito semine portulacæ mel adijcunt  
 eatenus ne id ex specillo destillet: eoq; inungunt. Exercitationibus, bal-  
 neo, frictionibus, gargarizationibus iisdem his quoq; utendum est.

Ad oculos qui extrinsecus offenduntur: cum sanguine suffusi sunt.

T hæc quidem in ipsis corporibus oriuntur. Extrinsecus  
 e uero interdum si ictus oculum lædit, ut sanguis in eo suffun-  
 datur: nihil commodius est: quàm sanguine uel columbæ, uel not  
 palumbi, uel hirundinis inungere: neq; id sine causa fit: cum horum  
 acies extrinsecus læsa interposito tempore in antiquum statum rede-  
 at, celeberrimeq; hirundinis. Vnde etiam locus fabulæ factus est, aut  
 per parietes, aut id herba chelidonio restitui: quod per se sanescit: eo-  
 rum ergo sanguis nostros quoq; oculos ab externo casu commodissime  
 tuetur, hoc ordine, ut sit hirundinis optimus, deinde palumbi, minime  
 effluax columbæ & illi ipsi & nobis. Supra percussum uero oculum  
 ad inflammationem leniendam non est alienum imponere etiam  
 cataplasmata: sed ammoniacus, uel quilibet alius quàm optimus teri  
 debet sic, ut ei paulatim oleum adijciatur, donec crassitudo strigmen-  
 ti fiat. Id deinde miscendum est cum hordeacea farina: quæ ex mulsō  
 decocta sit. Facile autem recognitis oibus, quæ medici quoq; prodide-  
 runt: apparere cuilibet potest uix ullum ex his, quæ supra comprehē-  
 sa sunt: oculi uitium esse, quod non simplicibus quoq; & promptis re-  
 medijs submoueri possit:

**A**ctenus in oculis ea reperiuntur, in quibus medicamentum plurimum possint: ideoque ad aures transeundum est, quarum usum proximum à luminibus natura nobis dedit: sed in his aliquanto maius periculum est: nam vitia oculorum intra ipsos nocet. Aurium inflammationes doloresque, interdum etiam ad dementia, morumque precipitant: quo magis inter initia protinus succurrendum est: ne maiori periculo locus sit. Ergo ubi primum dolorem aliquis sensit: abstinere, & continere se debet. Postero die, si uehementius malum est, caput tondere, idque irino unguento calido perungere, & operire: at magnus cum febre, uigiliaque dolor exigit, ut sanguis quoque mittatur. si id aliqua cause prohibent, alius soluenda est. Cataplasmata quoque calida subinde mutata proficiunt, siue fœni græci, siue lini, siue alia farina ex mulso decocta est. recte etiam subinde admoventur spō græ ex aqua calida expressæ. tum leuato dolore ceratum circumdari debet ex irino, aut cyprino factum. In quibusdam tamen melius, quod ex rosa factum est, proficit. si uehemens inflammatio somnum ex toto prohibet, adijci cataplasmata debent papaueris corticis fricti atque contriti sic, ut ex his pars dimidia sit, eaque tū simul ex passo mixto decoquatur. In aure uero infundere aliquod medicamentum oportet, quod semper ante tepe fieri conuenit: commodissimeque per strigilem instillatur. ubi auris repleta est: super lana mollis addenda est, quæ humorem intus contineat. & hæc quidem cōmunia sunt. Medicamentum uero est & rosæ, & radicum harundinum succus, & oleum in quo lumbrici cocti sunt, et humor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali persici expressus. composita uero ad inflammationem, doloremque leniendum hæc ferè sunt: castorei, papaueris lacrymæ pares portiones conteruntur: deinde adijcitur his passum. uel papaueris lacrymæ, croci, myrrhæ par modus sic teritur, ut inuicem modo rosa, modo passum instilletur, uel id, quod amarum in ægyptia faba est conteritur, & rosa adiecta: quibus myrrhæ quoque paulum à quibusdam miscetur, uel papaueris lacrymæ, aut thus cum muliebri lacte, uel amararum nucum cum rosæ succo, uel castorei, myrrhæ, papaueris lacrymæ pares portiones cum passo: uel croci. P. XI. myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum P. XII. quibus tam teruntur, paulatim miscentur passi cyathi tres, melis minus cyatho: idque ex primis medicamentis est: uel papaueris lacryma ex aceto. Licet etiam compositione uti Themisonis: quæ habet castorei opopanax: papaueris lacrymæ ex aceto, singulorum. P. XII. spumæ lycij. P. XIII. quæ contrita passo excipiuntur donec crati

crassitudinem habeant: atq; ita reponuntur. ubi usus requiritur, rur-  
 sus idem medicamentum adiecto passo, specillo teritur. Illud perpetuū  
 est, quotienscūq; crassius medicamentum est, quā ut in aurem instil-  
 lari possit, adiungendum eum esse humorem, ex quo id componi debet:  
 donec satis liquidum sit. si uero pus quoq; aures habent, recte lycium  
 per se infunditur, aut irinum unguentum, aut porri sucus cum melle,  
 aut centauræ sucus cum passo, aut dulcis punici mali sucus in ipsius  
 cortice tepesfactus, adiecta myrrhæ exigua parte. Recte etiam miscen-  
 tur myrrhæ, quam stacten cognominant. P. XI. croci tantundem, nuce-  
 amaræ. XXV. mellis sesquicyathus, quæ contrita, cum utendum est, in  
 cortice punici mali tepesiant. ea quoq; medicamenta. quæ oris exulce-  
 rati causa componuntur, æq; ulcera aurium sanant: quæ si uetustiora  
 sunt, & multa sanies fluit: apta compositio est, quæ ad auctorem Era-  
 sistratum refertur: piperis. P. XI. croci. P. XI. myrrhæ, mysi cocti, sin-  
 gulorum. P. XII. æris combust. P. XII. hæc ex uino teruntur: deinde  
 ubi inaruerunt, adiunguntur passi heminae tres, & simul coquuntur:  
 cum utendum est, adiicitur his mel, & uinum. Est etiam Itolemæ chi-  
 rurgi medicamentum, quod habet lentisci. P. XI. gallæ. P. XI. ompha-  
 cy. P. XI. sucum punici mali. Est menophili ualidum admodum, quod  
 ex his constat: piperis longi. P. XI. castorei. P. XII. myrrhæ, croci, pa-  
 paueris lacrymæ, nardi syriaci, thuris, malicorij, ex ægyptia faba  
 partis interioris, nucū amararum, mellis quā optimi, singulorum.  
 P. XIII. quibus cum teruntur, adiicitur acetum quā acerrimum,  
 donec crassitudo in his passi fiat. Est Cratonis, cinnamomi, casia, sin-  
 gulorum. P. XI. lycij, nardi, myrrhæ, singulorum. P. XI. aloes. P. XII.  
 mellis cyathi tres, uini sextarius, ex quibus uinum cum lycio deco-  
 quitur: deinde his alia miscentur: at si multum puris, malusq; odor  
 est, æruginis rasæ, thuris, singulorum. P. XII. mellis cyathi duo, aceti  
 quattuor simul incoquuntur: ubi utendum est, dulce uinum miscetur,  
 aut aluminis scissilis, papaueris lacrymæ, acetiæ sicut par pondus mi-  
 scetur: hisq; adiicitur hyoscyami succi dimidio minor quā unius ex  
 superioribus portio: eaq; trita ex uino diluuntur. per se quoq; hyo-  
 scyami sucus satis proficit. Commune uero auxilium aduersus omnes  
 aurium casus: iamq; usu comprobatum Asclepiades composuit. In eo  
 sunt cinnamomi, casia, singulorū. P. XI. flores iunci rotundi, castorei,  
 albi piperis longi, amomi, myrobalani, singulorum scrupuli duo, thu-  
 ris masculi, nardi syriaci, myrrhæ pinguis, croci, spumæ nitri, singulo-  
 rum. P. XII. quæ separatim contrita, rursus mixta ex aceto conterun-  
 tur: atq; ita condita, ubi utendum est, aceto diluuntur. eodem modo cō-  
 mune auxilium auribus laborantibus est. Polybi sphragis ex dulci ui-



no liquata: quæ compositio priore libello continetur. quod si & sanies profluit, & tumor est, non alienum est, mixto uino per oricularium clysterem eluere: & tum infundere uinum austerum cum rosa mixtum: cui spody paulum sit adiectum, aut lycium cum lacte, aut herbæ sanguinalis succum cum rosa, aut mali punia succum cum exigua parte myrrhæ: si sordida quoque ulcera sunt, melius mulso eluuntur: & tum aliquod ex his quæ supra scripta sunt, quod mel habeat, infunditur: si magis pus profluit, & caput utique tondendum est, et multa calida aqua perfundendum, & gargariandum, & usque ad lassitudinem ambulandum, et cibo modico utendum est. si cruor quoque ex ulceribus apparuit, lycium cum lacte debet infundi, uel aqua, in qua rosa decocta sit, succo aut herbæ sanguinalis, aut a. ac. æ. adiecto. quod si super ulcera caro increuit, eaque mali odoris sanguine fundit, aqua tepida elui debet: tum infundi id, quod ex thure, & ærugine, & aceto, & melle fit: aut mel cum ærugine incoctum: squama quoque aeris, cum sandaraca contrita per fistulam recte insillatur.

#### Aduersus aurium uermes.

Bi uero uermes orti sunt, si iuxta sunt, protrahendi oriculario specillo sunt: si longius, medicamentis enecandi: auendumque, ne postea nascentur. ad utrumque proficit album uetratum cum aceto contritum: flui quoque aurem oportet uino, in quo marrubium decoctum sit. sic emortui uermes in primam auris partem prouocabuntur: unde facillime educi possunt.

#### Ad compressa aurium foramina.

In foramen auris compressum est, & intus crassa sanies subest, mel quam optimum addendum est: si id parum proficit, mellis cyatho & dimidio, æruginis rasæ. P. XII. adijciendum est: incoquendumque, & eo utendum. Iris quoque cum melle idem proficit. Item mellis, & rosæ scrupuli duo. Item galbani. P. XII. myrrhæ cum melle, & fellis taurini, singulorum. P. XII. uini quantum satis est ad myrrham diluendam.

#### Ad grauem auditum.

Bi uero grauius aliquis audire coepit, quod maxime post longos capitis dolores euenire consuevit: in primis aurem ipsam considerare oportet. Apparebit enim aut crusta qualis super ulcera innascitur, aut sordium coitus: si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cum melle ærugo, uel porri suauis, aut cum mulso nitri paulum: atque ubi crusta à corpore iam recedit,

eluenda auris aqua tepida est: quo facilius ea per se diducta, oricula-  
lario specillo protrahatur. si sordes æque molles sunt, eodem specillo  
eximendæ sunt. at si duræ sunt: acetum, & cum co nitri paululum  
coniectum est. Cumq; emollitæ sunt, eodem modo elui aurem, purga-  
riq; oportet. quod si capitis grauitas manet: attendendum idem, &  
leniter, sed diu perfricandum est, adiecto uel irino, uel laureo oleo sic,  
ut utrilibet paulum aceti misceatur: tum diu ambulandum, leniterq;  
post unctionem aqua calida caput fouendū: Cibusq; utendum ex im-  
becillissima & media materia, magisq; assumendæ dilutæ: potiones:  
nonnunq; gargariandum est. Infundendum autem in aurem casto-  
reum cum aceto, & laureo oleo, & succo radicula corticis: aut cucume-  
ris agrestis succus adiectis contritis rosæ folijs: immaturæ quoq; uinæ  
succus cum rosa inflatus aduersus sordiditatem satis proficit.

#### Ad sonitum aurium intra se ipsas.

Liud uitij genus est: ubi aures intra se ipsas sonant: atq; hoc  
quoq; fit, ne externum sonum accipiant: leuissimum est, ubi  
id ex grauedine est. peius: ubi ex morbis, capitis' ue longis do-  
loribus incidit. Pessimum: ubi magnis morbis uenientibus, maximeq;  
comitiali: prouenit. Si ex grauedine est: purgare aurem oportet, et spi-  
ritum continere, donec inde humor aliquis expumet: si ex morbo uel  
capitis dolore, quod ad exercitationē, frictionem, perfusionem, gargari-  
tationemq; pertinet, eadem faciendæ sunt: cibus nō utendum nisi ex-  
tenuantibus: in aurem dandus radicula succus cum rosa, uel cum suc-  
co radicis ex cucumere agresti, uel castoreum ex aceto et laureo oleo,  
ueratrum quoq; cum aceto conteritur: deinde melle cocto excipitur, &  
inde collirium factum in aurem demittitur: si sine his cepit, ideoq;  
nouo metu terret, in aurem dari debet castoreum cum aceto uel iri-  
no, uel laureo oleo, aut huic mixtum castoreū cum succo naccum ama-  
rarum, aut myrrha & nitrum, cum rosa et aceto. Plus tamen in hoc  
quoq; proficit uictus ratio: eademq; faciendæ sunt: quæ supra compre-  
hendi: cum maiore quoq; diligentia, & præterea, donec his sonus fi-  
niatur, à uino abstinendum. quod si simul & sonus & inflammatio,  
laureum oleum conicasse abunde est, aut id quod ex amaris nucibus  
exprimitur: quibus quidam uel castoreum, uel myrrham miscent.

#### Ad ea, quæ in aurem inciderunt extrahenda.

¶ Olet etiam interdum in aurem aliquid incidere, ut calculus,  
aliquod'ue animal. Si pulex intus est: compellendum eò lanæ  
paulum est, quo ipse is subit, & simul extrahitur: si non est secutus,  
aliud'ue

aliud'ue animal est, specillum lana inuolutum in resinam quam glutinosissimam, maximèq; terebinthinam demittendum, idq; in aurem coniiciendum, ibiq; uertendum est. Vtiq; enim comprehendet & eximet: sin aliquid ex aume est: specillo oriculario protrahendum est, aut hamulo retuso, paulum recuruato: si ista nihil proficiunt, potest eodem modo resina protrahi: sternutamenta quoq; admota id commode elidunt, aut oriculario clystere aqua uehementer intus compulsa: tabula quoq; collocatur media inhaerens capitibus utrinq; pendentibus, superq; eam homo deligatur in id latus uersus, cuius auris eo modo laborat sic, ut extra tabulam emineat. Tum malleo caput tabulae, qd à pedibus est, feritur: atq; ita concussa aure, id quod inest: excidit.

De narium morbis, & curationibus. Cap. VIII.

Ares uero intus exulceratas fouere oportet uapore aquae  
 n calidae, idest spongia expressa atq; admota: fit & subiecto  
 uase oris angust, calida aqua repleto. Post id fomentum illi-  
 nenda ulcera sunt, aut plumbi cremēto, aut cerussa, aut argenti spu-  
 mam cum quolibet horum aliquis conterit: eiq; dum teritur inuicem  
 uinum & oleum myrteum adijcit, donec mellis crassitudinem fecerit.  
 si autem ea ulcera circa nares sunt, pluresq; crustas, & odorem fo-  
 dum habent, quod genus graeci ὀζαίνας appellant: sciri quidem de-  
 bet, uix ei malo posse succurri. Nihilominus tamen haec tentari pos-  
 sunt, ut caput ad autem tondeatur, assidueq; uehementer perfricetur:  
 multa calida aqua perfundatur: multa ei deambulatio sit: abus mo-  
 dicus: neq; acer, neq; ualentissimus: tum in nares ipsam mel cum exi-  
 guo modo resinae terebinthinæ conijciatur: quod specillo quoq; inuoluto  
 lana fit, attrahaturq; spiritus is suauis, donec in ore gustus eius sentia-  
 tur: sub his enim crustae resoluantur, quae tum per sternutamenta eli-  
 di debent: puris ulceribus uapor aquae calidae subiiciendus est: dein-  
 de adhibendum, aut lycium ex uino dilutum, aut amurca, aut ompha-  
 cum, aut menthae, aut marrubij suauis, aut atramentum sutorium, quod  
 candens factum, deinde contritum sit, aut interior scyllae pars con-  
 trita sic, ut horum cuilibet mel adijciatur: cuius caeteris admodum exi-  
 gua pars esse debet: in atramento sutorio tanta, ut ea mixtura liquida  
 fiat, cum scylla utiq; pars maior: inuoluendumq; lana specillum est,  
 & in eo medicamento intinguendum, eoq; ulcera implenda sunt: rur-  
 susq; linamentum inuolutum, & oblongum eodem medicamento illi-  
 nendum, demittendumq; in nares est, & ab inferiore parte leniter  
 deligandum: idq; per hyemem & uerbis die, per aestatem & auri-



num, ter die fieri debet, interdum uero etiam in naribus carunculae quaedam similes muliebribus mammis nascuntur, hæcque in partibus, quæ carnosissimæ sunt inhaerent. Has curare oportet medicamentis adurentibus: sub quibus ex toto consumuntur. Polypus uero est caruncula modo alba, modo subrubra, quæ narium osse inhaeret, et modo ad labra pendens nares implet, modo retro per id foramen, quo spiritus à naribus ad fauces descendit, adeo increfcit, uti post unā conspicia possit, strangulatque hominem maxime austro aut euro flante: ferèque mollis est, raro dura, eaque magis spiritum impedit, et nares dilatat: quæ ferè uapuriwides est: itaque attingi non debet. illud aliud genus, ferè quidem ferro curatur, interdum tamen inarescit: si addita in nares per linamentum, aut penicillum ea compositio est, quæ habet minij sinopici, chalcitis, calcis, sandaracæ, singulorum. P. X. I. atramenti sutorij. P. XII.

De dentium dolore, et curationibus. Cap. IX.

i Dentium autem dolore, qui ipse quoque maximis tormentis annumerari potest, uinum ex toto circueidendum est. cibo quoque primo abstinendum, deinde eo modico, mollique: utendum, ne mandentis dentes irriter: tum extrinsecus admouendus per spongiam uapor aquæ calidæ, imponendumque ceratum ex cyprino, aut irino factum, lanaque id comprehendendum, caputque uelandum est. quod si grauior is dolor est: utiliter et alius ducitur, et calida cataplasmata super maxillas iniiciuntur, et ore humor calidus cum medicamentis aliquibus continetur, sæpiusque mutatur: cuius rei causa et quinq; folij radix in uino mixto coquitur, et hyoscyami radix, uel in posca, uel in uino mixto coquitur sic, ut paulum his salis adijciatur, et papaueris non nimium aridi cortices, et mandragoræ radix eodem modo. sed in his tribus utique uitandum est, ne quod austum erit, deuoretur: ex populo quoque alba cortex radialis in hunc usum in uino mixto recte coquitur, et in aceto cornu ceruinum rasum, et nepeta cum teda pingui: ac ficus item pinguis, uel in mulso, uel in aceto, et melle: ex quibus cum ficus decocta est, is humor percolatur. speculum quoque lana inuolutum in calidum oleum demittitur, eoque ipso dens fouetur. quinetiam quaedam quasi cataplasmata in dentem ipsum illinuntur: in quem usum ex malo punico acido, atque arido malicorij pars interior cum pari portione, et gallæ et pinei corticis conteritur, misceturque his minium, eaque contrita aqua pluuiali coquantur, aut panacis, papaueris lacrymæ, peucedani, nuæ taminie sine seminebus

pares portiones contreruntur, aut galbani partes tres, papaueris lacrymæ pars quarta. Quicquid dentibus admotum est, nihilo minus supra maxillam ceratum, quale supra posui: esse debet: lana obtectum: quidam etiam myrrhæ, cardamomi, singulorum. P. XI. croci, pyretri: ficorum partes: singulorum. P. XI. Sinapis. P. XVIII. contrita linteolo illinant, imponuntq; in humero partis eius, qua dens dolet: si is superior est, à scapulis: si inferior, à pectore: idq; dolorem leuat: & cum leuauit, protinus submoendum est: si uero exesus est dens, festinare ad eximendum eum, nisi res coegit, non est necesse: sed cum omnibus fomentis, quæ supra posita sunt, adiiciendæ quædam ualentiores compositiones sunt, quæ dolorem leuant: quales hæc sunt. habet autem papaueris lacrymæ. P. XI. piperis. P. XII. pforeos. P. XX. quæ contrita galbano excipiuntur, idq; circumdatur: aut Menemachi maxime ad maxillares dentes in qua sunt croci. P. XI. cardamomi, thuris, fuliginis: ficorum partes, pyretri, singulorum. P. XIII. sinapis. P. XVIII. Quidam autem immiscet pyretri, piperis, elaterij, singulorum. P. XI. aluminis scissilis: papaueris lacrymæ, unæ taminie, sulphuris ignem non experti, bituminis, lauri baatarum, sinapis, singulorum. P. XII. Quod si dolor eximi eum cogit, & piperis semen cortice liberatum, & eodem modo baarum hederæ coniecta in id foramen, dentem findit, isq; forte stans excidet: & plani piscis quàm pastinacæ nostri, πούρωα græci uocant, aculeus torretur: deinde conteritur, resinaq; excipitur, quæ denti circumdata hunc soluit: & alumen scissile in id foramen coniectum dentem citat: sed id tamen inuolutum in lanula demitti commodius est, quia sic dente seruato dolorem leuat. Hæc à medicis accepta sunt: sed agre stum experimento cognitum est, cum dens dolet, herbam mentastrum cum suis radicibus uelli debere, & in peluem conijci, supraq; aquam infundi, collocariq; iuxta sedentem hominem undiq; ueste contextum: tum in peluem candentes silices demitti sic, ut aqua tequantur, hominemq; eumhiantem ore uaporem excipere, ut supra dictum est undique inclusum. nam & sudor plurimus sequitur, & per os continens pituita defluit, idq; sæpe longorem, sæpe annuam ualitudinem bonam præstat.

De tonsillis, & earum cura.

Cap. X.

¶ I uero tonsillæ sine exulceratione per inflammationem intumuerunt, caput uelandum est extrinsecus: is locus uapore calido fouendus, multa ambulatione utendum, caput in lecto sublime

## LIBER

habendum, gargarizandumq; est ex reprimentibus. radix quoq; ea: quam dulcem appellant contusa & in passo, mulso'ne decocta idem præstat. leniterq; quibusdam medicamentis eas illini non alienū est: quæ hoc modo fiunt ex malo punico dulci succus exprimitur, & eius sextarius in leni igne coquitur, donec ei mellis crassitudo sit: tum croci, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum. P. XII. per se conteruntur, paulatimq; his adiunguntur vini lenis cyathi duo, mellis unus: deinde priori succo ista miscentur, & rursus leniter incoquantur: aut eiusdē succi sextarius eodem modo coquitur, atq; eadem ratione trita ei adiunguntur hæc nardi. P. XV. omphacij. P. XI. cinnamomi, myrrhæ, cassiæ, singulorum. P. XI. eadem autem hæc & auribus & naribus purulentis accommodata sunt. Cibus quoq; in hac ualitudine lenis esse debet ne exasperet, quod si tanta inflammatio est, ut spiritum impediat, in lecto conquiescendum, à cibo abstinendum, neq; assumendum quicquam præter aquam calidam est: alvus quoq; ducenda est: gargarizandum ex fico & mulso: illinendum mel cum omphacio: intrinsecus admoëndus, sed aliquanto diutius uapor aquæ calidæ, donec ea suppurent, et per se aperiantur: si pure substante non rumpuntur hi tumores, incidendi sunt: deinde ex mulso calido gargarizandum ex fico: at si modicus quidem tumor & exulceratio est, furfurum cremori ad gargarizandum paulum mellis adijciendum est: illinendaq; ulcera hoc medicamento. passi quamdulcissimi tres heminæ ad unā coquantur: tum adijatur thuris. P. XI. croci, myrrhæ: singulorum. P. XI. leniterq; cōa rursus feruescunt. ubi pura ulcera sunt, eodem furfurum cremore, uel lacte gargarizandum est. atq; hic quoq; cibis lenibus opus est: quibus adijci dulce uinum potest.

De oris ulceribus, & curationibus, & quæ antheræ sunt. Cap. XI.

Ulcera autem oris, si cum inflammatione sunt, & parum pura ac rubicunda sunt: optime his medicamentis curantur, quæ supra posita ex malis punicis fiunt: continendusq; sæpe ore reprimens cremor, cui paulum mellis sit adiectum: utendum ambulationibus, et non acri cibo. simulatq; uero pura ulcera esse cœperunt, lenis humor, interdum etiam quàm optima aqua ore continenda est. predestq; assumptum pyrum mitium, pleniorq; cibus, dum acribus uacet. inspergq; ulcera debent alumine scissili, cui dimidio plus gallæ immaturæ sit adiectum. si iam crustas habent, quales in adustus esse consuerunt, adhibendæ sunt hæ compositiones, quas græci ἀρβυπὰς nominant. Iunci quadrati, myrrhæ, sanda-



sandaracæ, singulorum. P. XIII. aluminis pares portiones: aut croci, myrrhæ, singulorum. P. XII. iridis, aluminis, scissilis, sandaracæ: singulorum. P. XIII. iunci quadrati. P. XVIII. aut gallæ, myrrhæ: singulorum. P. XII. aluminis, scissilis. P. XII. rosæ foliorum. P. XIII. quidam autem croci. P. X. aluminis, scissilis, myrrhæ: singulorum. P. XI. sandaracæ. P. XII. iunci quadrati. P. XIII. miscent. Priora arida imperguntur: hoc cum melle illinitur neq; ulceribus tantum, sed etiã tonsillis. Verũ ea longe periculosissima ulcera sunt, quas æp̃baos græci appellant, sed in pueris. hos enim sæpe consumunt: in uiris et mulieribus idem periculum non est. Hæc ulcera à ginguis incipiunt, deinde palatum, totumq; os occupant: tum ad unã, faucesq; descendũt. quibus obsessis non facile fit, ut puer conualescat. ac miserius etiam est: si lactans adhuc infans est: quo minus imperari remedium aliquod potest: sed in primis nutrix cogenda est exerceri ambulationibus, hisq; operibus, quæ superiores partes mouet: mittenda in balneum, iubendaq; ibi calida aqua mammæ perfundere: tum alenda cibis lenibus, & his qui facile non corrumpuntur. Potiones, si febricitat puer, aquæ: si sine febre est: uini diluti. Ac si alius nutritia substitit: ducenda est. Si pituita eius in os coit, uomere debet. Tum ipsa ulcera punienda sunt melle, cui rh̃us: quem syriacum uocant, aut amara nacer adiectæ sunt, uel mixtis inter se rosæ folijs aridis, pineis nucleis, mentæ colliculo, melle: uel eo medicamento, quod ex moris fit: quorum succus eodem modo quo pruni mali ad mellis crassitudinem coquitur: eademq; ratione ei crocum, myrrha, alumen, uinum, mel miscetur: Neq; quicquam dandum, ad quod humor euocari possit. Si uero iam firmior puer est: gargarizare debet his ferè, quæ supra comprehensa sunt. at si lenia medicamenta in eo parum proficiunt: adhibenda sunt ea, quæ adurẽdo crustas ulceribus inducant: quale est scissile, alumen, uel chalatis, uel atramentum sutorium: prodest etiam fames & abstinentia quanta maxime imperari potest. Cibus debet esse lenis. Ad purganda tamen ulcera interdum asceus ex melle recte datur.

## De ginguarum ulceribus. Cap. XII.

8 Inguæ quoq; ulcera non alijs medicamentis egent, quàm quæ prima parte superioris capitis exposita sunt: sed quæ in latere eius nascuntur: diuissime durant. Videndumq; est num contra dens aliquis acutior sit, qui sanescere sæpe ulcus eo loco non sinit: ideoq; limandus est. solent etiam interdum iuxta dentes in ginguis tubercula quedam oriri dolentia, τὰ ποδόντια græci

ing. le ap  
hæc  
105. Ep̃baos  
C. 1. 2. 3. ca. 7. ad g. 10  
intelligunt æp̃baos mot. d.  
C. 1. 2. 3. ca. 17. C. 1. 2. 3. ca.  
ti. 1. 2. 3. ca. 17. C. 1. 2. 3. ca.  
8. 1. 2. 3. ca. 17. C. 1. 2. 3. ca.  
22. ca. 23.

appellant. hæc initio leniter sale contrito perfricare oportet, aut inter se mixtis sale fossili, combusto cupresso, nepeta, deinde eluere os cremore lenticulæ, & inter hæc hiare: donec pinitæ satis profuat. In maiore uero inflammatione ijsdem medicamentis utendum est: quæ ad ulcera oris supra posita sunt, & mollis linamenti paulum inuol- uendum aliqua compositione ex his, quæ ἀρνίαις uocari dixi, demit- tendumq; id inter dentem, & gingiuam: quod si durior erit, & id prohibebit, extrinsecus admouendus erit spongæ uapor calidus, im- ponendumq; ceratū. Si suppuratio se ostendit: diutius eo uapore utē- dum erit, & continendum ore calidum mulsū, in quo ficus deacta sit. Itemq; subcrudum incidendum, ne si diutius ibi pus permanse- rit, os lædat. quod si maior is tumor est, commodius totus exciditur, sic, ut ex utraq; parte dens liberetur. Ture exempto, si leuis plaga est, satis est ore calidam aquam continere, & extrinsecus fouere eo- dem uapore: si maior est, lenticulæ cremore: uti hisdem medicamen- tis, quibus cætera ulcera oris curantur: alia quoq; ulcera in ginguis plerumq; oriuntur: quibus eadem quæ in reliquo ore succurrunt. maxime tamen mandere ligustrum oportet, succumq; cum ore conti- nere. Fit etiam interdum, ut ex gingiæ ulcere, siue παρὰ ὀντίς fuit, siue non fuit, diutius pus feratur: quod aut dēte corrupto, aut fracto, uel aliter uiciato osse, maximq; id per fistulam uenire cōsuevit. ubi incidit, locus aperiendus, dens eximendus, testa ossis, si qua exassit re- cidenda est: si quid uiciosi est, radendum. post quæ quid fieri debeat, supra in aliorum ulcerum curatione comprehensum est: si uero à dē- tibus gingiæ recedunt, eadem ἀρνίαι succurrunt. Vtile est etiam pira, aut mala non per matura mandere, & ore cum humorem con- tinere. Idemq; præstare non acre acetum in ore retentum potest.

## De uia morbo &amp; curatione.

Cap. XIII.

Ve uehemens inflammatio terrere quoq; debet: itaq; in hac & abstinentia necessaria est, & sanguis recte mittitur: & si id aliquares prohibet, aliud utiliter ducitur, capuiq; si per hæc uelandum, & sublimius habendum est: tum aqua gargari- zandum, in qua simul rubus, & lenticula deacta sit. Illinenda autem ipsa uia uel omphacio, uel galla, uel alumine scissili sic, ut cuilibet eorum mel adijciatur. Est etiā medicamentum huic aptum, quod An- dronium appellatur. constat ex his: alumine scissili: squama aris ru- bri: atramento sutorio, galla, myrrha, mysi: quæ p se contrita, mixtaq; rursus paulatim adiecto uirgo austero teruntur, donec is nullis crassi

174  
S. 9. 4

tudo sit. ubi horum aliquo illita una est: chelidonie quoq; succo per cochlear illita una maxime prodest. Ferè multa pituita decurrit, cumq; ea quieuit, ex uino calido gargarizandum: quod si minor in ea inflammatio: laser terere: eiq; adycere frigidam aquam satis est, eamq; aquam cochleario exceptam ipsi unæ subijcere, ac mediocriter eam tumentem aqua quoq; frigida eodem modo subiecta reprimat. Ex eadem autem aqua gargarizandum quoq; est, quæ uel cum lasere, uel sine eo hac curatione unæ subiecta est.

## De cancro oris. Cap. XV.

Iquando autem ulcera oris cancer inuasit, primum considerandum est, num malus corporis habitus sit, eiq; occurrèdum. deinde ipsa ulcera curanda. quod si in summa parte id uicium est: satis proficiat *ἀνθράξ* humido ulceri arida inspersa, sicciore, cum exigua parte mellis illita: si paulo altius: chartæ combustæ partes duæ, auri pigmenti pars una: si penitus malum descendit: chartæ combustæ partes tres, auripigmenti, pars quarta, aut pares portiones salis fricti & iridis frictæ: aut item pares portiones chalcitidis, calas, auripigmenti. Necessarium autem est linamentum in rosa tingere: & super adurentia medicamenta imponere, ne uicinum, et sanum locum lædant, quidam etiam in acris aceti heminam frictum salem coniungunt, donec tabescere desinat: deinde id acetum coquant, donec exsiccetur: eumq; salem contritum inspergunt. quotiens autem medicamentum iniicitur, & ante, & post: os diluendum est uel cremore lenticulæ, uel aqua: in qua aut erui, aut oleæ, aut uerbena decoctæ sint sic, ut cuilibet eorum paulum mellis misceatur. acetum quoq; ex scylla retentum ore, satis aduersus hæc ulcera proficiat: ex aceto cocto sali, sicut supra demonstratum est, rursus mixtum acetum: sed & diu continere utrunlibet, & id bis, aut ter die facere, prout uehemens malum est, necessarium est. quod si puer est, cui id incidit: specillum lana inuolutum in medicamentum demittendum est, & super ulcus tenendum, ne per imprudentiam adurentia deuoret. Et si dolor in gingiuis est, mouenturq; aliqui dentes: refici eos oportet: nam curationes uehementer impediunt. si nihil medicamenta proficiant: ulcera erunt adurenda: quod tamen in labris ideo non est necessarium: quoniam ex cidere commodius est. et id quidem æque adustum, atq; excisum sine ea curatione, quæ corpori manu adhibetur: impleri non potest. Ginguarum uero ossa, quæ hebetia sunt: in perpetuum uestione nudantur. neq; enim postea atro increfcit. Imponenda tamen adustis lentacula est, donec sanitatem, qualis esse potest, recipiant.



Aec in capite ferè medicamentis egent. Sub ipsis uero auribus oriri παρωτίδες solent, modo in secunda ualitudine ibi inflammatione orta, modo post longas febres, illuc impetu morbi conuerso. Id abscessus genus est: itaq; nullam nouam curationem desiderat: anima dersionem tantummodo hanc habet necessariam: quia si sine morbo id intumuit, primum reprimendum experimentum est: si ex aduersa ualitudine illud inimicum est, maturariq; & q̄ primum aperiri commodius est.

## De umbilici prominentis curatione. Cap. XVII.

D umbilicos uero prominentes, ne manu, ferroq; utendum sit: ante tentandum est, ut abstineat: alius his ducatur, imponatur super umbilicum id, quod ex his constat. Cicuta, et fuliginis: singulorum. P. XI. cerussæ elotæ. P. XIII. plumbi eloti. P. X. VIII. ouis duobus: quibus etiam solani suauis adiçatur. Hoc dilutius impositum esse oportet, & interim conuiescere hominem: abo modi eo uti sic, ut uidentur omnia instantia.

## De obscenarum partium uicijs, &amp; curationibus. Cap. XVIII.

Roxima sunt ea, quæ ad partes obscenas pertinent, quarum apud græcos uocalula & tolerabilius se habent, & accepta iam usu sunt cum omni ferè nudicorum uolumine atq; sermone iactentur, apud nos scædiora uerba ne consuetudine quidem aliqua uerecundius loquentium accommodata sunt. ut difficilis hæc explanatio sit simul & pudorem & artis præcepta seruantibus. neq; tamen ea res à scribèdo detertere me debuit. Primum ut omnia, quæ salutaria accipi, comprehenderem: dein quia in uulgis eorum curatio etiã præcipue cognoscenda est, quæ inuitissimus quisq; alteri ostendit.

## De colis morbis, &amp; curationibus.

Citur si ex inflammatione coles intumuit: reduciq; summa cutis, aut rursus induci non potest, multa calida aqua fouendus locus est. Vbi uero glans contracta est, oriculario quocq; clystere inter eam cutemq; aqua calida inferenda est. Si mollita sic & extenuata cutis ducenti paruit, expeditior reliqua curatio est: si  
tumor

tumor uicit: imponenda est uel lenticula, uel marrubium, uel oleæ folia ex uino cocta sic, ut cuilibet eorum, dum teritur, mellis paulum adijciatur: sursumq; coles ad uentrem deligandus est. quod in omni curatione eius necessarium est, usq; homo continere se debet, & abstinere à cibo, & potione aquæ tantum. si uindictari. à postero die rursus adhibendum hisdem rationibus aquæ fomentum est, & cum ui quoq; experiundum, an cutis sequatur: eaq; si non parebit, leniter summa scilicet pello concedenda erit: nā cū sanies profluxerit: extenuabitur his locus, & facilius cutis ducetur. Sine autē hoc modo uicta erit, sine nunquam repugnauerit, ulcera uel in cutis ulteriore parte, uel in glande, ultra uel eam in cole reperientur, quæ necesse est, aut putrefacta uel sint, aut humida & purulenta. si facta sunt, primum aqua calida fouenda sunt: deinde imponendum lycium ex uino est, aut amurca cocta cum eodem, aut cum rosa butyrum: si leuis is humor est, uino eluenda sunt: tum butyri & rosæ mollis paulum, & resinae teribimbina pars quarta adijcenda est, eoq; utendum: aut si pus ex his profluit, ante omnia elui mulsio calido debet. tum imponi piperis. P. XI. myrrhæ. P. XII. croci, mysi cocti singulorum. P. XII. quæ ex uino austero coquantur, donec mellis crassitudinem habeant. Eadem autem compositio tonsillis, unæ madentiori, nariumq; ulceribus ac commodata est. Aliud ad eam, piperis. P. XI. myrrhæ. P. XI. croci. P. XII. mysi cocti P. XI. aeris combusti. P. XII. quæ primum ex uino austero conteruntur, deinde ubi inauerunt: iterum teruntur ex passi tribus cyathis, & incoquantur: donec uisci crassitudinem habeant. Aerugo quoq; cum cocto melle, & ea quæ ad oris ulcera supra comprehensa sunt, curant: aut Erasistrati compositio, aut Cratonis recte super purulentia naturalia imponitur. folia quoq; oleæ ex nouem cyathis uini coquantur. his adijciatur aluminis scissilis. P. XIII. lycij. P. XVIII. mellis sesquicyathus: ac si plus purus est, id medicamentum ex melle: si minus, ex uino diluitur. Illud perpetuum est: post curationem, dum inflammatio manet, quale supra positum est, cataplasma supra dare: & quotidie ulcera eadem ratione curare: quod si pus & multum et cum malo odore cœpit profluere, elui cremore lenticulæ debet sic, ut ei mellis paulum adijciatur, aut oleæ, aut lentisci folia, uel marrubiū decoquendum est. eoq; humore eodem modo cum melle utendum, imponendaq; eadem, aut etiam omphacum cum melle, aut id quod ex ærugine & melle ad aures fit, aut compositio Andronis, aut ἀνδρονῆς sic, ut ei paulum mellis adijciatur. quidam ulcera omnia, de quibus adhuc dictum est, lycio ex uino curant. Si uero ulcus latius atq; altius serpit, eodem modo elui debet: imponi uero, aut ærugo, aut omphacū

cum melle, aut Andronis compositio, aut marrubij, myrrhae, aut croci, aluminis scissilis cocti, rosae foliorum aridorum, gallae, singulorum. P. XI. minij sinopici. P. XII. quae per se singula primum teruntur, deinde iuncta iterum melle adiecto, donec liquidi cerati crassitudinē habeant: tum in aeneo vase leniter coquantur, ne superfluant: cum iā guttae indurescūt, vas ab igne remouetur, idq; medicamentum tum, pro ut opus est, aut ex melle, aut ex uino liquatur. Idem autem per se etiā ad fistulas utile est. Solet etiam interdum ad neruos ulcus descendere: profluitq; pituita multa, sanies tenuis maliq; odoris, non cocta, aut aquae similis, in qua cito recens lora est. doloresq; is locus, & punctiones habet: id genus quamuis inter purulenta est, tamen lenibus medicamentis curandum est: quale est emplastrum tetrapharmacum ex rosa liquatum sic, ut thuris quoq; paulum ei misceatur: aut id quod ex butyro, rosa, resina, melle fit. supra uero à me positum est. praecipueq; id ulcus multa calida aqua fouendum est, uelandumq; neq; frigori committendum. Interdum autem per ipsa ulcera coles sub cute exesus sic, ut glans excidat. sub quo casu cutis ipsa circuncidenda est. perpetuumq; est, quotiens glans, aut ex cole aliquid, uel exadit, uel absconditur: hanc non esse seruandam, ne confidat, ulceriq; agglutinetur, ac neq; reduci possit postea, & fortasse fistulam quoq; urinae claudat. Tubercula etiam, quae *φύματα* graeco uocant circa glandem oriuntur, quae uel medicamentis, uel ferro aduruntur, & cum crustae exciderunt, squama aeris inspergitur, ne quid ibi rursus increseat.

De cancro, qui in cole nascitur, curatione.

Aec citra cancerum sunt, qui cum in reliquis partibus, tum  
 b in his quoq; uel praecipue ulcera infestat. incipit à nigritie, quae si cutem occupauit: protinus specillū subiiciendum, eaq; incidenda est: deinde ora uulsella prehendenda: tum quicquid corruptum est: excidendum sic, ut ex integro quoq; paulum demat, idq; adurendum. quotiens quid uisum est, id quoq; sequitur, ut imponenda lentacula sit: deinde ubi crustae exciderunt, ulcera sic, ut alia curetur. at si cancer ipsum colem occupauit: inspargenda aliqua sunt ex adurentibus, maximēq; id quod ex calae, chalatiide, auripigmento componitur. si medicamenta uincuntur, hic quoq; scalpello quicquid corruptum est sic, ut aliquid etiā integri trahat, praecidi debet. illud quoq; aeq; perpetuum est, excocto cancro uulnus esse adurendum: sed siue ex medicamentis, siue ex ferro crustae occiderunt, magnum periculum est, ne his decedentibus ex cole profusio sanguinis insequatur: ergo longā quiete & immobili penè corpore opus est, donec ex ipso crustae



puræ leniter resoluantur. at si uel uolens aliquis, uel imprudens, dum ingreditur immature, crustas diduxit, & fuit sanguis, frigida aqua adhibenda est: si hæc parum ualet, decurrendum est ad medicamenta, quæ sanguinem supprimunt. si ne hæc quidem succurrunt, aduri diligenter & timide debet, neq; ullo postea motu dandus eidem periculo locus est.

De phagedænæ in cole nascentis curatione.

Nonnunquam etiam id genus ibi atnceri, quod *φαιδαίνα* à  
 n græcis nominatur, oriri solet, in quo minime differendum:  
 sed protinus hujusdem medicamenti occurrendum est, & si  
 parum ualent: ferro adurendum. quædam etiam nigrities est, quæ nõ  
 sentitur & serpit, ac si sustinuiimus usq; ad uesicam tendit: neq; suc-  
 curri postea potest. si id in summa glande circa fistulâ urinæ est, pri-  
 us in ea tenue specillum demittendum est, ne claudatur: deinde id fer-  
 ro adurendum: si uero alte penetrauit, quicquid occupatum est, præ-  
 cidendum est. cæterum eadem, quæ in alijs canceris, facienda sunt.

De carbunculo qui in cole nascitur.

Caulescit etiam in cole interdum aliquid: idq; omni penè  
 o sensu caret: quod ipsum quoq; excidi debet. Carbunculus au-  
 tem ibi natus, ut primum apparet, oriculario clystere eluē-  
 dus est: deinde ipse quoq; medicamentis urendus, maximeq; chalciti-  
 de cum melle, aut ærugine cum cocto melle, aut ouillo stercore & con-  
 trito cum eodem melle: ubi is excidit, liquidis medicamentis utendum  
 est, quæ ad ora ulceris componuntur.

De testiculorum morbis, & eorum curatione.

Non testiculis uero si qua inflammatio sine ictu orta est: san-  
 i guis ex talo mittendus est: à cibo abstinendum: impo-  
 nendum ex faba farina ex mulso cocta cum cumino contri-  
 to ex melle cocto, aut contritum cuminum cum cerato ex rosa facto:  
 aut lini semen frictum, contritum, & in mulso coctum, aut tritici fari-  
 na ex malsa cocta cū cupresso, aut lilij radix contrita, aut si ijdē in-  
 duruerunt, imponi debet lini uel foeni græci semen ex mulso coctum,  
 aut ex cyprino ceratum, aut similia ex uino contrita, cui paulū croci  
 sit adiectum. si uetustior iā durities est, maxime proficiat cucumeris  
 agrestis radix ex mulso cocta, dein contrita. si ex ictu tument, sangui-  
 nē mitti necessariū est, magisq; si etiā liuent. Imponendū uero utrū-  
 libet ex his quæ cum cumino componuntur, supraq; proposita sunt:

aut ea compositio, quæ habet nitti cocti. P. XI. resinæ pineæ, gummi, singulorum. P. XII. unæ taminicæ sine seminibus. P. XIII. mellis quantum sat sit ad ea cogenda: quod si ex ictu testiculis aliquid desit, ferè pus quoque increfcit, neque aliter succurri potest, quàm si inciso scroto & pus emissum, & ipse testiculus excisus est.

De rhagadys, & Cōdylomate, et hæmorrhoidibus, alijsq; ani morbis, & curationibus eorum, & primo de rhagadys.

Nus quoque multa, tædijque plena mala recipit: nec in se multum abhorrentes curationes habet: at primum in co sæpe  
 a        & quidem pluribus locis cutis exciditur. prædicta ita græci vocant, id si recens est: quiescere homo debet & in aqua calida desidere. Columbina quoque una coquenda sunt, et ubi induruerunt, purganda: deinde alterum iacere in aqua bene calida debet, altero calido foveri locus sic, ut invicem utroque aliquis utatur. Tum tetrapharmacum, aut πτωδης rosa diluendum est, aut hyssopum recens misandum cum cerato liquido ex rosa facto: aut eidem cerato liquido plumbum elotum adijciendum: aut resinæ terebinthinæ myrrha: aut stumæ argenti vetus oleum: & quolibet ex his id perungendum: si quicquid læsum est, extra est, neque intus reconditum, eodem medicamento tinctum linamentum super dandum est: et quicquid ante adhibuimus cerato contegendum. In hoc autem casu neque acerbis alijs utendum, neque asperis, nec alium comprimentibus: ne aridum quidem quicquam sane utile est: nisi admodum paulum: liquida, lenia, pingua, glutinosa meliora sunt: vino leni uti nihil prohibet.

## De condylomate.

Condyloma autem est tuberculum: quod ex quadam inflammatione nasci solet: id ubi oritur, quod ad quietem, cibos, potionesque pertinet: eadem servari debent, quæ proxime scripta sunt: hujusdem etiam oris recte tuberculum id fovetur. sed desidere ante homo in aqua debet, in qua verbenæ decoctæ sunt ex repimentibus: tum recte imponitur, & lenticula cum exigua nullis parte, & fertula campana ex vino cocta, & rubi folia contrita cum cerato ex rosa facto: & cum eodem cerato contritum, vel cotoneum malum, vel malicorij ex vino cocti pars interior, & chalatis acta, atque contrita: deinde hyssopo, ac rosa excepta: & ex ea compositione, quæ habet iheris. P. XI. aluminis scissilis. P. XII. cerussæ. P. XIII. stumæ argenti. P. XV. quibus dum teruntur: invicem rosa & vinum instillatur. vinculum autem ei loco linteolum, aut panniculus quadratus est:  
 qui ad

qui ad duo capita duas ansas, ab altera uero parte totidem fascias habet, cumq; subiectus est, ansis ad uentrem datis à posteriore parte in eas adductæ fasciæ coniunguntur, atq; ubi artatæ sunt: dexteriori sinistra, sinisteriori dextra procedit, circumdatæq; circa alium inter se nouissime nodo deligantur. sed si uetus condyloma iam induruit, neq; sub his curationibus desidit, aduri medicamento potest, quod ex his constat: æruginis. P. XII. myrrhæ. P. XIII. gummi. P. XVIII. thuris. P. XXII. subis: papaueris lacrymæ, acaciæ, singulorū. P. XXVI. quo medicamento quidam etiam ulcera, de quibus proxime dixi: renouant. si hoc parum in condylomate proficiat: adhiberi possunt etiam uehementius adurentia. ubi consumptus est tumor: ad medicamenta lenia transeundum est.

### De hæmorrhoidibus.

Ertium autem uitium est, ora uenarum tanquam ex capitulis quibusdam surgentia: quæ sæpe sanguinem fundunt, à μωρροϊδᾶς græci nōant. idq; etiam in ore uulue foeminarum incidere consuevit. atq; in quibusdam parum tuto suppressitur, qui sanguinis profluuio imbecilliores non fiunt. habet enim purgationem hanc non morbum: ideoq; curati quidā cum sanguinis exitum non habent: inclinata in præcordia ac uiscera materia subitis, & grauissimis morbis correpti sunt. si cui uero id nocet, is desiderare in aqua ex uerbenis debet: imponere maxime malicorium cum aridis rosæ folijs contritum: aut ex his aliqua, quæ sanguinem suppressunt. Solet autem oriri inflammatio, maxime ubi dura alius eum locum læsit. tum in aqua dulci desidendum est, & id fouendum ouis: imponendi uitelli cum rosæ folijs ex passo subacti: idq; si intus est, digito illinendum, si extra super illitum panniculum imponendum est. ea quoq; medicamenta, quæ recentibus scissuris posita sunt, hic idonea sunt. Cibus uero in hoc casu hisdem quibus in prioribus utendum est: si ista parum iuuat, solent imposita medicamenta adurentia, ea capitula absumere. ac si iam uetustiora sunt, sub auctore Dionysio inspargenda sandaracæ est, deinde imponendum, quod ex his constat: squamæ æris, auripigmenti: singulorum. P. XV. saxi calæis. P. XVIII. postero die acu compungendum. adustus capitulis fit cicatrix: quæ sanguinem fundi prohibet. sed quotiens is suppressus est, ne quid periculi afferat, multa exercitatione digerenda materia est. prætereaq; & uiris & foeminis, quibus menstrua non proueniunt, interdum ex brachio sanguis mittendus est.

ona uenerunt in sea  
noib. sup  
eigne ubi  
bina.



Si anus, uel os uulnæ procidit, qua curatione utendum sit.

**T** si anus ipse uel os uulnæ procidit, (nā id quoq; interdum  
a fit) considerari debet purum ne id sit: quod prouolutū est,  
an humore mucoso circumdatum. si purum est, in aqua de-  
sidere homo debet, aut salsa, aut cum uerbenis uel malicorio incocta:  
si humidum, uino austero subluendum est, illinendumq; fecæ uini com-  
busta. ubi utrolibet modo curatum est, intus reponendum est, imponē-  
daq; plantago contrita, uel folia salicis in aceto cocta, tum lintecolum  
et super lana æque deligenda cruribus inter se deuinctis.

De ulcere fungo simili in ano.

**V**ngo quoq; simile ulcus in eadem sede nasci solet. id si hy-  
f ems est, egelida, si aliud tempus, frigida aqua fouendū est.  
deinde squama æris inspergenda, supraq; ceratū ex myr-  
teo factū. cui paulū squamæ, fuliginis, calas, sit adiectum si hac rōne  
nō tollitur: uel medicamentis uehementioribus, uel ferro adurendū est.

De digitorum ulceribus. Cap. XIX.

**I**gitorum autem uetera ulcera commodissime curantur, aut  
d lycio, aut myrrha cocta: cū utrilibet uinum adiectum est. in  
hisdem recedere ab ungue caruncula cum magno dolore cō-  
suevit. *μῆρυγιον* græci appellant. oportet alumen melinum rotundum  
in aqua liquare donec mellis crassitudinem habeat: tum quantum  
eius aridi fuit, tantundē mellis infundere, et radicula miscere, do-  
nec similis croco colore fiat, eoq; illinere. quidam ad eundem usum  
decoquere simul maluā solēt: cū paria pōdera aluminis aridi et mel-  
lis misuerint. si hac ratione ea nō excederunt: exadēda sunt: deinde  
digiti fouēdi aqua ex uerbenis, imponendumq; sup medicamentum  
ita factum. chalcitis, malicoriū, squama æris excipiuntur fīco pingui  
leniter cocto ex melle. aut chartæ combustæ, auripigmenti, sulphuris  
ignē nō experti par modus cerato miscetur ex myrteo factō. aut æri-  
ginis rasæ. P. XI. squamæ. P. XII. mellis cyatho coguntur. aut pares  
portiones miscentur: saxi calas, chalcitidis, auripigmenti quicquid ho-  
rum impositum est, tegendum linteolo aqua madefacto est: tertio die  
digitus resoluendus est. si quid aridi est, iterum excidendum, similiq;  
adhibenda curatio est. si non uincitur, purgandus scalpello, tenuibusq;  
ferramentis adurendus est: et si cut reliqua uisa curandus est. at ubi  
scabri unguis sunt, circum aperiri debent: qua corpus contingunt. tūc  
super eos ex hac cōpositione æque imponi sandaracæ, sulphuris, sin-  
gulorum P. XII. nitri, auripigmenti, singulorum. P. XIII. resinae liq-  
dæ. P. XVIII. tertioq; id die resoluendū est. sub quo medicamento ui-  
ciosi unguis cadunt, et in eorum locum meliores renascuntur.

De chirurgia, & qui in ea claruerint, & qualis esse chirurgicus debeat, & quid in hoc libro describatur.

Ertiam esse medicinæ partē: quæ manu curet, & uulgo notum, & à me propositum est. ea non quidem medicamenta atq; uictus rationē omittit, sed manu tantum plurimum præstat. estq; eius effectus inter omnes medicinæ partes euidentissimus. siquidem in morbis cum multum fortuna conferat: eademq; sæpe salutaria, sæpe uana sint: potest dubitari secunda uale tudo medianæ, an corporis beneficio contigerit: in his quoq; in quibus medicamentis maxime utimur: quamuis profectus euidentior est: tamen sanitatem & per hæc frustra queri, & sine his reddi sæpe manifestum est. sicut in oculis quoque deprehendi potest: qui à medicis diu uexati sine his interdum sanescunt. at in ea parte, quæ manu curat, euident est, omnem profectum, ut aliquid ab alijs adiungetur, hinc tamen plurimum trahere. Hæc autem pars, cum sit uetustissima, magis tamen ab illo parente omnis medicinæ Hippocrate, quàm à prioribus exulta est: deinde posteaquam diducta ab alijs habere profissores suos coepit, in ægypto quoque increuit Philoxeno maxime auctore, qui pluribus uoluminibus hanc partem diligentissime comprehendit. Gorgias quoque, & Sostratus, & Hieron, & Apollonijs duo, & Hammonius alexandrinus: multiq; alijs celebres uiri singuli quædam repperierunt. ac Romæ quoque non mediocres profissores, maximeq; nuper Tryphon pater, & Euelpistus: & ut ex scriptis eius intelligi potest, horum eruditissimus Megetes quibusdam in melius mutatis aliquantum ei disciplinæ adiecerunt. Esse autem chirurgus debet adolescens, aut certe adolescentiæ propior, manu strenua, stabili, nec unquam intremescente, eaq; non minus sinistra, quàm dextra promptus: acie oculorum acri: claraq; animo intrepidus, immisericors sic, ut sanari uelit eum quem accipit, non ut clamore eius motus, uel magis quàm res desiderat: properet, uel minus quàm necesse est, faciat: sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex uagitu alterius affectus oriatur. Potest autem requiri: quid huic parti proprie uendicandum sit: quia uulnerum quoq; ulcerumq; multorum curationes, quas alibi executus sum: chirurgi sibi uendicant. ego eundem quidē hominem posse omnia ista præstare concipio. atque ubi se diuise-

runt, eum laudo, qui quàm plurimū percipit. Ipse autē huic parti, ea reliqui: in quibus vulnus facit medicus: non accipit: & in quibus ulceribus, ulceribus uē plus perfici manu, quàm medicamento credo. tū quicquid ad ossa pertinet: quæ deinceps exequi aggrediar, dilatisq; in aliud uolumen ossibus, in hoc cætera explicabo: præpositisq; his, quæ in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quæ proprias sedes habent: transibo.

## De luxatis. Cap. I.

**I** Vxata igitur in quacunq; parte corporis sunt, quàm primum sic curari debent, ut qua dolor est, eā scalpello cutis crebro incidatur: detergaturq; eodem aduerso profluens sanguis. quod si paulo tardius subuenitur, iamq; etiam rubor est, quæ rubet corpus, si tumor quoq; accessit, quacunq; is est, id optimum auxilium est. tum super danda reprimuntia sunt, maximeq; lana succida ex aceto, & oleo. quod si leuior is cõsus est: possunt etiam sine scalpello imposita eadem mederi. Et si nihil aliud est, cinis quoq; maxime ex sarmentis. si is non est, quilibet alius ex aceto uel etiā ex aqua coactus.

De his, quæ per se intumescunt, quomodo excidenda, & curanda sunt. Cap. II.

**U** Erum hoc quidem promptum est. in his autem negotiis maius est, quæ per se uicio intus orto intumescunt, & ad suppurationem spectant. ea omnia genera abscessum esse aliàs proposui, medicamentaq; eis idonea executus sum. nunc superest ut dicam in hisdem, quæ manu fieri debeant. ergo priusquam indurescant: cutem incidere, & cucurbitulam accommodare oportet: quæ quicquid illuc malæ, corruptæq; materiæ cõijt: extrahat, idq; iterū, tertioq; recte fit, donec omne inditum inflammationis excidat. neq; tamen fas non est nihil cucurbitula agere. interdum enim sed raro quicquid abscedit, uelamento suo includitur. id antiqui tunicam nominabant. Mege quia tunica omnis nervosa est: dicit non nasci sub eo uicio neruum: quo caro consumeretur, sed subiecto iam uetustiore pure callum circumdari. quod ad curationis rationem nullo loco pertinet, quia quicquid dixi, si tunica est, idem, si callus est, fieri debet. neq; ulla res prohibet, etiam si callus est: tamen quia cingit: tunicam nominari. tum pure quoq; maturior hæc interdum esse cõsuevit. ideoq; quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutauit. ergo siue id in-



dit, siue iam durities est: in hac auxiliij nihil est. & ut aliàs scripsit  
uel auertenda concurrens eò materia, uel digerenda, uel ad maturi-  
tatem perducenda est. si priora contigerunt, nihil præter ea necessa-  
rium est si pus maturuit, in alijs quidem, & in inguinibus raro secũ-  
dam est. item ubicunq; mediocris abscessus est. item quotiens in sum-  
ma cute, uel etiam carne uitium est: nisi festinare curantis imbecilli-  
tas cogit. satisq; est cataplasmata efficere, ut per se pus aperiatur:  
nam ferè sine cicatrice potest esse is locus: qui expertus ferrum non  
est, si autem altius malum est, considerari debet nervosus ne is lo-  
cus sit: an non sit. nam si sine nervus est, candenti ferramento ape-  
riri debet. cuius hæc gratia est, quod exigua plaga diutius ad pus euo-  
candũ patet: paruaq; postea cicatrix fit. at si nervi iuxta sunt: ignis  
alienum est: ne uel distendantur hi, uel membrum debilitent. necessa-  
ria uero opera scalpelli est. sed cætera etiam subcruda aperiri pos-  
sunt. inter nervos uero ultima expectanda maturitas est: quæ cutem  
extenuet: eiq; pus iungat: quo propius reperiatur. itemq; alia rectam  
plagam desiderant in carne. quia ferè uehementer cutem extenuat.  
totæ ea super pus excidenda est. Semper autem, ubi scalpellus admoue-  
tur, id agendum est, ut quàm minimæ, & quàm paucissimæ plagæ  
sint. cum eo tamen, ut necessitati succurramus, & in modo & in nu-  
mero. nam maiores sinus latius, interdum etiam duabus aut pluri-  
bus lineis incidendi sunt. dandaq; opera ut inuis sinus exitum ha-  
beat, ne quis humor intus subsidat, qui proxima & adhuc sana ro-  
dendo sinuet. est etiam in rerum natura, ut cutis latius excidenda sit:  
nam ubi post longos morbos totus corporis habitus uitiatu est, lateq;  
se sinus diffudit, & in eo pars cutis pallet: scire licet eam iam emor-  
tuam esse, & inutilem futuram. ideoq; excidere commodius est. ma-  
xime si circa articulos maiores id euenit, cubantemq; ægrum flu-  
ens alius exhaurit: neq; per alimenta quicquam corpori accedit. sed  
excidi ita debet, ut plagæ ad similitudinem myrtei folij fiat, quo fa-  
cilis sanescat. idq; perpetuum est. ubicunq; medicus ex quacunque  
causa cutem excidit, pure effuso in alijs, uel inguinibus, linamento opus  
non est. spongia ex uino imponenda est. in cæteris partibus si æque  
ea linamenta superuacua sunt: purgationis causa paulum mellis in-  
fundendum, dein glutinantia super danda. si illa necessaria sunt:  
super ea quoq; similiter dari spongia eodem modo ex uino expressa  
debet. quando autem linamenti opus sit: quando nõ sit: aliàs dictum  
est. cætera eadem incisa suppuratione facienda sunt. quæ ubi per me-  
dicamenta rupta est, facienda esse proposui.

Rotinus autem quantum curatio efficiat, quantumq; aut spe  
 P rari, aut timeri debeat: ex quibusdam signis intelligi po-  
 test: fereq; hisdem, quæ in vulneribus exposita sunt. nam  
 bona signa sunt: somnum capere: facile spirare: siti non confici: cibum  
 non fastidire, si febricula fuit, ea uacare: itemq; habere pus albū, leue,  
 nō fœdi odoris. Mala sunt, uigilia, spiritus grauitas: sitis: cibi fastidiū:  
 febris: pus nigrum, aut feculentum & fœdi odoris. Item procedente  
 curatione eruptio sanguinis, aut si antequam sinus carne impleatur,  
 oræ carnosæ fiunt: illa quoq; ipsa carne hebet nec firma deficere ta-  
 men animam uel ipsa curatione uel postea: pessimum omnium est. quin  
 etiam morbus ipse siue subito solutus est: dein suppuratio exorta est,  
 siue effuso pure permanet non iniuste terret. Estq; inter causas timo-  
 ris: si sensus in uulnere rodentiū non est: sed ut hæc ipsa fortuna huc  
 illuc'ue discernit: sic medici partium est: eniti ad reperiendam sanita-  
 tem. ergo quotiens ulcus resiliuerit: eluere id: si reprimendus humor ui-  
 debitur: uinō ex aqua pluuiatili mixto, uel aqua in qua lenticula  
 cocta sit, debeat. si purgandum erit, mullō, rursusq; imponere eadē.  
 ubi iam repressus uidebitur humor ulcusq; purum erit, produci car-  
 nem conueniet et foveri uulnus pari portione uini ac nullis superq;  
 imponi spongia ex uino & rosa tincta. per quæ cum caro produca-  
 tur: plus tamen, ut aliis quoq; dixi, uictus ratio eō confert. id est solu-  
 tis iam febribus, & ubi cupiditate reddita: balneum rarum. cotidia-  
 na, sed lenis gestatio, ubi. potionesq; corpori reficiendo. apteq; omnia  
 quæ per medicamenta suppuratione quoq; rupta sequuntur sed quia  
 magno malo uix sine ferro mueri licet: in hūc locū reseruata sunt.

## De fistulis. Cap. IIII.

Duersus fistulas quoq; si altius penetrant ut ad ultimas de-  
 a mitti collirium non possit, si tortuosæ sunt, si multiplices,  
 maius in manu quam in medicamentis præsidium est: mi-  
 nusq; operæ est: si sub cute transuersæ feruntur, quam si rectæ intus  
 tendunt. igitur si sub cute transuersa fistula est: demitti specillum de-  
 bet, supraq; id ea incidi, si flexus reperiuntur, hi quoq; simul specil-  
 lo & ferro persequendi sunt. idemq; faciendum, si plures se quasi ra-  
 muli ostendunt. uli ad fines fistulæ uentum est, excidendum ex toto  
 callus est, superq; sibilæ dandæ: & medicamentum quo glutinetur:

at si recta subter tendit, ubi quo, maxime ferat, specillo exploratum est, excidi is sinus debet, dein fibula oris cutis inuicienda est, et æque glutinantis medicamenta super danda sunt. aut si corruptius ulcus, quod interdum osse uitiato fit, ubi id quoque curatum est: pus mouetia. solent autem inter costas fistulæ subter exire. quod ubi incidit, eo loco costa ab utraq; parte decidenda, & eximenda est, nequid intus corruptum relinquatur. solent, ubi costas transierunt, septum id, quod transuersum à superioribus uisceribus intestina discernit: uiolare. quod intelligi & ex loco, & ex magnitudine doloris potest: & quia nonnumquam spiritus eò, cum humore quasi bulla intus prorumpit, maximeque si hunc ore ille continuit. in eo medicaminis locus nullus est. in cæteris uero quæ circa costas sanabilia sunt: pinguis medicamenta inimica sunt. cæteris, quæ ad uulnera accommodantur, uti licet. optime tamen sicca linamenta, uel si purgandum aliquid uideatur, in melle tincta imponuntur. uentri nullum os subest: sed ibi perniciosè admodum fistulæ fiunt, adeo ut Sofratus insanabiles esse crediderit. id nõ ex toto ita se habere usus ostendit. & quidẽ quod maxime mirum uideri potest: tutior fistula est contra iecur, & lienem, & uentriculum, quam contra intestina, non quo perniciosior res ibi sit, sed quo alteri periculo locum faciat. cuius experimento moti quidam auctores parum modum rei cognouerunt. nam uentre sepe etiam telo perforatur, pro lapsaque intestina conduntur, & oras uulneris suturæ comprehendunt. quod quemadmodum fiat mox indicabo. itaque etiam ubi tenuis fistula abdomen perumpit: excidere eam licet, suturæque oras coniungere. si uero ea fistula intus patuit, excisa necesse est latius foramen relinquat, quod nisi magna uis, utique ab interiore parte sui non potest, qua quasi membrana quædam finit abdomen: quam *περιτόνιον* greci uocant. ergo ubi aliquis ingredi ac moueri cepit: rumpitur illa futura, atque intestina soluantur. quo fit ut pereundum homini sit. sed non omni modo res ea desperationem habet. ideoque tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

#### De ani fistulis.

Propriam etiamnum animadversionem desiderant ea, quæ  
 P in ano sunt. in has demisso specillo ad ultimum eius caput  
 incidi cutis debet: dein nouo foramine specillum educto lino  
 sequente: quod in aliam eius partem ob id ipsum perforatum coniec-  
 tum sit. ibi linumprehendendum, uinciendumque cum altero capite est,  
 ut laxè autem, quæ super fistulam est, teneat. idque linum esse debet



crudum & duplex, triplex'ue, sic tortum ut unitas facta sit. Interim autem licet negotia agere, ambulare, lauare, abŭ capere perinde atq; sanissimo. tantummodo id lĭnum bis die saluo nodo ducendum est sic, ut subeat fistulam pars, quæ superior fuerit. neq; committendum est ut id lĭnum putrescat. sed tertio quoq; die nodus resoluendus est, et ad caput alterum, recens lĭnum alligandum est, eductoq; uetere, id in fistula cum simili nodo relinquendū. sic enim id paulatim cutem, quæ supra fistulam est: incidit, simulq; & id sanescit, quod à lino relictū est, & id quod ab eo mordetur: inciditur. hæc ratio curationis longa, sed sine dolore est. qui festinat, astringere cutem lino debet, quo celerius fecerit, noctuq; penicillo tenuia quædam intus demittere, ut cutis hoc ipso extenuetur: quod extenditur: sed hæc dolorem mouent. adijcitur celeritati sicut tormento quoque: si et lĭnum, & id quod ex penicillo est, aliquo medicamento illinatur ex ijs, quibus callum exedi posui. poterit tamen fieri ut ad scalpelli curationem etiam illò loca ueniendum sit, si intus fistula fert, si multiplex est. igitur in hæc genera demisso specillo duabus lineis incidenda cutis est: ut media inter eas habentula tenuis admodum eijciatur, ne protinus ora coeant: sitq; locus aliquis linamenti: quæ quàm paucissima super iniicienda sunt, omniaq; eodem modo facienda, qui in abscessibus positus est. si uero ab uno ore plures sinus erunt: recta fistula scalpello erit incidenda, ab eo ceteræ, quæ iam patebunt lino excipiendæ. si intus aliqua proceadet: quo ferrum tuto peruenire non poterit: collirium demittendum erit. abŭs autem in omnibus eiusmodi casibus, siue manu, siue medicamenti agetur: dari debet humidus. potio liberalis, diuq; aqua ubi iam caro increſcit. tum demum & balneis raris utendum erit, & abŭs corpus implentibus.

De telis è corpore extrahendis. Cap. V.

¶ Ela quoq; quæ illata corporibus intus hæserunt: magno negotio sæpe eijciuntur. suntq; quædam difficultates ex generibus eorum, quædam ex his sedibus in quas illa pene trahunt. omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte, qua uenit, aut ab ea, in qua tetendit. illic uiam, qua redeat: ipsum sibi facit. hic à scalpello accipit nam contra mucronē caro inciditur. sed si non alte telū infedit, et in summa carne est: aut certe magnas uenas, et loca neruosa non transijt, nihil melius est: quàm qua uenit id euellere. si uero plus est p quod telo reuertendū quàm quod perrupendum est: iamq; uenas, neruosq; id transit: commodius est aperire quod superest, eaq; extrahere. nam & propius petitur, et tutius euellitur, et in maiore

membro si medium mucro trāsyit, facilius sanescit. quod peruium est.  
 quia utrinq; medicamento fouetur: sed si retro telum recipiendum est:  
 amplianda scalpello plaga est: quo facilius id sequatur: quoq; minor  
 oriatur inflammatio, quæ maior fit: si ab illo ipso telo dum redit,  
 corpus laniatur. Item si ex alia parte vulnus aperitur: laxius esse  
 debet, quàm ut telo postea transeūte amplietur. Sūma autem utraq;  
 parte ita habenda cura est, ne nervus, ne uena maior, ne arteria inci-  
 datur. quorum ubi aliquid detectum est, excipiendum hamo retuso  
 est, abducendumq; scalpello. Vbi autem satis incisum est, telum exime-  
 dum est: tum quoq; eodem modo, & eadē cura habita, ne sub eo, quā  
 eximetur, aliquid eorum lædatur quæ tuenda esse proposui. Hæc cō-  
 munia sunt: propria quædam in singulis telorum generibus subiiciē-  
 da sunt: quæ protinus subiiciam: nihil tam facile in corpore quàm sa-  
 gitta conditur, eademq; altissime insedit. hæc autem eueniunt, et quia  
 magna ui fertur illa, & quia ipsa in angusto est. sæpius itaq; ab al-  
 tera parte, quàm ex qua uenit, recipienda est: præcipuēq; quia ferè  
 spiculis cingitur, quæ magis laniant, si retro, q̃ si contra trahuntur:  
 sed inde aperta uia caro diduci debet ferramento ad similitudinem  
 facti græce litteræ †. Deinde ubi apparuit: si mucro, si harundo in-  
 heret propellenda est, donec ab altera parte apprehendi et extra-  
 hi possit: si iam illa decidit, solumq; intus ferrum est, mucro uel digi-  
 tis apprehendi, uel forfice, atq; ita educi debet: neq; alia ratio extra-  
 hendi est, ubi ab ea parte qua uenit, euelli magis placuit: nam am-  
 pliatio uulnere aut harundo, si inest, euellenda est, aut si ea non est,  
 ferrum ipsum: quod si spicula a, paruerunt, eaq; breuia & tenuia  
 sunt: forfice ibi comminui debent, uacuumq; ab his telum educi, si ea  
 maiora, ualentioraq; sunt, fissis scriptorijs calamus cōtegenda: ac ne-  
 quid lacerent, sic euellenda sunt. & in sagittis quidem hæc obserua-  
 tio est. Latum uero telum si conditum est, ab altera parte educi nō ex-  
 pedit, ne ingenti uulnere, ipsi quoq; ingens uulnus adiciamus. euellē-  
 dum est ergo genere quodam ferramenti, quod diocleum græci gra-  
 phiscum uocant: quoniam auctorem Dioclen habet: quem inter pri-  
 scos, maximosq; medicos fuisse iam posui. Lamina uel ferrea, uel ænea  
 etiam ab altero capite duos utrinq; deorsum conuersos uncas habet:  
 ab altero duplicata alteribus, leuiterq; extrema in eam partem in-  
 clinata, quæ sinuata est: insuper ibi etiam parte inclinata, quæ persō-  
 rata est: hæc iuxta telum transuersa demittitur. deinde ubi ad inum  
 mucronem uentum est: paulum torquetur, ut telum foramine suo exci-  
 piat. cum in cauo mucro est, illico duo digiti subiecti partis alterius  
 unctis simul & ferramentum id extrahunt, et telum. Tertium genus

telorum est, quod interdum euelli debet, plumbea glans, aut lapis, aut simile aliquid, quod perrupta cute integrū intus insedit. in omnibus his latius vulnus aperiendum, idq; quod inest, ea qua uenit, forfice extrahendum est. Accedit uero aliquid difficultatis sub omni ictu, si telum uel ossi inhæsit, uel in articulo se inter duo ossa demersit: in osse usq; eo mouendum est, donec is locus laxetur, qui mucronem momordit: Et tum uel manu, uel forfice telum extrahendum est: quæ ratio in dentibus quoq; eijciendis est. Et uix unq; ita telum non sequitur. sed si morabitur, excuti quoq; ictum aliquo ferramento poterit. Vltimū est, ubi nō euellitur, terebra iuxta forare, ab eo quoq; foramine ad speciem littere † contra telum os exadere sic, ut lineæ quæ diducuntur, ad telum spectent. eo facto id necesse est labet, Et facile auferatur. Inter duo uero ossa si per ipsum articulum perruperit, circa vulnus duo membra fascijs habenis ue deliganda, Et per has in diuersas partes diducenda sunt, ut nervos distendant. quibus extētis laxius inter ossa spaciū est, ut sine difficultate telum recipiatur. illud uidendum est, si cut in alijs locis posui, ne quis nervus, aut uena, aut arteria à telo lædatur: dum id extra itur: eadem scilicet ratione quæ supra posita est. at si ueneno quoq; telo quis ictus est: hysdem omnibus si fieri potest etiam festinantius actis adijcienda curatio est: quæ uel epoto ueneno, uel à serpente ictis adhibetur. Vulneris autem ipsius extracto telo medicina non alia est, quàm quæ esset si corpore icto nihil inhæsisset. de qua satis alio loco dictum est.

De ganglijs, Et meliceride, Et atheromate, Et steatomate  
capitis tuberculis. Caput VI.

hæc uenire in qualibet parte corporis possunt. reliqua certas sedes habent: de quibus dicam orsus à capite. in hoc multa. variaq; tubercula oriuntur: ganglia, meliceridas, et atheromata nominant: alijsq; etiam nūm uocabulis quædam alijs discernunt, quibus ego steatomata quoq; adijciam. quæ quauis Et in ceruice, Et in alis, et in lateribus oriri solent: per se tamen non posui, cum omnia ista mediocres differentias habeant: ac nec periculo terreant, neq; diuerso genere curentur. Omnia autem ista Et ex paruulo incipiunt, Et diu, paulatimq; increscunt: Et tunica sua includuntur: quædam ex his dura, ac renitentia: quædam mollia, cedentiaq; sunt, quædam spacio nudantur: quædam tecta capillo suo permanent: ferèq; sine dolore sunt. quid intus habeāt, ut coniectura præsagiri potest, sic ex toto cognosci, nisi cum eiecta sunt, non potest. maxime tamen in his quæ renitentur, aut lapillis quædam similia, aut concreti, confertiq;



pili reperiuntur. In his uero quæ cedunt, aut melli simile aliquid, aut tenui pulticulæ, aut quasi rasæ cartilagini, aut carni hebeti, & cruentæ: quibus aliqui colores esse consueverunt ferèq; ganglia renituntur. atheromati subest quasi tenuis pulticula. meliceridi liquidior humor: ideoq; pressum circumfluit. steatomati pingue quiddam, idq; latissime patere consuevit, resoluitq; totam cutem superpositam sic, ut ea labet, cum in cæteris sit astrictior. omnia derasa ante si capillis continguntur, per medium oportet incidere: sed steatomatis tunica quoq; secanda est, ut effundatur quicquid intus coit: quia non facile à cute subiecta carne ea separaretur: in cæteris ipsa tunica inuiolata seruanda est. Protinus autem alba, & intenta se ostendit. tum scalpelli manubriolo diducenda à cute, & carne est: eijciendaq; cum eo quod intus tenet. si quando tamen ab inferiore parte tunicæ musculus in hæsit, ne is lædatur, superior pars illius decidenda, alia ibidem relinquenda est. ubi tota exempta est, committendæ oræ, fibulæq; his injicienda, & super medicamentum glutinans dandum est. ubi uel tota tunica, uel aliquid ex ea relictum est: pus mouentia adhibenda sunt.

De oculorum uicijs quæ scalpello, & manu curantur. Cap. VII.

Ed ut hæc neq; genere uicij, neq; ratione curationis inter se multum distant sic, in oculis quæ manum postulant, et ipsa diuersa sunt, & aliter, aliterq; curantur. igitur in superioribus palpebris uesticæ nasci solent pingues, grauesq; quæ nix attollere oculos sinunt: leuesq; pituitæ cursus, sed assiduos in oculis mouent. Ferè uero in pueris nascuntur. Oportet compresso digitis duobus oculo, atq; ita cute intenta, scalpello transversam lineam incidere, suspensa leuiter manu, ne uesticæ ipsa uulneretur: & ut locus ei patefactus est, ipsa prorumpat: tum digitis eam apprehendere oportet, & euellere: facile autem sequitur. dein super ungi collirio debet ex his aliquo, quo lippientes oculi super inunguntur. paucissimisq; diebus cicatrix inducitur. molestus est ubi inassa uesticæ est. Effundit enim humor: neq; postea quia tenuis admodum est, potest colligi: si forte id incidit, eorum aliquid imponendum est, quæ puri mouendo sunt.

De crithe tuberculo palpebrarum.

i Ne eadem palpebra super pilorum locum tuberculū paruum nascitur, quod à similitudine ordei à græcis uerion nominatur tunica quiddam quod difficulter maturescit cōprehensum est. id uel calido pane, uel cera subide calefacta foueri oportet

sic ne nimius is calor sit: sed facile ea parte sustineatur. hac enim ratione sepe discutitur: interdum concoquitur: si pus se ostēdit, scalpello diuidi debet, & quicquid intus humoris est, exprimī. Eodem deinde uapore postea quoq; foueri, & super inungi, donec ad sanitatem perueniat.

### De chalaſia palpebrarum.

Lia quoq; quædam in palpebris huic non dissimilia nascuntur: sed neq; utiq; figuræ eiusdem, & mobilia simul, atq; digito huc uel illuc impelluntur: ideoq; ea χαλᾶσια uocant. hæc incidi debent: si sub cute sunt ab exteriori parte: si sub cartilagine, ab interiore. dein scalpelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt: ac si intus plaga est: inungendū primo lenibus: deinde acrioribus. si extra, super dandum emplastrum, quo id glutinetur.

### De ungue oculorum, quod ὀφθαλμίων à græcis uocatur.

Unguis uero, quod ὀφθαλμίων græci uocant: est membranula ueruosā oriens ab angulo, quæ nonnunquam ad pupillam quoq; peruenit, eiq; officit. sæpius à narium, interdum etiā à temporum parte nascitur. hunc recentem non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur: si inueterauit, iamq; ei crassitudo quoq; accessit: excidi debet. Post abstinentiam uero unius diei, uel aduersus in sedili contra medicum is homo collocandus est, uel sic aduersus, ut in gremium eius caput resupinus effundat. quidam si in sinistro oculo uicium est, aduersum. si in dextro: resupinum collocari uolunt. alteram autem palpebram à ministro diduci oportet, alteram à medico: sed ab hoc: si ille aduersus est. inferiorem, si supinus: superiorem. tum idem medicus hamulum acutum paulum mucrone intus recuruato subijcere extremo ungui debet, eumq;ingere, atq; eā quoq; palpebram tradere alteri, ipse hamulo apprehenso leuare unguem, eumq; acu traicere linum trahente: deinde acum ponere: lini duo capita apprehendere, & per ea erecto ungue si qua parte oculo inhaeret manubriolo scalpelli diducere, donec ad angulū ueniat: deinde inuicem modo remittere, modo attrahere, ut sic & initium eius, & finis anguli reperiatur. duplex enim periculum est: ne uel ex ungue aliquid relinquatur, quod exulceratum uix ullam recipiat curationem, uel ex angulo quoq; caruncula abscedatur, quæ si uehementius unguis ducitur, sequitur, ideoq; decipit: ac si abscessa est, patescit foramen: per quod postea semper humor descendit. πᾶσα

πλάδα γράει vocant. Verus ergo anguli finis utiq; noscendus est, qui ubi satis constitit, non numium adducto ungue scalpellus adhibendus est: deinde excidenda ea membranula, ne quid ex angulo lædatur. Eo deinde ex melle linamentum super dādum est: supraq; linteolum, & aut spongia, aut lana succida, proximisq; diebus diducendus quo tidie oculus est, ne cicatrice inter se palpebræ glutinentur. siquidem id quoq; tertium periculum accedit: eodemq; modo linamentum imponendum, ac nouissime inungendum collirio, quo ulcera ad cicatricem perducuntur: sed ea curatio uerna esse debet, aut certe ante hyemem: de qua re ad plura loca pertinate semel dixisse satis erit. nam duo genera curationum sunt. alia in quibus eligere tempus non licet, sed utendum est eo, quod incidit, sicut in vulneribus, & in fistulis. alia in quibus nullus dies urget, & expectare tutissimum, & facile est: sicut euenit in ijs, quæ & tarde crescunt, & dolore non cruciant: in his uer expectandum est. aut si quid magis pressit, melior tamen autumnus uel æstas, quàm hyems est. atq; is ipse medius, iam fractis æstatiibus, nondum ortis frigoribus. quo magis autem necessaria pars erit quæ tractabitur, hoc quoq; maiori periculo subiecta est. et sepe quo maior plaga facienda, eo magis hæc temporis ratio seruabitur.

De enchanti tuberculo.

*X* curatione uero unguis ut dixi, uicia nascuntur: quæ ipsa  
e alijs quoq; de causis oriri solent. interdum enim fit in an-  
gulo, parum ungue exciso, uel aliter tuberculum, quod pal-  
pebras parum diduci patitur, & *χέντις* græce nominatur. excidi ha-  
mulo, & circumcidi debet, hic quoq; diligenter temperata manu, ne  
quid ex ipso abscidat. tum exiguum linamentum respergendum est  
uel cadmia, uel atramento sutorio: inq; eum angulum diductis palpe-  
bris inserendum: supraq; eodẽ modo deligandum. proximisq; die-  
bus similiter nutriendum tantum, ut primis aqua egelida, uel etiam  
frigida foneatur.

De ancyloblepharo oculorum vicio.

i Interdum inter se palpebrae coalescunt: apeririq; non potest oculus. cui malo solet etiam illud accedere, ut palpebrae cum albo oculi cohaerescant: scilicet cum in utroq; fuit ulcus negligenter curatum. sanescendo enim quod diduci potuit, et debuit, glutinabit: ἀναυλοβλέφαρος sub utroq; uicio graeci uocant. Palpebrae tantum inter se cohaerētes non difficulter diducuntur, sed interdum fru-



stra: nam rursus glutinantur. Experiri tamen oportet: quia bene res sæpius cedit. igitur aduersum specillum inferendum, diducendæq; eò palpebræ sunt, deinde exigua penicilla interponenda, donec exulceratio eius loci finiatur. at ubi albo, ipsius oculi palpebra inhæsit: Heraclides tarentinus auctor est, aduerso scilpello subsecare magna cum moderatione, ut neq; ex oculo, neq; ex palpebra quicquam abscidatur. ac si necesse est, ex palpebra potius. post hæc inungitur oculus medicamentis, quibus aspritudo curatur: quotidieq; palpebra uertatur, non solum ut ulceri medicamentum inducatur, sed etiam ne rursus inhæreat, ipsiq; etiam præcipiatur, ut sæpe eā duobus digitis attollat. ego sic restitutum esse neminem memini. Meges se quoq; multa tentasse, neq; unq̃ profuisse, quia semper iterum oculo palpebra inhæserit, memorie prodit.

#### De ægylopa fistula oculorum.

**T**iam num in angulo, qui naribus propior est, ex aliquo uicio quasi parua fistula aperitur, per quam pituita assidue destillat αἰνύλωπα græci uocāt: idq; assidue male habet oculum: nonnunquam etiam exeso osse usq; ad nares penetrat, idq; interdum naturam carcinomatis habet. ubi intentæ uenæ & recuruatæ sunt: color pallet: cutis dura est, & leui tactu irritatur: inflamationemq; in eas partes, quæ coniunctæ sunt: euocat. ex his eos, qui quasi carcinoma habent, curare periculosum est. nam mortem quoq; ea res maturat. eos uero quibus ad neres tendit, supernacuum. neq; enim sanescunt. at quibus id in angulo est: potest adhiberi curatio, cum eo ne ignotum sit, esse difficilem: quantoq; angulo propius id foramen est, tanto difficilior est. quoniam per angustum est in quo uersari manus possit. recenti tamen remedi fieri facilius est. sed hamulo summum eius foraminis excipiendum: deinde totum id cauum, sicut in fistulis dixi, usq; ad os excidendum, oculoq; & cæteris iunctis partibus bene obtectis, os ferramento adurendum est uehementius. quod si iam carie uexatum est, quo crassior his squama accedat, quidam adurētia imponunt, ut atramentum sutorium, uel chalcitidem, uel æruginem rasam: quod & tardius & non idem facit. osse adusto curatio sequitur eadem, quæ in cæteris usis.

#### De pilis palpebrarum oculum irritantibus.

**P**ili uero, qui in palpebris sunt duabus de causis oculum irritare consueverunt. nam modo palpebræ superioris summa cutis relaxatur et procidit. quo fit ut eius pili ad ipsum oculum con-

uertantur: quia non simul cartilago quoq; se remisit. modo sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrefcit, qui protinus intus ad oculum tendit. curationes, hæ sunt. si pili nati sunt qui non debuerunt: tenuis acus ferrea ad similitudinem hastæ lata in ignem coniuncta est. deinde atdens sublata palpebra sic, ut eius pernitiosi pili in conspectum curantis ueniant. sub ipsis pilorum radicibus ab angulo mittenda est, ut ea tertiam partem palpebræ transueat. deinde iterum, tertioq; usq; ad alterum angulum. quo fit ut omnes pilorum radices adusta emoriantur. tum superimponendum medicamentum est, quod inflammationem prohibeat. atq; ubi crustæ exciderunt, ad attriticem perducendum. facillime autem id genus sanescit. quidam autem acui transiuxta pilos in exteriorē partem palpebræ oportere, eamq; transmitti duplicem capillum muliebrē ducentam, atq; ubi acus transiit, in ipsius capilli sinum, qua duplicatur, pilum esse coniungendum, et per eum in superiorem palpebræ partem attrahendum, ibiq; corpori agglutinandum, & imponendum medicamentum, quo foramen quoq; glutinetur. sic enim fore ut his pilus in exteriorē partem postea spectet. id primum fieri non potest nisi in pilo longiore, cum ferre breues eo loco nascantur. deinde si plures pili sunt, necesse est longum tormentum: cum totiens acus transuet, magnam inflammationē moveat. Nouissime cum humor aliquis ibi subsit, oculo & ante per pilos, & tum per palpebræ foramina afficito, uix fieri potest ut gluten quo uinctus est pilus, nō resoluitur. eoq; fit ut is, eō unde ut abductus est: redeat ea uero curatio, quæ palpebræ laxioris ab omnibus frequentatur, nihil habet dubij. siquidem oportet contracto oculo mediam palpebræ cutem, siue ea superior, siue inferior est: apprehendere digitis, ac leuare. tum considerare quantulo detracto futurum sit, ut naturaliter se habeat. siquidem hic quoq; duo pericula circumstant. si nimium fuerit exasum, ne contegi oculus non possit. si parum, ne nihil actum sit, & frustra sectus aliquis sit. qua deinde incadendum uidebitur, per duas lineas atramento notandum est sic, ut de interiore, quæ pilos continet et propiore ei linea aliquid relinquatur, quod apprehendere acus postea possit. his constitutis scalpellus adhibendus est. & si superior palpebra est: ante: si inferior, postea propius ipsis pilis incadendum. initiumq; faciendum in sinistro oculo, ab eo angulo, qui tempore in dextro, ab eo qui naribus propior est, idq; qd inter duas lineas est. excidendum. deinde oræ uulneris inter se simplicia sutura committendæ, operiendusq; oculus est, & si parum palpebra descendet, laxanda utiq; si nimium, aut astringenda, aut etiam rursus tenuis habenucla ab ulteriore orâ excidenda. ubi secta est, aliæ

suturae adijciendae, quae supra tres esse non debent. Præter hæc in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiore parte diducti pili sursum spectent. idq; si levis inclinatio est, etiam solum satis tuetur. inferior palpebra eo non eget. his factis spongia ex aqua frigida expressa super deliganda est. postero die glutinans emplastrum iniiciendum. quarto sutura tollenda est: & collirio, quod inflammationes reprimat, superinungendum.

### De lagophthalmo oculorum.

**n** Onnunquam autem nimium sub hac curatione excisa cute evenit ut oculus non contegatur. idq; interdum etiam alia de causa fit: *λαγόφθαλμος* græci appellant. in quo si nimium palpebrae deest, nulla id restituere curatio potest. si exiguum, mederi licet: paulum infra supercilium cutis incidenda est, lunata figura cornibus eius deorsum spectantibus. altitudo esse plagæ usq; ad cartilaginem debet, ipsa illa nihil læsa. nam si ea incisa est, palpebra concidit: neq; attolli postea potest. cute igitur tantum diducta fit, ut paulum in ima oculi ora descendat: hiantem scilicet super plagam, in quam linamentum coniiciendum est: quod & coniungi diductam cutem prohibeat: & in medio atrunculam citet: quæ ubi eum locum implevit, postea recte oculus operitur.

### De ectropio.

**n** T superioris autem palpebrae vitium est, quod parum descendit, ideoq; oculum non contegit: sic inferioris, quod parum sursum attollitur, sed pendet, & hiat, neq; potest cum superiore committi. atq; id quoq; evenit interdum ex simili vitio curationis, interdum etiam senectute: *ἐκτροπίον* græci vocant si ex mala curatione est, eadem ratio medicinae est, quæ supra posita est: plagæ tantum cornua ad maxillas non ad oculum convertenda sunt. si ex senectute est, tenui ferramento id totum extrinsecus adurendum est, deinde melle inungendum. at quarto die uapore aquæ calidæ foveandum, inungendumq; medicamentis ad cicatricem perducentibus.

### De staphylomate oculi.

**b** Nec ferè circa oculum in angulis, palpebrisq; incidere consuerunt. in ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica sine ruptis intus membranis aliquibus, siue laxatis, & si-



milis figura acino fit. unde id  $\pi\epsilon\phi\acute{\upsilon}\lambda\omega\mu\alpha$  græci vocant. curatio duplex est. altera ad ipsas radices per medium transuere, ac duos lina ducente. deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius ex interiore astringere inter se: quæ paulatim secundo id excidunt. altera in summa parte eius ad lenticulæ magnitudinem excidere: deinde spodium, aut cadmiam infriatæ. utrolibet autem facto album oui lana excipiendum & imponendum, posteaq; uapore aquæ calidæ fouendus oculus, & lenibus medicamentis ungendus est.

## De clauis oculorum.

Clauis autem vocantur, callosa in albo oculi tubercula, quibus nomen à figuræ similitudine est. hos ad imam radicem perforare ac commodissimum est, infraq; eam excidere, deinde lenibus medicamentis inungere.

## De natura oculorum, &amp; eorum suffusione.

Suffusionis iam aliàs feci mentionem, quia cum recens incidit, medicamentis quoq; sæpe discutitur: sed ubi uetustior facta est, manus curationem desiderat, quæ inter subtilissimas haberi potest. de qua antequam dico, paucis ipsius oculi natura indicanda est. cuius cognitio cum ad plura loca pertineat, tum uel præcipue ad hunc pertinet. is igitur summas habet duas tunicas: ex quibus superior à græcis  $\nu\epsilon\pi\alpha\tau\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$  uocatur. ea, qua parte alba est satis crassa: pupillæ loco extenuatur. huic interior adiuncta est media parte: qua pupilla est: modico foramine concava, circa tenuis ulterioribus partibus ipsa quoq; plenior. quæ  $\chi\omicron\rho\omicron\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$  à græcis nominatur. hæ duæ tunice cum interiora oculi cingant: rursus sub his coeunt: extenuatæq; & in unum coactæ per foramen quod inter ossa est: ad mēbranam cerebri perueniunt, eoq; inhærescunt. sub his autem, qua parte pupilla est, locus uacuus est. deinde infra rursus tenuissima tunica quam Herophilus  $\alpha\pi\epsilon\chi\omicron\epsilon\iota\delta\epsilon\iota\upsilon$  nominauit. Ea media subsidit, eoq; continuo continet quiddam, quod à uitri similitudine  $\upsilon\alpha\lambda\omicron\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$  græci vocant. id neq; liquidum, neq; aridum est: sed quasi concretus humor, ex cuius colore pupillæ color uel niger est, uel cæsius, cum summa tunica tota alba sit. Id autem superueniens ab interiore parte membrana includit. sub his gutta humoris est oui albo similis, à qua uidendi facultas proficiat,  $\nu\epsilon\pi\upsilon\sigma\alpha\lambda\omicron\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$  à græcis nominatur. igitur uel ex morbo, uel ex ictu concreuit humor sub duabus tunicis, qua locum uacuum esse proposui: usq; paulatim indurefcens interiori potentiæ se opponit. uicijq; eius plures species sunt: quædam sanabiles: quædam

quæ curationem non admittunt. nam si exigua suffusio est, si immobilis: colorem uero habet marinæ aquæ, uel ferri nitentis, & à latere sensum aliquem fulgoris relinquit spes super est. si magna est, si nigra pars oculi amissa naturali figura in aliam uertit, si suffusioni color ceruleus est, aut auro similis, si labat, & hac, atq; illac mouetur, uix unquam suauerritur. ferè uero peior est: quo ex grauiore morbo, maioribus uel capitis doloribus, uel ictu uenementiore orta est. neq; idonea curatio, si senilis ætas est, quæ sine nouo uicio tamen acie hebetem habet. at ne puerilis quidem, sed inter hæc media ætas. oculus quoq; curationi neq; exiguus, neq; concinnus, satis oportunus est, atq; ipsius suffusionis quædam maturitas est. expectandum igitur est donec iam non fluere, sed durities quædam concreuisse uideatur. ante curationem autem modico cibo uti, bibere aquam triduo debet: pridie ab omnibus abstinere. post hæc in aduerso sedili collocandus est loco lucido, lumine aduerso sic: ut contra medicus paulo altius sede at. à posteriore autem parte caput eius, qui curabitur, minister contineat, & immobile id præstet. nam leui motu eripi acies in perpetuum potest. quin etiam ipse oculus qui curabitur: immobilior faciens est, super alterum lana imposita & deligata. curari uero sinister oculus dextra manu, dexter sinistra debet. tum acus admouenda est, aut acuta, aut forte non nimium tenuis, eaq; demittenda: sed recta est per summas duas tunicas medio loco inter nigrum oculi, & angulum temporis propiorem è regione mediæ suffusionis, sic ne quæ uena lædatur. neque tamen timide demittenda est, quia inani loco excipitur, ad quem cum uentum est, ne mediocriter quidem peritus falli potest. quia prementi nihil remittitur. ubi eò uentum est, inclinanda acus ad ipsam suffusionem est, leniterq; ibi uerti, & paulatim eâ deducere infra regionem pupillæ debet. ubi deinde eam transit, uehementius imprimi, ut inferiori parti insidat. si hæsit, curatio expleta est. si subinde redit, eadē acu magis concidenda, & in plures partes dissipanda est: quæ singulæ & facilius conduntur, & minus late offiunt. post hæc educanda acus recta est, imponendumq; est lana molli exceptum oui album, & supra: quod inflammacionem coerceat: atque ita deuinciendum. post hæc opus est quiete, abstinentia, lenium medicamentorum inunctionibus, cibo, qui postero die satis mature datur, primum liquidum, ne maxillæ laborent, deinde inflammatione finita tali, qualis in uulneribus propositus est. quibus, ut aqua quoq; diutius bibatur, necessario accedit.

E pituita quoq; tenuis cursu, qui oculos infestat, quatenus  
d medicamentis agendum est, iam explicui. nunc ad ea ueni-  
am: quæ curationem ex manu postulant. animaduertimus  
autem quibusdam nunquam siccescere oculos, sed semper humore te-  
nuis madere, quæ res asperitudinem continuat, ex leuibus momētis in-  
flammationes et lippitudines excitat, totam deniq; uitam hominis in-  
festat. idq; in quibusdam nulla ope adiuuari potest, in quibusdam sa-  
nabile est. quod primum discrimen est nosse oportet, ut alteri suaur=  
ratur, alteri manus non iniiciatur. ac primum supernacua curatio  
est in his, qui ab infantibus id uicium habent, quia necessario mar su=  
rum est usque ad mortis diem: deinde non necessario etiam in his, q=  
bus non multat, sed acris pituita est. si quidem manu nihil adiuuatur,  
medicamentis & uictus ratione, quæ crassiorem pituitam reddit, ad  
sanitatem perueniunt. latè etiam capita uix medicinae patent. tum in-  
terest uenæ pituitam emittant: quæ inter caluariam & cutem sunt,  
an quæ inter membranam cerebri & caluariam. superiores ferè  
per tempora oculos rigant: inferiores per eas mēbranas, quæ ab ocu-  
lis ad cerebrum tendunt. potest autem adhiberi remedium his: quæ su-  
pra os fluunt, non potest his, quæ sub osse. ac ne his quidem suaurri-  
tur, quibus pituita utrinq; descendit. quia lenata altera parte nihilo-  
minus altera infestat. quid sit autem hoc ratione cognoscitur. raso ca-  
pite ea medicamēta, quibus in lippitudine pituita suspēditur, à super-  
alijis usq; ad uerticem illini debent. si fiat oculi esse coeperunt, appa-  
ret per eas uenas, quæ sub cute sunt, irrigari. si nihilominus madent,  
manifestum est sub osse descendere. si est humor, sed lenior, duplex ui-  
cium est. plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur: quos superiores  
uenæ exerceant, ideoq; pluribus etiam opitulari licet. idq; non in  
græcia tantummodo, sed in alijs quoq; gentibus celebre est, adeo ut nul-  
la medicinae pars magis per nationes quoque exposita sit. reperti in  
græcia sunt qui nouem lineis cutem capitis inciderent, duabus in occi-  
pitis rectis; una super eas transversa, dein duabus super aures, una  
inter eas item transversa, tribus inter uerticem & frontem rectis. re-  
perti sunt qui à capite recte eas lineas ad tempora diducerent: cogni-  
tisq; ex motu maxillarum musculorum inijs, leuiter super eos cutem  
inciderent. inductisq; per retusos hamos oris infererent linamen-  
ta, ut neque inter se cutis antiqui fines committerentur, & in medio  
cāro incretceret, quæ uenas ex quibus humor ad oculos transfret,  
astringeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt à



media aure ad mediam alteram aurem: deinde à naribus ad uerticem tum ubi lineæ committebantur, scalpello inciderunt, & post sanguine fuso os ibidem adusserunt. nihilominus autem: et in temporibus & inter frontem atq; caluariam eminentibus uenis idem candens ferrum admoenerunt. frequens curatio est uenas in temporibus adurere, quæ ferè quidem in eiusmodi malo tument, sed tamen ut inflentur, magisq; se ostendant. ceruix ante modice deliganda est, tenuibusq; ferramentis & retusis uenæ adurendæ, donec in oculis pituitæ cursus conquietetur. id enim signum est quasi excacatorum itinerum per quæ humor ferebatur. ualentior tamen medicina est: ubi tenues conditiæq; uenæ, ideoq; legi non possunt. eodem modo ceruicæ deligata: retentoq; ab ipso spiritu, quo magis uenæ prodeant: atramento notare eas contra tempora et inter uerticem ac frontem: deinde ceruicæ resoluta quæ notæ sunt uenas incidere & sanguinem mittere. ubi satis fluxit, tenuibus ferramentis adurere. contra tempora quidem timide, ne subiecti muscoli, qui maxillas tenent, sentiant: inter frontem uero et uerticem, uehementer, ut sic squama ab osse recedat. efficacior tamè etiam nunc est asrorum curatio, qui uerticem usq; ad os adurunt sic, ut squamam remittat. sed nihil melius est quam quod in gallia quoq; comata sit. ubi uenas in temporibus et in superiore capitis parte legunt. adusta quomodo curanda sint iam explicui. nunc illud adiicio, neq; ut crustæ decidant: neq; ut ulcus impleatur adustis uenis esse properandum. ne uel sanguis erumpat, uel cito pus supprimatur, cum per hoc siccæscere eas partes opus sit: per illud exhauriri opus non sit. si quando tamen sanguis eruperit, infricanda medicamenta esse, quæ sic sanguinem supprimant, ne adurant. quemadmodum autem uenæ deligendæ sint: quidq; lectis his faciendum sit, cum uenero ad crurum narices dicam.

De aurium morbis, qui manu & scalpello curantur. Cap. VIII.

¶ Erum ut oculi multiplicem curationem etiam manus exigunt: sic in auribus admodum pauca sunt: quæ in hac medicinæ parte tractentur. solet tamen euenire uel à primo natali die protinus, uel postea facta exulceratione, deinde per acariem aure repleta, ut foramen in ea nullum sit, ideoq; audiendi usu careat. quod ubi incidit: specillo tentandum est, alte ne id repletum, an in summo tantum glutinatum sit. nam si alte est: prementi non cedit. si in summo, specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet, ne sine effectus spe distentio oriatur riuorum. & ex ea mortis periculum sit. hoc facile curatur nam quæ cauum esse debet, uel medicamen-  
tum

tum aliquod imponendum est ex adurentibus, uel candente ferro aperiendum, uel etiam scalpello incidendum. cumq; id patefactum, & iam ulcus purum est: conijcienda cō pinna est illita medicamento cicatricem inducente, circaq; idem medicamentum dandum, ut cutis circa pinnam sanescat: quo fit ut ea remota postea facultas audiendi sit: at ubi aures: in uiro puta, perforatæ sunt, & offendunt, traicere id cōnū celeriter candente acu satis est, ut leniter eius ora exulceretur, aut etiam adurenti medicamento idem exulcerare: postea deinde imponere id quod purget, tum quod eum locum repleat, & sic cicatricem inducat. quod si magnū id foramen est, sicut solet esse in his, qui maiora pondera auribus gesserunt: incidere quod superest ad extremum oportet, supra deinde oras scalpello exulcerare, & postea suere, ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere. tertium est: si quid ibi curti est, sarcire. quæ res cum in labris quoq; & naribus fieri possit: eandem autem rationem habeat, simul explicanda est.

Curta in auribus, labrisq; ac naribus, quomodo sarciri & curari possint. Cap. IX.

Vrta igitur in his tribus, ac si qua parua parua sunt: cura  
 c ri possunt: si qua maiora sunt, aut non recipiunt curationem aut ita per hanc ipsam deformantur, ut minus indecora ante fuerint. atq; in aure quidem & naribus deformitas sola time-  
 ri potest. in labris uero si nimium contracta sunt, usus quoq; necessarij iactura fit. quia minus facile & cibis assumitur, & sermo explicatur. neq; enim creatur ibi corpus: sed ex vicino adducitur: quod in leui mutatione & nihil eripere, & fallere oculum potest: in magna non potest: neq; senile autem corpus, neq; quod mali habitus est, neq; in quo difficulter ulcera sanescunt, huic medicinæ idoneum est: quia nusquam celerius cancer occupat, aut difficilius tollitur. ratio curationis eiusmodi est. id quod curatum est in quadratum redigere. ab interioribus eius angulis lineas transversas incidere, quæ ceteriorē partem ab ulteriore ex toto diducant: deinde ea quæ sic resolvimus, in unum adducere: si nō satis iunguntur, ultra lineas, quas ante fecimus, alias duas lunatas, & ad plagam conuersas immittere, quibus summa tantum cutis diducatur. sic enim fit ut facilius quod adducitur, sequi possit: quod non ui cogendum est, sed ita adducendum, ut ex facili subsequatur, & demissum non multum recedat. interdum autem ab altera parte cutis haud omnino adducta, deformem quem reliquit locum reddit. Huiusmodi loci altera pars incidenda, altera intacta ha-

benā est. ergo neq; ex imis auribus, neq; ex medio naso imis uenarum partibus, neq; ex angulis labrorum quicquam attrahere tentabimus. utrinq; autem petemus: si quid summis auribus, si quid imis, si quid aut medio naso, aut medijs naribus, aut medijs labris decrit. quæ tamen interdum etiam duobus locis curata esse consuerunt. sed eadem ratio curandi est. si cartilago in eo quod incisum est, eminet: excidenda est. neque enim aut glutinatur, aut acutototrajicitur. neq; longe tamen excidi debet: ne inter duas oras liberæ cutis, utrinq; coitus puris fieri possit. tum iunctæ oræ inter se suendæ sunt utrinq; cuncte apprehensa, et quæ priores lineæ sunt: ea quoq; suturæ iniiciendæ sunt. sicutis locis, ut in naribus, illita spuma argenti satis proficit. in ultiores uero lunatasq; plagas linamentum dandum est, ut caro incretenscens uulnus impleat, summaq; cura quod ita sutum est, tuendum esse apparere ex eo potest, quod de cancro supra posui. ergo etiam tertio quoq; die fouendum erit uapore aquæ calidæ: rursusq; idem medicamentum iniiciendum, ferèq; septimo die glutinatum est. tum suturæ eximi, et uulnus ad sanitatem perducere debent.

#### De polypi curatione per ferrum. Cap. X.

**P**olypum uero, qui in naribus nascitur, præcipue ferro curari iam aliàs posui. ergo etiam hunc ferramento acuto in modum spatulæ factō resolueri ab osse oportet adhibita diligentia, ne infra cartilago laedatur, in qua difficilis curatio est. ubi abscissus est, unco ferramento extrahendus est. tum implicitum linamentum, uel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis supprimitur: eoq; nares leniter implendæ. sanguine suppresso, linamento ulculum purgandum est. ubi purum est, eo pinna eodem modo quo in aure supra positum est, medicamento illita, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat.

#### De ozæna. Cap. XI.

**I**dem uitiū, quod ὀζæνα à græcis uocatur, si medicamenti non cederet, quemadmodum manu curandum esset, apud magnos chirurgos non reperi. Credo quia res raro ad sanitatem satis proficit: cum aliquod in ipsa curatione tormentum habeat. apud quosdam tamē positum est uel suilem fistulam, uel erodem scriptorium calan. un in narem esse coniiciendum, donec sursum ad os perueniat: tum per id tenuē ferramentum candens dandum



esse ad ipsum os: deinde adustum locum purgandum esse ærugine & melle. ubi purus est: lyco ad sanitatem perducendum. uel narem incidendam esse ab ima parte ad os, ut & conspici locus possit, & facilius candens ferramentum admoueri. tum sui narem debere, & adustum quidem ulcus eadem ratione curari. futuram uero illini uel spuma argenti uel alio glutinante.

De ore uicijs, quæ manu & ferro curantur.

Cap. XII.

De dentibus.

**I**N ore quoq; quædam manu curantur. ubi in primis dentes nonnunq; moventur, modo propter radicum imbecillitatem, modo propter ginguarum arescentium uicium. oportet in utrolibet candens ferramentum ginguis admouere, ut leuiter attingat, non ut insadat. adustæ ginguæ melle illinendæ, & nullo eluendæ sunt. ut pura ulcera esse cæperunt, arida medicamēta infricanda sunt ex his quæ reprimunt. si uero dens dolores mouet, eximūq; eum, qui a medicamentis nihil adiuvant, placuit, circumradi debet, ut gingua ab eo resoluaatur. tum is concutiendus est. eaq; faciendæ donec bene moueatur. nam dens hærens cum summo periculo euellitur, ac nonnunq; maxilla loco mouetur. idq; etiam maiore periculo in superioribus dentibus fit, quia potest tempora oculis uel cõcutere. tum si fieri potest manu, si minus, forfice dens excipiendus. ac si exesus est, ante id foramen, uel linamento, uel bene accommodato plumbo replendum est ne sub forfice confringatur: recta uero forfex ducenda est, ne inflexis radicibus: os earū, cui dens inhæret, parte aliqua frangatur. neq; ideo nullum eius rei periculum est, utiq; in dentibus breuibus, qui ferè longiores radices, habent. sæpè enim forfex cum dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehendat, os ginguæprehendit & frangit. protinus autem ubi plus sanguinis profluit, scire licet aliquid ex osse fractum esse. ergo speallo conquirenda est testis, quæ recessit & uolsella protrahenda est. si non sequitur, incidi gingua debet, donec labans ossis testa recipiatur. quod si fractum statim nõ est, indurefcit extrinsecus maxilla, ut is hiare non possit. sed imponendū cali dū ex farina et fimo cataplasma est, donec ibi pus moueatur. tum incidi gingua debet. pus quoq; multum profluēs ossis fracti nota est. itaq; etiam tum id extrahi conuenit. nonnunquam etiam eo lesa, fistula fit quæ eradi debet. Dens autem scaber, qua parte niger est, radendus est, illinendusq; rose flore contrito, cui gallæ quarta pars & altera myrrha sit adiecta. continendūq; ore crebro uinum meratum. atque

## LIBER

in eo casu uelandum caput, ambulatione multa, frictione capitis: cibo non acri utendum est. at si ex ictu uel alio casu aliqui labant dentes, auro cum his, qui bene hærent, uinciendi sunt. continendâq; ore reprimentia, ut uinum in quo malicorium decoctum, aut in quo galla candens coniecta sit. Si quando etiam in pueris alter dens nascitur, quam prior excidat, is qui cadere debuit circum purgandus, & euellendus est: is qui natus est in locum prioris quotidie digito adurgendus, donec ad iustam magnitudinem perueniat. quotienscunq; dente exëpto radix relicta est, protinus ea quoq; ad id facta forficæ, quam p̄l'æv græci uocant: eximenda est. Tonsillas autem quæ post inflammationes induruerunt: ἀρτρώδες autem græcis appellantur: cum sub leuitata sint, oportet digito circum radere & euellere: si ne sic qdem resoluantur, hamulo excipere, & scalpello excidere: tum ulcus aceto cluere, & illinere uulnus medicamento, quo sanguis supprimatur.

### De uia.

¶ Va si cum inflammatione descendit, doloriq; est, & sub rubicundi coloris: præcidi sine periculo non potest. solet enim multum sanguinem effundere. itaq; melius est his uti, quæ aliâs proposita sunt. si uero inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra iustum modum à pituita deducta est, & est tenuis, acuta, alba, præcidi debet. itemq; si ima, liuida & crassa, summa, tenuis est. neq; quicquam commodius est quam uolsellaprehendere, sub eâq; quod uolumus, excidere. neq; enim ullum periculum est, ne plus minus'ue præcadatur: cum liceat tantum infra uolsellam relinquere: quantum inutile esse manifestum est: idq; præcadere quo longior uia est, quam esse naturaliter debet. post curationem eadem facienda sunt, quæ in tonsillis proxime posui.

### De lingua.

¶ Inguæ uero quibusdam cum subiecta parte à primo natali die iuncta est, qui ob id ne loqui quidem possunt. horum extrema lingua uolsellaprehendenda est, sub eâq; membrana incidenda magna cura habita, ne uenæ quæ iuxta sunt: uiolenter, et profusione sanguinis noceant. reliqua curatio uulnervis in prioribus posita est: & pleriq; quidem, ubi consanuerunt, loquuntur. ego autem cognoui qui succisa lingua, cum abunde super dentes eam promeretur, non tamen loquendi facultatem consecutus est. adeo in medicina etiam ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est id, quod sequi conuenit.

**S**ub lingua quoque interdum aliquid abscedit, quod ferè consistit in tunica: doloresque magnos mouet. quod si exiguum est, incidi semel satis est. si maius, summa cutis usque ad tunicam excidenda est: deinde utrinque orae hanululis excipiendae, & tunica undique circumdata liberanda est, magna diligentia per omnem cautionem habita, ne qua maior uena incidatur.

De labris.

**L**abra autem saepe finduntur, earumque res habet cum dolore etiam hanc molestiam, quod sermo prohibetur: qui subinde eas rimas cum dolore diducendo sanguinem citat: sed has, si in summo sunt, medicamentis curare commodius est, quae ad ulcera oris fiunt. si uero altius descenderunt, necessariū est tenui ferramento adurere: quod spatulae simile quasi transcurrere, non imprimi debet. postea faciendae eadem sunt, quae in auribus adustus exposita sunt.

De cernicis uicijs, & curatione. Cap. XIII.

**I**n ceruice inter cutem, & asperam arteriam tumor incre-  
**a** scit: ῥοχοίλινυ græci uocant. quo modo atro hebes, modo humor aliquis melli, aquaeue similis includitur: interdum etiam minutis ossibus pili immixti, ex quibus quicquid est quod tunica continetur, potest adurentibus medicamentis curari, quibus summa cutis cum superiecta tunica exeditur. quo facto siue humor est, profluat: siue quid densius, deinde digitis educitur: tum ulcus sub linamentis sanescit: sed scalpelli curatio breuior est. Medio tumore una linea inciditur usque ad tunicam: deinde uiciosus sinus ab integro corpore digito separatur: totusque cum uelamento suo eximitur. tum aceto, cui uel salem, uel nitrum aliquis adiecit, eluitur. oraeque una sutura iunguntur: ceteraque eadem quae in alijs suturis super injiciuntur. Leniter deinde, ne fauces urgeat, deligatur. si quando autem tunica eximi non potuerit, intus inspergenda adurentia: linamentisque id curandum est ceteris prae mouentibus.

De umbilici uicijs. Cap. XIII.

**S**unt etiam circa umbilicum plura uicia, de quibus propter raritatem inter auctores parum constat. Verisimile est autem id à quoque praetermissum, quod ipse non cognouerat: à nullo, id quod



non uiderat, fictum commune omnibus est, umbilicum indecore prominere. causæ requiruntur. meges tres has posuit. modo intestinū eò irrumperet. modo omentum. modo humorem. Sostratus nihil de omento dixit. duobus hisdem adiecit, carnem ibi interdum increescere, eamq; modo integram esse, modo carcinomati similem. Gorgias ipse quoque omenti mentionem omisit. sed eadem tria causatus spiritum quoq; interdum eò dixit irrumperet. Heron omnibus his quatuor positis, & omenti mentionem habuit, & eius quod simul & omentum & intestinum habuerit. quid autem horum sit, his indicijs cognoscitur. ubi intestinum prolapsum est, tumor neque durus neque mollis est omni frigore comminuitur, non solum sub omni calore, sed etiam retento spiritu crescit. sonat interdum, atq; ubi resupinatus est aliquis delapso intestino ipse desidit. ubi uero omentum est, cætera similia sunt, tumor mollior & ab una parte latus extenuatum in uentrem<sup>us</sup> est. si quis apprehendit: elabitur. ubi utrunque est: inditia quoque mixta sunt, & inter utrunque mollities. at caro durior est, semperq; etiam resupinato corpore tumet, prementiq; non cedit, prioribus facile cedentius. si uiciosa est easdem notas habet, quas in carcinomate exposui. humor autem si premitur: circumfluit. at spiritus pressus cedit, sed protinus redit resupinato quoq; corpore tumorem in eadem figura tenet. ex his id quod ex spiritu uicium est, medicinam non admittit. caro quoq; carcinomati similis cum periculo tractatur. itaq; omittenda est. sana exadi debet, idq; uulnus linamentis curari. humorem quidam uel inciso summo tumore effundunt, & uulnus hisdem linamentis curant. in reliquis uariæ sententiæ sunt. ac resupinandum quidem corpus esse res ipsa testatur, ut in uterum, siue intestinum, siue omentum est, delabatur. sinus uero umbilici tum uacius à quibusdam duabus regulis exceptus est, uehementerq; earum capitibus deligatis ibi emoriatur. à quibusdam id uicium acutius tractatur duo lina ducente. deinde utriusq; lini duobus capitibus diuersæ partes astringuntur. quod in una quoq; oculi fit. nam sic id quod supra uinculum est, moritur. adiecerunt quidam, ut antequam uincerent: summum una linea incidere, exadereq; quo facilius digito demisso, quod illuc irrupisset, depellerent. tum deinde uinxerunt. sed aliunde est, iubere spiritum continere, ut tumor quantus maximus esse potest, se ostendat. tum inam basim eius atramento notare, resupinatq; homine, digitis tumorem eum premere, ut si quid delapsum non est: manu cogatur. post hæc umbilicum attrahere, & qua nota atramenti est lino uehementer astringere. deinde partem superiorem aut medicamentis aut ferro adurere donec emoriatur. atq; ut cætera uisita ulcus nutri-

re: idq; non solum ubi intestinum uel omentum, uel utrunque est, sed etiam ubi humor est: optime proficiat sed ante quædam uisenda sunt, ne quod ex uinulo periculum sit. nam curationi neque infans, neque aut robustus annis, aut senex aptus est, sed à septimo ferè anno ad quartumdecimum. deinde ei corpus idoneum est id, quod integrum est. at quod mali habitus est, quodq; papulas, impetigines, similiaq; habet idoneum non est. leuibus quoq; tumoribus facile subuenitur. at in eorum, qui nimis magni sunt, curatione periculum est. Tempus autem anni & autumnale & hibernum uitandum est. uer idoneum maxime est. ac prima æstas non aliena est. præter hæc abstinere pri die debet. neq; id satis est. sed alius quoq; ei ducenda est, quo facilius omnia quæ exæsserunt, intra aluum considant.

Quomodo aqua hydropicis emittatur.

Caput quintumdecimum.

Quam his qui hydropici sunt emitti oportere alijs dixi. a nunc quemadmodum id fiat dicendum est. quidam autem sub umbilico ferè quattuor interpositis digitis à sinistra parte. Quidam ipso umbilico perforato facere consuerunt. quidam cute primam adusta, deinde interiore abdomine inqso. quia quod per ignem diuisum est, minus celeriter coit. ferramentum autem demittitur: magna cura habita ne qua uena inadatur. id tale esse debet, ut ferè tertiam digiti partem latitudo mucronis impleat. demittendumq; ita est: ut membranam quoque transeat: qua caro ab interiore parte finitur: eò tum plumbea aut aenea fistula coniungenda est, uel recuruatis in exteriorem partem labris, uel in media circum surgente, quadā mora ne tota intus delabi possit. huius ea pars quæ intra paulo longior esse debet, quàm quæ extra, ut ultra ulteriorem membranam procedat, per hanc effundendus humor est. atq; ubi maior pars eius euocata est, cludenda demisso lintzolo fistula est, & in uulnere, si id uisum non est: relinquenda. deinde per insequentes dies circa singulas heminas emittendum, donec nullum aquæ uestigium appareat. quidam tamen etiam non uisita cute protinus fistulam recipiunt, & super uulnus spongiam expressam deligant. deinde postero die rursus fistulam demittunt: quod recens uulnus paulum diductum patitur, ut siquid humoris superest, emittatur: idq; bis ita fecisse contenti sunt.

n Onnunquam autem uenter ictu aliquo perforatur : sequi-  
 turq; ut intestina euoluantur. quod ubi incidit, protinus con-  
 siderandum est, an integra ea sint, deinde an his color suus  
 maneat. si tenuius intestinum perforatum est, nihil profici posse iam  
 retuli. latius intestinum sui potest, non quod certa fiducia sit, sed quod  
 dubia spes, certa desperatione si potior. interdum enim glutinatur. tū  
 si utrumlibet intestinum liuidum, aut pallidum, aut nigrum est, qui-  
 bus illud quoq; necessario accedit, ut sensu careat: medicina omnis ina-  
 nis est. si uero adhuc ea sui coloris sunt, cum magna festinatione suc-  
 currendum est. Momento enim alienantur externo, & insueto spirita  
 circumdata. Resupinandus autem homo est coxis erectioribus. & si  
 angustius uulnus est, quā ut intestina commode refundantur, inci-  
 dendum est donec satis pateat. Ac si iam siciora intestina sunt, perlu-  
 enda aqua sunt: cui paulum admodum olei sit adiectum. tum mini-  
 ster oras uulneris leuiter diducere manibus suis, uel etiam duobus  
 hamis membranæ interiori iniectis debet. medicus priora semper in-  
 testina quæ posteriora prolapsa sunt, condere sic, ut orbium singulorū  
 locum seruet: repositis omnibus, leniter homo concutiendus est. quo fit  
 ut per se singula intestina in suas sedes diducantur: & inibi confidat.  
 his conditis omentum quoq; considerandum est: ex quo si quid iam  
 nigri, & emortui est, forsice excidi debet. si quid integrum est, leuiter  
 super intestina diduci. futura autem neq; summæ cutis, neq; interioris  
 membranæ per se satis proficit, sed utriusq;. & quidem duobus linis  
 uincienda est spissior quā alibi, quia & rumpi facilius motu uen-  
 tris potest, & non æque magnis inflammationibus pars ea exposita  
 est. igitur in duas acus fila coniicienda, eaq; duabus manibus tenenda:  
 & prius interiori membranæ sutura iniicienda est sic, ut sinistra  
 manus in dexteriore ora, dextra in sinisteriore à principio uulne-  
 ris orsa, ab interiori parte in exteriorem aciem immittat. quo fit, ut  
 ab intestinis ea pars semper aciem longe sit, quæ retusa est: semel  
 utraq; parte traiecta permutandæ acus inter manus sunt, ut ea sit in  
 dextra, quæ fuit in sinistra: ea ueniat in sinistram, quam dextra con-  
 tinuit. iterumq; eodem modo per oras immittendæ sunt. Atq; ita ter-  
 tio, et quarto: deincepsq; permutatis inter manus acibus includendæ  
 plaga. post hæc eadem fila, eademq; acus ad cutem transferendæ.  
 similiq; ratione ei quoq; parti utraq; sutura iniicienda semper ab in-  
 teriore parte acibus uementibus semper inter manus traiectis. dein  
 glutinantia iniicienda, quibus aut spongram, aut succidam lanam ex  
 aceto



aceto impressam acedere debere manifestus est, quàm ut semper dicendum sit. impositis his leuiter deligari uenter debet.

De interiore parte abdominis rupta, & qua ratione curanda sit. Cap. XVII.

*i* Nterdum tamen uel ex ictu aliquo, uel retento diutius spiritu, uel sub graui fasce interior abdominis membrana superiore cute integra rumpitur. quod foeminis quoque ex utero saepe euenire consuevit, sitque praecipue circa ilia. sequitur autem cum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisque intentae cutis indecore intumescat. atque id quoque aliter ab alijs curatur. quidam enim per acum duobus lineis ad iniam basim immixtis, sic utrinque deuinciunt, quemadmodum & in umbilico, & in uina positum est, ut quicquid super uinculum est, emoriatur. quidam medium tumorem exadunt ad similitudinem myrtacei folij. quod semper eodem modo seruandum esse iam posui, & tum oras sutura iungunt. commodissimum est autem resupinato corpore, experiri manu qua parte is tumor maxime cedat: quia necesse est ea parte rupta membrana sit, quaque integra est, ea magis obnitatur. tum qua rupta uidebitur, immittendae scalpello duae lineae sunt: ut exciso medio interior membrana utrinque recentem plagam habeat. quia quod uetus est: sutura non coit loco patefacto. si qua parte membrana non nouam plagam, sed ueterem habet: tenuis exadenda habena est, quae tantum ora eius exulceret. caetera, quae ad suturae reliquam curationem pertinent, supra comprehensa sunt.

De varicibus uentris.

*p* Ræter hæc euenit, ut in quorundam uentribus varices sint. quarum, quia nulla alia curatio est: quàm quae in cruribus esse consuevit, tum eam partem explanaturus hanc quoque ediffero.

De testiculorum natura, & morbis eorum. Cap. XVIII.

*u* Enio autem ad ea: quae in naturalibus partibus circa testiculos oriri solent. quae quo facilius explicem, prius ipsius loci natura paucis proponenda est. igitur testiculi simile quidam medullis habent. nam sanguinem non emittunt, & omni sensu carent. dolent autem in ictibus & inflammationibus tunicae, quibus hi continentur. dependent uero ab inguinibus per singulos nervos quos *νεύρα τῶν ποδῶν* graeci nominant: cum quorum utroque tunc descendunt

Aurelij Cor.

q

& uenæ, & arteriæ. hæ autem tunicae conteguntur tenui, nervosa, si-  
 ne sanguine alba, quæ ἐλαφροειδὴς à græcis nominatur. super eā va-  
 lentior tunica est: quæ interiori uehementer ima parte inheret, δ'ἀρ-  
 πων græci uocant. Multæ deinde membranulæ uenas et arterias, eosq;  
 nervos comprehendunt: atq; inter duas quoq; tunicas superioribus par-  
 tibus leues, paruulæq; sunt. hæcenus propria utriq; testiculo & ue-  
 lamenta, & auxilia sunt. communis deinde utriq; omnibusq; interio-  
 ribus sinus est, qui iam conspicitur à nobis, ὀρχέων græci, scrotum no-  
 stri uocant, uq; ab ima parte medijs tunicis leuiter innexus est, à supe-  
 riore tantum arcundatus est. sub hoc igitur plura uicia esse consue-  
 runt. quæ modo ruptis tunicis, quas ab inguinibus incipere proposui,  
 modo his integris fiunt. siquidem interdum uel ex morbo primum  
 inflammatur, deinde postea pondere abrumpitur. uel ex ictu aliquo  
 protinus rumpitur tunica, quæ diducere ab inferioribus partibus in-  
 testina debuit. tum pondere eo deuoluitur, aut omentum, aut etiam in-  
 testinum. atq; ibi reperta uia, paulatim, aut ab inguinibus inferiores  
 quoq; partes nisum subinde nervosas tunicas, & ob id eius rei patien-  
 tes diducit ἐντερονόλην, & ἐπιπλοκοίλην græci uocant, apud nos in-  
 decorum, sed commune his herniæ nomen est. deinde si descēdit omē-  
 tum, nunq̃ in scroto tumor tollitur, siue inedia fuit, siue corpus huc il-  
 luc uel conuersum, aut aliquo modo collocatum. itemq; si retentus est spi-  
 ritus, non magnopere increscit. tactu uero inæqualis est, & mollis, et  
 lubricus. at si intestinum quoq; descendit, humor his sine inflamma-  
 tione modo minuitur, modo increscit. estq; ferè sine dolore, & cum  
 conquiescit aliquis aut iacet, interdum ex toto desinit, interdum sic di-  
 uiditur, ut in scroto exiguae reliquiae maneant. at si clamore & facie-  
 tate, & si sub aliquo pondere is homo nixus est, crescit: frigore omni  
 contrahitur: calore diffunditur. estq; tum scrotum, & rotundum, &  
 tactu leue: idq; quod subest: lubricum est, si pressum est, ad inguen re-  
 uertitur, demissumq; iterum cum quodā quasi murmure deuoluitur.  
 & id quidem in leuioribus malis euenit. nonnunq̃ autem stercore  
 accepto uastius tumet, retroq; compelli non potest: affertq; tum dolore,  
 & scroto, & inguinibus, & abdomini: nonnunq̃ stomachus quoque  
 affectus, primum ruffam bilem per os reddit, deinde uiridem, qui-  
 busdam etiam nigram. integris uero membranis interdum eam par-  
 tem humor dstringit. atq; eius quoq; species duæ sunt: nam uel inter  
 tunicas is increscit, uel in membranis quæ ibi circa uenas & arteri-  
 as sunt, ubi hæ grauatae oculauerunt. ac ne ei quidem humori, qui  
 inter tunicas est, una sedes est. nam modo inter summam et mediam,  
 modo inter mediam & imam consistit. græci communi nomine quic-

quid est ὄστροκοιλὴν appellant. nostri ut scilicet nullis discriminibus satis cognitis, hæc quoq; sub eodem nomine, quo priora habent. signa autem quædam communia sunt, quædam propria. communia quibus humor deprehenditur. propria: quibus loci humorem subesse dicimus. si tumor est nunquam ex toto se renitens: sed interdum lenior, aut propter famem, aut propter febriculam, maximèq; in pueris, hisq; mollis est, si non nimius humor subest. at si his uehementer increuit, renititur sic, ut uter repletus, & arte astrictus. uenæ quoque in scroto instantur, & si digito pressimus, audit humor, circumfluensq; id quod non premittitur: attollit, & tanquã in vitro cornu uel per scrotum apparet: usq; quantum in ipso est, sine dolore est. sedes autem eius sic deprehenditur: si inter summam, mediamq; tunicam est, cum digitis duobus pressimus, paulatim humor inter eos reuertens subit. scrotum ipsius & albidius est. si ducitur, aut nihil, aut paruum intenditur. testiculus ea parte neq; uisu, neq; tactu sentitur. at si sub media tunica est, intentum scrotum magis se attollit, adeo ut superior coles sub tumore eò delitescat. præter hæc æque integris tunicis ramæ innascitur, ὀστροκοιλὴν græci appellant. uenæ intumescunt, hæ quoq; intortæ, conglomeratæq; ad superiorem partem, uel ipsum scrotum implent, uel mediam tunicam, uel imam: interdum etiam sub ima tunica circa ipsum testiculum, neruumq; eius inrescunt. ex his ea quæ in ipso scroto sunt, oculis patent. hæ uero quæ mediæ, imæ uel tunice insident, ut magis conditæ, non æquæ quidem cernuntur, sed tamen etiam uisui subiectæ sunt, præterquam quod & tumoris aliquid est pro uenarum magnitudine et modo, et id prementi magis renititur, ac per ipsos uenarum toros inæquale est, & qua parte id est, testiculus magis iusto dependet. cum uero etiam super ipsam testiculum, neruumq; eius id malum increuit, aliquanto longius testiculus ipse descendit, minorq; altero fit, ut pote alimento amisso. Raro sed aliquando atro quoq; inter tunicas increscit, σαρκοκοιλὴν græci uocant. interdum etiam ex inflammatione tumet ipse testiculus, ac febres quoque affert, & nisi celeriter ea inflammatio conquieuit, dolor ad inguina atq; ilia peruenit: partesq; hæ intumescunt. neruus, ex quo testiculus dependet, plenior fit, simulq; indurescit super hæc, inguen quoque nonnunquam uarices implent: βομβοκοιλὴν appellant.

De testiculorum curationibus communibus, & primo de incisione, & curatione inguinis, uel scroti. Caput. XIX.

**h** Is cognitis de curatione dicendum est, in qua quædam communia omnium sunt, quædam propria singulorum. prius de com-



# LIBER

munibus dictam . loquar autem nunc de his, quæ scalpellum desiderant: nam quæ uel sanari non possint, uel aliter nutrirî debeant, dicendum erit simul cum ad species singulas uenero. inciditur autem interdum inguen, interdum scrotum. in utraq; curatione homo ante tri-  
duum bibere aquam pridie: abstinere etiam à cibo debet, ipso autem die collocari supinus, deinde si inguen incidendum est, idq; iam pube contegitur, ante radendum est, & tum extento scroto, ut cutis inguinis intentâ sit: id incidendum sub imo uentre, quâ cum abdomine tunicæ inferiores cõmittuntur. aperiendum autem audacter est donec summa tunica, quæ ipsius scroti est, incidatur: perueniaturq; ad eam, quâ media est plaga facta. foramen deorsum uersus subest. in id demittendus est sinistra manus digitus index, ut diductis interueniëntibus membranulis simul laxet. minister autem sinistra manu comprehenso scroto sursum uersus cum debet extendere: & quàm maxime ab inguinibus abducere, primum cum ipso testiculo, dum medicus omnes membranulas quæ super mediam tunicam sunt: si digito diducere non potest, scalpello abscidat: deinde sine eo, ut is delapsus ipsi plagæ iungatur, digitoq; inde promatur, & super uentrem cum duabus suis tunicis collocetur. inde si quæ uiciosa sunt, circumcudenda sunt. in quibus cum multæ uenæ discurrant, tenuiores quidem præcidi protinus possunt: maiores uero ante longiore lino deligandæ sunt, ne periculose sanguinem fundant. sin media tunica uexata erit, aut sub ea malum increuerit, excidenda erit sic, ut alte ad ipsum inguen præcidatur. infra tamen non tota demenda est. nam quod ad basim testiculi uehementer cum ima tunica connexum est, excidi sine summo periculo nõ potest. itaq; ibi relinquendum est. idem in ima quoq; tunica, si læsa est, faciendum est. sed non à summa inguinis plaga, uerum infra paulum ea abscidenda, ne læsa abdominis membrana inflammationes moueat. neq; tamen nimium ex ea sursum relinquendum est, ne postea sinuetur, & sedem eidem malo præstet. purgatus ita testiculus per ipsam plagam cum uenis, & arterijs, & neruo suo leuiter demittendus est, uidendumq; ne sanguis in scrotum descendat, ne uel concretus aliquo loco maneat. quæ ita fient, si uenis uinciendo medicus prospexerit. lina quibus capita earum continebuntur, extra plagam dependere debebunt. quæ pure orto sine ullo dolore excident. ipsi autem plagæ iniiciendæ duæ fibulæ sunt, & insuper medicamentum, quo glutinentur. solet interdum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi, ut cicatrix maior & latior fiat. quod ubi incidit, linamenta super non fulcienda, sed leuiter tantum ponenda sunt. supraq; ea quæ inflammationem repellant, idest ex aceto, uel lina succida, uel spongia. cætera eadem

eadem: quæ, ubi pus moueri debet, adhibenda sunt. at cum infra inci-  
di oportet, resupinato homine subiicienda sub scroto sinistra manus est,  
deinde id uehementer apprehendendum & incidendum. si parum-  
lum est quod nocet, modice: ut tertia pars integra ad sustinendum tes-  
ticulum infra relinquatur. si maius est, etiam amplius, ut paulum  
tantummodo ad inuicem, cui testiculus insidere possit: integrum mane-  
at. sed primo rectus scalpellus quàm leuissima manu teneri debet, do-  
nec scrotum ipsum diducat. tum inclinandus mucro est, ut transversa  
membrana fecer, quæ inter summam, mediamq; tunicam sunt. at si  
uicium in proximo est, mediam tunicam attingi non oportet. si sub il-  
la quoq; conditur, etiam illa incidenda est sic, ut tertia quoq; si illa ui-  
cium tegit. ubicunq; repertum malum est, ministerium ab inferiore par-  
te exprimere moderate scrotum oportet, medicum digito, manubriolo,  
uel scalpello diductam inferiorem partem tunica extra collocare: de-  
inde eam ferramento quo ad similitudinem curium uocant, incide-  
re sic, ut in eandem intrare duo digiti index & medius possint. his  
deinde coniectis excipienda reliqua pars tunicae, & inter digitos scal-  
pellus immittendus est: eximendumq; aut effundendum quicquid est  
noxium: quancunq; autem tunicam quis uolauit, illam quoq; debet  
excidere, ac mediam quidem, ut supra dixi, quàm altissime ab ingui-  
ne, imam autem paulo infra. cæterum anteq; excidantur, hæ quoque  
uinari lino summe debent, & eius lini capita extra plagam relin-  
quenda sunt, sicut in alijs quoq; uenis, quæ id requisierint. eo facto tes-  
ticulus intus reponendus est, oræq; scroti suturis inter se committen-  
dæ, neq; paucis, ne parum glutinentur, & longior fiat curatio, neque  
multis, ne inflammationem augeant. atq; hic quoq; uidendum est, ne  
quid in scroto sanguinis maneat. tum imponenda glutinantia sunt.  
si quādo autem in scrotum sanguis defluxit, aliquid ne concretum ex  
eo decidit, incidi subter id debet, purgatoq; eo spongia acri aceto ma-  
dens circumdari. deligatur autem uulnus omne, quod ex his causis fi-  
ctum est. si dolor nullus est, quinque primis diebus non est resoluen-  
dum, sed bis die tantum aceto irroranda lana uel spongia. si dolor  
est: tertia die resoluendum, et ubi fibulae sunt, hæ incidendæ, ubi lina-  
mentum id nutandum est, resaq; & uino madefaciendum id, quod  
imponitur. si inflammatio increscit, adiiciendum prioribus catapla-  
sma ex lenticula & melle, uel ex malicorio, quod in austero uino co-  
ctum sit, uel ex his mixtis. si sub his inflammatio non cōquirit post  
diem quintum multa calida aqua uulnus fouendum, donec scrotum  
psu m & extenuetur & rugosius fiat. tum imponendum catapla-  
sma ex triticea farina, cui resina pinea adiecta sit. quæ ipsa si robu

stus curatur, ex aceto: si tener, ex melle coquenda sunt. neq; dubium est quodcunq; initium fuit, si magna inflammatio est, quin ea, quæ pus mouent, imponenda sint. quod si pus in ipso scroto ortum est, paulum id incidi debet, ut exitus detur. linamentumq; eatenus imponendum est, ut foramen tegat. inflammatione finita propter nervos priore cataplasmate, dein cerato utendum est. Hæc proprie ad eiusmodi vulnera pertinent. cætera & in curatione, & in victu similia his esse debent, quæ in alio quoq; vulnerum genere præcepimus.

## De intestini curatione.

## Cap. XX.

h Is propositis ad singulas species ueniendum est: ac si cui parvulo puero intestinum descendit, ante scalpellum experientia iunctura est. fasciæ eius rei causa fit: cui imo loco pila affuta est ex panniculis facta, quæ ad repellendum intestinum ipsi illi subiicitur: deinde reliqua fasciæ pars arête circumdatur. sub quo sæpe & intus compellitur intestinum: & inter se tunica glutinatur. rursus si ætas processit, multumq; intestini descendisse ex tumore magno patet, adiungunturq; dolor, & uomitus quæ ex stercore, & ex cruditate eo delapso ferè accidunt, scalpellum adhiberi sine perniciæ non posse manifestum est. leuandum tantummodo malum, & per alias curationes extrahendum est. sanguis mitti ex brachio debet: deinde si nives patiuntur, imperanda tridui abstinentia est: si minus certe pro vi corporis quamlongissime. eodem uero tempore super habendum cataplasma ex lini semine, quod ante aliquis ex mulso decoxerit. Post hæc & farina hordeacea cum resina iniicienda, & his demittendus in solium aquæ calidæ, cui oleum quoq; adiectum sit: dandumq; aliquid cibi lenis calidi. quidam etiam aluum ducunt. id ducere aliquid in scrotum potest: educere ex eo non potest. per ea uero quæ supra scripta sunt, leuato malo si quando aliàs dolor reuerterit, eadem erunt facienda. sine dolore quoq; si multa intestina prolapsa sunt, secari superuacuum est: non quo excludi à scroto non possint, nisi tamen id inflammatio prohibuit: sed quo repulsa inguinibus immorentur: ibiq; tumorem excitent: atq; ita fiat mali non finis, sed mutatio. at in eo, quem scalpello curari oportebit, simul atq; ad medianam tunicam vulnus in inguine factum peruenerit, duobus hamulis ea iuxta ipsas oras apprehendi debet, dumeductis omnibus membranulis medicus eam liberat. neq; enim cum periculo læditur, quæ excidenda est, cum intestinum esse nisi sub ea non possit. ubi deducta autem erit ab inguine, usq; ad testiculum incidi debet sic, ne his ipse læda-



ur: tum excidi. ferè tamen hanc curationem puerilis ætas & modicum malum recipit. sic uir robustus est, maiorq; id uicium est, extra hi testiculum non debet: sed in sua sede permanere. id hoc modo fit. inguen eadem ratione usq; ad mediã tunicam scalpello aperitur: eaq; tunica eodem modo duobus hamis excipitur sic, ut à ministro testiculus eatenus contineatur, ne per uulnus exeat: tum ea tunica deorsum uersus scalpello inciditur: sub eaq; index digitus sinistræ manus ad imum testiculum demittitur, eumq; ad plagam compellit: deinde dextre manus duo digiti pollex, atq; index uenam, & arteriam, & neruum, tunicamq; eorum à superiore tunica diducunt. quod si aliquæ membranulæ prohibent, scalpello resoluntur, donec ante oculos tota iam tunica sit. excisis quæ exadenda sunt, repositiq; testiculo à ora quoq; eius uulnus, quod in inguine est, demenda habenula paulo latior est, quo maior plaga sit, & plus creare carnis possit.

## De omenti curatione.

## Cap. XXI.

T si omentum descendit, eodẽ quidem modo, quo supra scriptum est, aperiendum inguen, diducendæq; tunicae sunt. considerandum autem est, maior ne is modus, an exiguus sit. nam quod paruulum est, super inguen in alium uel digito, uel aureso specillo repellendum est. si plus est, sinere oportet dependere quantum ex utero prolapsum est: idq; adurentibus medicamentis illinere, donec emoriatur, & excidat. quidam hic quoq; duo lina acui traiciunt, binisq; singulorum capitibus diuersas partes astringunt. sub quo æque, sed tardius emoriatur. adiçitur tamen hic quoq; aleritati, si omentum super uinculum illinitur medicamentis, quæ sic exedunt ne erodant, omnia græci uocant. Fuerunt etiam qui omentum forfice præciderent: quod in paruulo nõ est necessarium. si maius est, potest profusionem sanguinis facere: si quidem omentum quoq; uenis quibusdam etiam maioribus illigatum est. neq; uero si discusso uentre id prolapsum forfice præceditur, cum & emortuum sit, & aliter tutius aueli non possit: inde huc exemplum transferendum est. uulnus autem curari. si relictum omentum est, sutura debet. si id amplius fuit, & extra emortuum est, excisis oris, sicut supra propositum est. si uero humor intus est, incidendum est: in pueris quidem inguen, nisi in his quoq; liquoris eius maior modus prohibet: in uiris uero, & ubicunq; multus humor subest scrotum. deinde si inguen incisum est, eo protrectis tunicis humor effundi debet. si scrotum, & sub hoc protinus uicium est, nihil aliud quàm humor est effundendus: at scidendæq; mē-

brana sunt, si quæ cum continuerunt, deinde eluendū id ex aqua, quæ uel salē adiectum, uel nitrū habeat si sub media, imā uē tunica: totæ hæ extra scrotum collocandæ, excidendæq; sunt.

## De ramæis curatione.

## Cap. XXII.

Amex autem, si super ipsum scrotum est, adurendus est tenuibus & acutis ferramentis: quæ ipsis uenis insigantur: cum eo, ne amplius quā has urant, maximeq; ubi inter se implicatæ glomerantur, eò ferrum id admouendum est: tum super farina ex aqua frigida subacta iniicienda est: utendumq; eo uinculo, quod idoneum esse ani curationibus posui. tertio die lenticula cum melle imponenda est. post eiectis crustis ulcera melle purganda: rosa implenda, ad cicatricem aridis linamentis perducenda sunt. quibus uero super mediam tunicam uenæ tument incidendum inguen est, atq; tunica promouenda, ab eaq; uenæ digito uel manubriolo scalpelli separanda: qua parte uero inhærebunt: & ab superiore, et ab inferiore parte lino uinciendæ: tum sub ipsis uinculis præcidendæ, reponendusq; testiculus est. at ubi supra tertiam tunicam ramex insedit, mediā excidi necesse est: deinde si duæ, tres uē uenæ tument, & ita pars aliqua obsidetur, ut maiore uicio uacet, idem faciendum, quod supra scriptum est, ut ab inguine & à testiculo deligatæ uenæ præciantur: isq; condatur. sin totum id ramex obsederit: per plagam demittendus digitus index erit: subiiciendusq; uenis sic, ut paulatim protrahat æq; adducendo, donec is testiculus par alteri fiat. tum fibulæ oris sic uinciendæ, ut simul eas quoq; uenas comprehendant. id hoc modo fit. acus ab exteriori parte oram uulneris perforat. tum non per ipsam uenam, sed per membranam eius immittitur: per eamq; in alterā orā compellitur uenæ uulnerari non debent, ne sanguinem fundant. membrana semper inter has uenas est, ac neq; periculum affert, & filo comprehensas illas abunde tenet. itaq; etiam satis est duas fibulas esse. tum uenæ quæcunq; protractæ sunt in ipsum inguen aduerso specillo comprehendi debent. soluendi fibulas tempus inflammatione finita, & purgato uulnere est, & una simul, & oras, & uenas cicatrix deuinciat. ubi uero inter imā tunicam et ipsum testiculū, neruumq; eius ramex ortus est, una curatio est, quæ totum testiculū abscidit. nam neq; ad generationem quicquam is confert et omnibus indecore, quibusdam etiam cum dolore dependet. sed totum quoq; inguen incidendum media tunica promenda: atq; excidenda est: idem in ima faciendum, neruusq; ex quo testiculus dependet præcidendus. post id uenæ

Et arteriæ ad inguen lino deligandæ Et infra vinculum abscedendæ sunt.

De carne, quæ inter tunicas testiculorum concreuit,

Et de nervo indurato. Cap. XXIII.

**A**ro quoq; si quando inter tunicas concreuit: nihil dubij est, quin eximenda sit: sed id ipso scroto inciso fieri commodius est. at si nervus induruit, curari res neq; manu, neq; medicamento potest. Vrgent enim febres ardentes, Et aut uirides, aut nigri uomitus, præter hæc ingens sitis et linguæ aspritudo, ferèq; à die tertio spumans bilis aluo cum rosione redditur. atq; neq; assumi facile cibis, neq; contineri potest, neq; multo post extremæ partes frigescent: tremor oritur: manus sine ratione extenduntur. deinde in fronte frigidus sudor, eumq; mors sequitur.

De ramice inguinis.

Cap. XXIII.

**B**i uero in ipso inguine ramex est, si tumor modicus est, semel incidi, si maior, duabus lineis debet, ut medium excidatur: deinde non extracto testiculo: sicut intestinis quoque prolapsis interdum fieri docui: colligendæ uenæ uinciendæq; ubi tunicis inhærebunt, Et sub his modis præcidendæ sunt. neq; quicquam noui curatio ulneris eius requirit.

Ad tegendam glandem colis si nuda est. Cap. XXV.

**B** his ad ea transeundum est, quæ in cole ipso fiunt: in quo si glans nuda est, nullq; aliquis eam deoris causa tegere, fieri potest, sed expeditius in puero quàm in uiro: in eo, cui id naturale est, quàm in eo, cui quarundam gentium more circumcissus est, in eo cui glans parua iuxtaq; eam cutis, spatiosior uero ipse coles est, quàm in quo contraria his sunt. Curatio autem eorum, quibus id naturale est, eiusmodi est. cutis circa glandem apprehenditur, et extenditur, donec illam ipsam condat, ibiq; deligatur. deinde iuxta pubem in orbem tergis inciditur: donec coles nudetur, magnaq; cura cauetur ne uel urina iter, uel uenæ, quæ ibi sunt, incidantur. eo facto cutis ad vinculum inclinatur, nudaturq; circa pubem uelut circulus: eoq; linamenta dantur, ut caro increseat Et id impleat, satisq; uelamenti supra latitudo plagæ præstat. sed donec cicatrix sit, uinctum esse id debet, in medio tantum relicto exiguo urinæ itinere. at in eo



qui circuncisus est sub circulo glandis scapello diducenda cutis ab inferiore cole est. non ita dolet, quia summo soluto deduci deorsum usque ad pubem manu potest. neque ideo sanguis profluit. Resoluta autem cutis rursus extenditur ultra glandem. tum multa frigida aqua foveatur: emplastrumque circa datur, quod valentem inflammationem reprimat. proximisque diebus ut prope à fame uictus est, ne forte eam partem facietas excitet. ubi iam sine inflammatione est, deligari debet à pube usque: arculum super glandem autem aduerso emplastro imposito induci sic enim fit, ut inferior pars glutinetur: superior ita sanescat, ne inhaereat.

Quomodo glans penis contracta aperiri possit.

Contra si glans ita contracta est, ut nudari non possit: quod uicium graeci φίμωσις appellant, aperienda est. quod hoc modo fit. Subter à summa ora cutis inciditur, recta linea usque ad frenum: atque ita superius tergus relaxatum cedere retro potest. quod si parum sic profectum est, aut propter angustias, aut propter duritiam tergoris, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte excidenda est sic, ut uertex eius ad frenum basis in tergo extremo sit. tum super danda linamenta sunt: aliaque medicamenta, quae ad sanitatem producant. necessarium autem est, donec cicatrix sit, conquisceere. nam ambulatio atterendo, ulcus sordidum reddit.

Infibulandi ratio.

Infibulare quoque adolescentulos, interdum uocis, interdum uoletudinis causa quidam consueverunt: eiusque haec ratio est. cutis quae super glandem est, extenditur: notaturque utrinque lateribus atramento qua perforatur: deinde renittitur. si super glandem notae reuertantur, nimis apprehensum est, et ultra notari debet. si glans ab his libera est, is locus idoneus fibulae est: tum qua notae sunt. cutis acu filum ducente transiit: eiusque filii capita inter se deligantur: quotidieque id mouetur, donec circa foramina cicatriculae fiant. ubi haec confirmatae sunt, exempto filo fibula additur: quae quomulior, eo leuior est: sed hoc quidem saepius inter superuacua, quam inter necessaria est.

De urinae reddendae difficultate, et de calculo, curationibusque eorum. Cap. XXVI.

Es uero interdum cogit emoliri manu urinam, cum illa non redditur, aut quia senectute iter eius collapsum est: aut quia calculus, uel concretum aliquid ex sanguine intus se opposuit. ac me-

diocris quoq; inflammatio sæpe eam reddi naturaliter prohibet. idq; non in uiris tantummodo, sed in foeminis quoq; interdum necessarium est. ergo enee fistulae fiunt, quæ ut omni corpori ampliori, minori q; sufficiant. ad mares tres, ad foeminas duæ medico habendæ sunt. ex uirilibus maxima decem et quinq; est digitorum, media duodecim, minima nouem. ex mulieribus, maior nouem, minor sex. incuruas uero esse eas paulum, sed magis uiriles oportet, leuesq; admodum ac neq; nimis plenas, neq; nimis tenues. homo tum resupinus eo modo quo in curatione anfigitur, super subsellum, aut lectum collocandus est. Medicus autem à dextro latere sinistra quidem manu colem masculi continere, dextra uero fistulam demittere in iter urinae debet. atq; ubi ad ceruicem uesicæ uentum est, simul cum cole fistulam inclinatam in ipsam uesicam compellere, eamq; urina reddita recipere. Foemina breuius urinae similiter, & rectius iter habet. quod mæmulæ simile inter imas oras super naturale positum non minus sæpe auxilio eget. aliquanto minus difficultatis exigit. nonnunq; etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, qui subinde ea extenuatur, nõ longe ab exitu inhaerescit. eum si fieri potest, oportet uellere, uel oriculario specillo, uel eo ferramento, quo in sectione calculus protrahitur. si id fieri non potuit, cutis extrema quam plurimum attrahenda, & condita glande lino uincienda est: deinde à latere recta plaga coles incidendus, & calculus eximendus est. tum cutis remittenda. sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat: & urina naturaliter proficiat.

### Quæ curatio calculosis adhibeatur.

Uin uesicæ uero, calculiq; facta mentio sit, locus ipse exigere uidetur ut subiiciam, quæ curatio calculosis, cum aliter suauiter non potest, adhibeatur. ad quam festinare cum præceps sit, nullo modo conuenit. ac neq; omni tempore, neq; in omni ætate, neq; in omni uicio id experiendum est: sed solo uere, in eo corpore quod iam nouē annos, nondum quatuordecim excessit: & si tantum mali subest, ut neq; medicamentis uinci possit, neq; etiam trahi posse uideatur, quo minus interposito aliquo spacio inter imat. non quo non interdum etiam teneraria medicina proficiat: sed quo sæpius utiq; in hoc fallat, in quo plura & genera, & tempora periculi sunt, quæ simul cum ipsa curatione proponant. Igitur ubi ultima experiri statutum est, ante aliquot diebus uictu corpus præparandū est, ut modicos, ut salubres cibos, ut minime glutinosos assumat, ut aqua bibat. ambulandi uero

inter hæc exercitatione utatur, quo magis calculus ad uesicæ cernicē descendat. quod an inciderit, digitis quoq; sicut in curatione docebo, demissis cognoscitur. ubi eius rei fides est, pridie u puer in ieiuno continendus est, & tum loco calido curatio adhibenda, quæ hoc modo ordinatur. homo præualens & peritus in sedili alto confidit, summumq; cum & aduersum super genua sua coxis eius collocatis cōprehendit, reductisq; eius cruribus ipsum quoq; iubet manibus ad suas poplites datis, eos quam maxime possit attrahere, simulq; ipse sic eos continet. quod si robustius corpus eius est qui curatur, duobus sedilibus iunctis duo ualentes insidunt: quo & sedilia & interiora crura inter se delignantur, ne diduci possint. tum is super duorum genua eodem modo collocatur, atq; alter prout confedit sinistrum crus eius, alter dextrum, simulq; ipse poplites suos attrahit. siue autem unus, siue duo continent super humeros eius suis pectoribus incumbunt. ex quibus euenit, ut inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit extensus, & in angustum compulsa uesica facilius calculus capi possit. Præter hæc etiam num à lateribus duo ualentes obijciuntur, qui circumstantes leuare uel unum, uel duos qui puerum continent non sinunt. Medicus deinde diligenter unguibus circuncisis atq; sinistra manu duos eius digitos indicem & medium leniter prius unum, deinde alterum in anum eius demittit, dextræq; digitos super imum abdomen leniter imponit: ne si utriq; digiti circa calculum uehementer cōcurrerint, uesicam lædant. neq; uero festinanter in hac re, ut in ple risq; agendum est. sed ita ut quam maxime id tuto fiat. nam læsa uesica neruorum distentiones cum periculo mortis excitat. ac primum circa cernicem quæritur calculus. ibi repertus minore negotio expellitur. & ideo dixi ne curandum quidem: nisi cum in hoc inditijs suis cognitum est. si uero aut ibi non fuit, aut recessit retro, digiti ad ultimam uesicam dantur, paulatimq; dextra quoque manus eius ultra translata subsequitur. atque ubi repertus est calculus, qui necesse est in manus incadat, eò curiosius deducitur. quo minor, leuiorq; est, ne effugiat, id est ne sapius agitanda uesica sit. ergo ultra calculum dextra semper manus eius opponitur, sinistræ digiti deorsum cum compellit donec ad cernicem peruenitur. in quā si oblongus est, sic compellendus est, ut pronus exeat. si planus sic, ut transuersus sit. si quadratus, ut dudus angulis sedeat. si altera parte plenior sic, ut prius ea, qua tenuior sit, euadat. in rotundo nihil interesse ex ipsa figura patet, nisi si lenior altera parte est, ut ea antecadat. cum id eò uenit, ut incidi super uesicæ cernicem iuxta anū cutis, plaga lunata usq; ad cernicē uesicæ debeat cornibus ad coxas spectantibus



paulum: deinde ea parte, qua strictior ima plaga est etiam num sub  
 cute altera transversa plaga facienda est, qua cervice aperiat: donec  
 urinae iter pateat sic, ut plaga paulo maior quam calculus sit. nam  
 qui metu fistulae, quam illo loco *χοριάδα* graeci vocant, parum patefa-  
 ciunt: cum maiore eodē periculo reuoluntur: quia calculus iter, cum  
 ui promitur, facit: nisi accipit: idq; etiā perniciosius est, si figura quoq;  
 calculi, uel asperitudo aliquid eō contulit. ex quo et sanguinis profu-  
 sio, et distentio neruorum fieri potest. quae si quis euasit, multo tamen  
 patientiorem fistulam habiturus est rupta cervice, quam habuisset in-  
 cisa. cum uero patefacta est, in conspectum calculus uenit, in cuius cor-  
 pore nullum discrimen est. ipse si exiguus est, digitis ab altera parte  
 propelli, ab altera protrahi potest. si maior: iniiciendus à superiore  
 ei parte uncus est eius rei causa factus. is est ad extremum tenuis, in  
 semicirculi specie retusae latitudinis, ab exteriori parte laevis, qua cor-  
 pori iungitur, ab interiori asper, qua calculum attingit. usq; longior  
 potius esse debet. nam breuis extrahendi uim habet. ubi iniectus est,  
 in utrunq; latus inclinandus est, ut appareat calculus, et teneatur,  
 quia si apprehensus est, ille simul inclinatur: ideoq; eo minimo opus  
 est. ne cum adduci uncus coeperit, calculus intus effugiat, hic in oram  
 uulneris incidat, eamq; conuulneret. in qua re quod periculum esset,  
 iam supra proposui. ubi satis teneri calculum patet, eodem penē mo-  
 mento triplex motus adhibendus est in utrunq; latus, deinde extra,  
 sic tamen ut leniter id fiat, paulumq; primo calculus attrahatur. quo  
 facto attollendus uncus extremus est, uti intus magis maneat, facili-  
 usq; illum producat. quod si aliquādo à superiore parte calculus pa-  
 rum commode comprehendetur, à latere erit apprehendendus. haec  
 est simplicissima curatio. sed uarietas rerum quasdam etiam num  
 animaduersiones desiderat. sunt enim quidam non asperi tantum-  
 modo, sed spinosi quoq; calculi, qui per se quidem delapsi in cervice  
 sine ullo periculo eximuntur. in uesica uero non tuto uel hi conquirū-  
 tur, uel attrahuntur. quoniam ubi illam conuulnerarunt, ex disten-  
 tione neruorum mortem maturant, multoq; magis si spina aliqua ue-  
 sicæ inheret. eamq; cum duceretur: duplicauit. colligitur autem eo qđ  
 difficilius urina redditur, in cervice calculum esse: eo quod cruenta de-  
 stillat, illum esse spinosum: maximeq; id sub digitis quoq; experiri-  
 dum est, neq; adhibenda manus, nisi id constitit. ac tum quoq; leniter  
 intus digiti obiciendi, ne uolenter promouendo conuulnerent. tum  
 incidendum. multi hic quoq; scalpello usi sunt. Meges, quoniam is infir-  
 mior est: potest q; in aliqua prominentia incidere, incisoq; super illam  
 corpore: qua cauum subest non secare, sed relinquere, quod iterum

incidī necesse sit, ferramentum fecit rectum in summa parte labrosum, in ima semicirculatum, acutumq; . id receptum inter duos digitos indicem ac medium super pollice imposito sic deprimebat: ut simul cum carne, siquid ex calculo prominebat: incideret . quo conseq̄uebatur, ut semel quantum satis esset, aperiret . quocunq; autem modo cernix ea parte facta est, leniter extrahi quod asperum est, debet; nulla propter fistinationem vi admota.

signa calculorum, uel harenosorum, uel mollium.

**T** calculus harenosus, & ante manifestus est: quoniam & **a** urina quæ redditur, harenosa est, & in ipsa curatione, quoniam inter subiectos digitos neq; æque leniter renititur, & insuper dilatur . item mollis calculus, & ex pluribus minutisq; , sed inter se parum astrictis compositus indicatur, in se attrahens quasdam quasi squamulas . hos omnis leniter permutatis subinde digitorum uicibus sic oportet abducere, ne uesicam lædant, ne ue intus aliqua dissipata reliquæ maneant . quæ postmodum curationi difficultatem faciunt . quicquid autem ex his in conspectum uenit uel digitis, uel uno eximendum est . at si plures calculi sunt, singuli protrahi debent, sic tamen, ut si quis exiguus supererit, potius relinquatur . si quidem in uesica difficulter inuenitur . inuentusq; celeriter effugit . ita longa inquisitione uesica læditur: excitatq; inflammationes mortiferas, adeo ut quidam secti cum diu frustra q; per digitos uesica esset agitata, decesserint . quibus accedit etiam quod exiguus calculus ad plagam urina postea promouente excidit . si quando autem is maior non uidetur nisi rupta cernice extrahi posse, findendus est . cuius repertor Ammonius ob id *λίθοτόμος* cognominatus est: id hoc modo fit . unguis iniicitur calculo sic, ut facile eum concussum quoq; teneat, ne is retro reuoluatur . tum ferramentum adhibetur crassitudinis modicæ prima parte tenui, sed retusa, quod admodum calculum ex altera parte ictum findit: magna cura habita, ne aut ad ipsam uesicam per ferramentum perueniat, aut calculi fractura ne quid incidat.

### De calculis foeminarum.

**A**e uero curationes in foeminis quoq; similes sunt, de quibus tamen parum proprie quædam dicenda sunt . siquidem in his ubi paruulus calculus est, scalpellus supernaculus est, quia is urinam in cernicem non compellit: quæ & breuior q̄ in ma

ribus, & laxior est. ergo et per se sæpe excidit, & si in primo quod est angustus inhaeret, eodem tamen unco sine ulla noxa educitur. at in maioribus calculis necessaria eadem curatio est. sed uirgini subijci digiti tanquam masulo mulieri per naturalia eius debent. tum uirgini quidem sub ima sinistiore ora. Mulieri uero inter urinæ iter, & os pubis incidendum est sic, ut utroq; loco plagi transuersa sit, neq; terreri conuenit si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

*Quæ curatio calculo emulso habenda sit.*

**A**lculo emulso, si ualens corpus est, neq; magnopere uexatum, sinere oportet sanguinem fluere, quo minor inflammatio oriatur: atq; ingredi quoq; eum paulum nō alienū est, ut excidat, si quid intus concreti sanguinis mansit. quod si per se nō destitit, rursus ne uis omnis intereat, supprimi debet. idq; protinus in imbecillioribus ab ipsa curatione faciendum est. si quidem ui distentione neruorum periclitatur aliquis dum uesica eius agitur, sic aliter metus excipitur remotis medicaminibus, ne tantum sanguinis profluat, ut occidat. quod ne incidat, desidere his debet in acre acetum, cui aliquantum salis sit adiectum. sub quo & sanguis ferè conquiescit, et astringitur uesica, ideoq; minus inflammatur. quod si parum proficit, agglutinanda cucurbitula est, & inguinibus, & coxis, & super pubem. ubi iam satis uel euocatus est sanguis, uel prohibitus, resupinus collocandus est sic, ut caput humile sit, coxæ paulum excitentur: ac super ulcus imponendum est duplex, aut triplex linteolum aceto madens. deinde interpositis duabus horis in solum is aquæ calidæ resupinus demittendus est sic, ut à genibus ad umbilicum aqua teneat, cætera uestimentis circumdata sint, manibus tantummodo, pedibusq; nudatis, ut & minus digeratur, & ibi diutius maneat. ex quo sudor multus oriri solet, quo sponsa subinde facile detergendum est: finisq; eius fontenti est donec infirmando offendat: tum multo is oleo perungendus, inducendusq; hapsus lanæ mollis tepido oleo repletus: qui pubem & coxas & inguina & plagam ipsam contextam eodem ante se linteolo protegat, huiusq; subinde oleo tepido madesciendus est, ut neque frigus ad uesicam admittat, & neruos leniter molliat. quidam cataplasmatibus calefacientibus utuntur: ea plus pondere nocent, quæ uesicam urgendo uulnus irritant, q̃ calore proficiunt. ergo ne uinculum quidem ullum necessarium est: proximo die si spiritus diffusius redditur, si urina non excidit, si locus circa pubem mature intumuit. scire licet in uesica sanguinem concretum



remansisse. igitur demissis eodem modo digitis leuiter pertractanda uesica est, et discutienda, si qua coierunt. quo fit ut per uulnus postea procedant. non alienum etiam est oriculario clystere acetum nitro mixtum per plagam in uesicam compellere. nam sic quoque discutiuntur, si qua cruenta coierunt. eaque facere etiam primo die conuenit. si timemus ne quid intus sit: maximeque ubi ambulando id elicere imbecillitas prohibuit, cetera eadem facienda sunt, ut demittatur in solium: ut eodem modo panniculus eadem lana super iniiciatur: sed neque saepe, neque tandiu in aqua calida puer habendus, quam adolescens est, infirmus, quam ualens: leui quam grauiore inflammatione affectus, is cuius corpus digeritur, quam his cuius astrictum est. inter haec uero si somnus est, et aequalis spiritus, et madens lingua, et sitis modica, et uenter imus, sed et mediocris est cum febre modica dolor, scire licet recte procedere curationem. atque in his inflammatio ferè quinto uel septimo die finitur. qua leuata solium superuacuum est. supini tantummodo uulnus aqua calida fouendum est, ut si quid urinae rodet, abluatur. imponenda autem medicamenta sunt pus mouentia, et si purgandum ulcus uidebitur, melle linendum. id si rodet, rosa temperabitur. huic curationi aptissimum uidetur εὐρεωπαρμακον emplastrum. nam et seuum habet ad pus mouendum, et mel ad ulcus repurgandum: medulla etiam maximeque uitulina: quod in id ne fistula relinquantur, praecipue proficit. linamenta uero tum super ulcus non sunt necessaria, super medicamentum ad id continendum recte imponuntur. at ubi ulcus purgatum est: puro linamento ad cicatricem perducendum est. quibus temporibus tamen, si felix curatio non fuit, uaria circa pericula oriuntur. quae praesagire protinus licet: si continua uigilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida est, si sitis uehemens, si uenter imus tumet, si uulnus hiat, si transfluens urina id non rodit, si similiter ante tertium diem quaedam liuida exadunt, si is aut nihil, aut tarde respondet, si uehementes dolores sunt, si post die quintum magnae febres urgent, et fistidum cibi permanet, si curare in uentrem iocundius est. nihil tamen peius est distentione neruorum, et ante nonum diem uomitus bilis. sed cum inflammationis sit metus, succurri abstinentia modicis et tempestiuis cibis, inter haec fomentis, de quibus supra scripsimus. oportet.

De cancro qui ex uesica nascitur, et qua curatione uti debeat.

Caput

XXVII.

p Roximus canceri metus est. is cognoscitur, si et per uulnus, et per ipsum colem fluit sanies mali odoris, cumque eo quaedam a concreto

concreto sanguine non abhorrentia, tenuesq; atrunculae lanulis similes: præter hæc si ora vulneris aridæ sunt: si dolent inguina: si febris non defuit, eaq; in noctem augetur: si inordinati horrores accedunt. Cōsiderandum autem est, in quam partem cancer is tendat. si ad colem indurescat his locus & rubet, & tactu dolorem exatatur, testiculiq; intumescunt. si in ipsam uesticam ani dolor sequitur, coxæ dure sunt, non facile crura extendi possunt. at si in alterutrum latus oculis id expositum est, paresq; utrinq; easdē notus sed minores habet. primum autem ad rem pertinet corpus recte iacere, ut superior pars semper eadem sit in quam uicium fertur. ita si ad colem it, supinus his colloari debet. si ad uesticam, in uentrem, si in latus, in id quod integrius est. Deinde ubi uetum fuerit ad curationem, homo in aquā demittetur: in qua marrubium decoctum sit, aut cupressus, aut myrtus, idemq; humor clystere intus adiicietur. tum super ponetur lentacula cum malicorio mixta, quæ utraq; ex uino decocta sint, uel rubus, aut oleæ folia eodem modo decocta, aliæq; medicamenta, quæ ad cohibendos, purgandosq; caneros proposuimus. ex quibus si qua erūt arida, per scriptorium calamum inspirabuntur. ubi stare cœperit cæcer, mulso uulnus eluetur. uitabiturq; eo tempore ceratum quod ad recipiendum id malum corpus emollit, potius plumbum elotum cum uino inungetur. super quæ idem linteclo illitum imponetur: sub quibus perueniri ad sanitatem potest. cum eo tamen quod non ignoremus orto cancro sæpe affici sto machum, cui cum uesticæ quoddam confortium est: exq; eo fieri ut neq; retineatur cibus, neq; si quis retentus est, concoquatur: neq; corpus alatur: ideoq; ne uulnus quidem aut purgari, aut ali possit: quæ necessario mortem maturant. sed ut his succurri nullo modo potest, sic à primo tamen diu tenenda ratio curationis est. in qua quædam observatio ad cibum quoq; potionemq; pertinet necessaria est: nam cibus inter principia non nisi humidus dari debet. ubi ulcus purgatum est, ex media materia olera, & salsamenta semper aliena sunt. potione opus est non modica: nam si parum bibitur, accenditur uulnus, & uigilia urget, & uis corporis minuitur. si plus æquo assumitur, subinde uesticæ impletur, eoque irritatur. non nisi aquam autem bibendam esse manifestus est, quam ut subinde dicendum sit. solet uero sub eiusmodi uictu uenire ut alius non reddatur. Hæc aqua ducenda est, in qua uel fœnum græcum, uel malua decocta sit. idem humor rosa mixtus in ipsum uulnus oriculario clystere agendus est: ubi id rodit urina neq; purgari patitur. Ferè uero primo per uulnus exit hæc, deinde eo sanescente diuiditur, et pars per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur: quod in-

terdum tertio mense, interdum non ante sextum, nonnunquam exacto quoq; anno fit: neq; desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi ubi aut uehementer rupta ceruix est, aut ex cancro multæ, magnæq; carunculae, simulq; nervosa aliqua exciderunt. sed ut uel nulla ibi fistula, uel exigua admodum relinquatur, summa cura providendum est. Ergo cum iam ad cicatricem uulnus intendit, extētis iacere foemina, & cruribus oportet: nisi tamen molles, harenosiue calculi fuerunt. sub his enim tardius uestica purgatur. Ideoq; diutius plagam patere necessarium est: et tum demum ubi iam nihil tale extra fertur, ad cicatricem perduc. quod si antequam uestica purgata est: oræ se glutinarunt: dolorq; & inflammatio redierunt, uulnus digitis uel aduerso specillo diducendum est, ut torquentibus exitus detur: hisq; effusis tum diutius pura urina descendat. tum demum quæ cicatricem inducant, imponenda sunt: extendiq; ut supra docui pedes quam maxime iuncti. quod si fistulæ metus ex his causis, quas proposui, subesse uidebitur, quo facilius claudatur ea, uel certe coagustetur, in anum quoq; danda plumbea fistula est: extentisq; cruribus foemina, taliq; inter se deligandi sunt, donec qualis futura est, cicatrix sit.

Si naturalia foeminarum concubitus non admittunt, quo modo curari conueniat. Cap. XXVIII.

T hoc quidem commune esse maribus, & foeminis potest. proprie uero quædā ad foeminas pertinent, ut in primis: quod earum naturalia nonnunquam inter se glutinatis oris concubitus non admittunt. idq; interdum euenit protinus in utero matris: interdum exulceratione in his partibus facta, & per malam curationem his oris sanescendo iunctis. si ex utero est, membrana ori uulnæ opposita est. si ex ulcere, caro id repleuit. oportet autem membranam duabus lineis inter se transuersis incidere ad similitudinē litteræ X. magna cura habita ne urina iter uioletur. deinde undique eam membranam excidere: ac si caro increuit, necessarium est recta linea patefacere. tum ab ora, uel uulsella, uel hamo apprehensam tanquam habenulam excidere: & intus implicatum in longitudinem linentum, αἰνιονοῦ γράκι uocant, in aceto tinctum demittere: supraq; succidam lanam aceto madentem deligare: tertio die soluere ulcus, & sicut alia ulcera curare. cumq; iam ad sanitatem tendet, plumbeam fistulam medicamento cicatricem inducente illinere, eamq; intus dare. supraq; idem medicamentum inijcere, donec ad cicatricē plagæ perueniat.



Quauratione partus emortuus ex viro excitatur. Cap. XXIX.

Bi concipit autem aliqua si iam propè maturus partus in-  
 tus emortuus est, neq; exadere per se potest, adhibenda cu-  
 ratio est, quæ numerari inter difficillimas potest. nam & sum-  
 mam prudentiam, moderationemq; desiderat: & maximum pe-  
 riculum affert. sed ante omnia uulvæ natura mirabilis, cum in mul-  
 tis alijs, tum in hac re quoq; facile cognoscitur. oportet autem ante o-  
 mnia resupinam mulierem transuerso lecto sic collocare, ut finibus  
 eius ipsius ilia comprimantur. quo fit ut & imus uenter in conspe-  
 ctu medici sit: & infans ad os uulvæ compellatur: quæ emortuo par-  
 tu id comprimit: ex intervallo uero paulum dehiscere. hac occasione  
 usus medicus unciæ manus indicem digitum primum debet inferere,  
 atq; ibi continere, donec iterum ad os aperiatur: rursusq; alterum  
 digitum demittere debebit, & per easdē occasionēs alios, donec tota  
 esse intus manus possit. ad cuius rei facultatem multum confert &  
 magnitudo uulvæ, & us nervorum eius, & corporis totius habitus,  
 & mentis etiam robur: cum presertim intus nonnunq; etiā duæ ma-  
 nus dari debeant. pertinet etiā ad rem quàm alidissimum esse imū  
 uentrem, & extrema corporis, neq; dum inflammationem cœpisse,  
 sed recenti re protinus adhiberi medicinam. nam si corpus iam in-  
 tumuit, neq; demitti manus, neq; educi infans nisi ægerrime potest, se-  
 quiturq; sæpe cum uomitu & cum tremore mortifera nervorum di-  
 stentio. uerum intus emortuo corpori manus injecta protinus habitū  
 eius sentit. nam aut in caput, aut in pedes conuersum est, aut in trās-  
 uersum iacet: ferè tamen sic, ut uel manus eius, uel pes in propinquo  
 sit. medici uero propositum est, ut cum manu dirigat uel in manus,  
 uel etiam in pedes: si forte aliter compositus est, ac si nihil aliud est,  
 manus uel pes apprehensus, corpus rectius reddit: nam manus in ca-  
 put, pes in pedes eum conuertet. tum si caput proximum est, demitti  
 debet uncus undiq; leuis acuminis breuis, qui uel oculo, uel auri, uel  
 ori, interdum etiam fronti recte iniçatur, deinde attractus infantem  
 educit: neq; tamen quolibet his tempore extrahi debet. nam si com-  
 presso uulvæ ore id tentatum est, nō emittente eo infans abruptitur:  
 & unci acumen in ipsum os uulvæ delabitur: sequiturq; nervorum  
 distentio, & ingens periculum mortis. igitur compressa uulua, conge-  
 scere. hiantē, leniter trahere oportet: & per has occasionēs paulatim  
 eum educere. trahere autē dextra manus uncum, sinistra intus posita  
 infantem ipsum: simulq; dirigere eum debet. solet etiam euenire,  
 ut is infans humore distendatur: exq; eo profuât fædi odoris sanies.

*difficilis  
curatio*

quod si tale est, indice digito corpus illud forandum est, ut effuso humore extenuetur. tum id leniter per ipsas manus recipiendum est. nam uncus iniectus facile hebeti corpusculo eleuabitur. in quo quid periculi sit, supra positum. sed in pedes quoque conuersus infans non difficulter extrahitur: quibus apprehensis per ipsas manus commode educitur. si uero transuersus est, neque dirigi potuit, uncus alae iniiciendus, paulatimque attrahendus est. sub quo ferè cervix replicatur, retroque caput, ac reliquum corpus spectat. remedio est cervix præcisa, ut separatim utraq; pars auferatur, id unco fit, qui priori similis in interiorem tantum partem per totam aciem exacuitur: tum id agendum est, ut ante caput, deinde reliqua pars auferatur: quia ferè maiore parte extracta, caput in uacuam uulnam prolabiitur, extrahi que sine summo periculo non potest: si tamen id inadiit, super uentrem mulieris duplici panniculo iniecto, ualens homo nõ imperitus à sinistro latere eius debet assistere, & super inum uentrem eius duas manus imponere, alteraq; alteram premere. quo fit ut illud caput ad os uulnæ compellatur. idque eadē ratione quæ supra posita est, unco extrahitur. at si pes alter iuxta repertus est, alter retro cum corpore est, quicquid protractum est, paulatim abscidendum est: & si clunes os uulnæ urgere coeperunt, iterum retro repellendæ sunt. conquiescitque pes eius adducendus. aliæque etiam nunc difficultates faciunt, ut qui solidus non exit, concisus eximi debeat. quotiens autem infans protractus est, tradendus ministro est. is eum supinis manibus sustinere, medicus deinde sinistra manu leniter trahere umbilicum debet, ita ne abrumpat, dextraque eum sequi usque ad eas, quas secundas uocant. quod uelamentum infantis intus fuit. hisque ultimis apprehensis uenulas, membranulasque omnes eadem ratione manu diducere à uulna, totumque illud extrahere. & si quid intus præterea concreti sanguinis remanet, tum compressis in unum feminibus, illa conclauis collocanda est, modicum calorem sine ullo præstatu habente. super inum uentrem eius imponenda lana succida in aceto, & rosa tincta. reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, & in his uulneribus, quæ in nervosis locis sunt, adhibeatur.

## De ani uicijs, &amp; eorum curatione. Cap. XXX.

Ni quoque uicia ubi medicamentis non uincuntur, manus auxilium desiderant. ergo si qua scissa in eo uetustate induruerunt, iamque callum habent, commodissimum est ducere alium: tum spongiam calidam admoovere, ut relaxentur illa, & foras prodeant. ubi in conspectu sunt, scalpello singula exadere, et ulcera remouere.

remouere. deinde imponere linamentum molle, & super lintecolum illinum melle, locumq; eum molli lana implere & ita uincere altero die, deincepsq; cæteris lenibus medicamentis uti: quæ ad recentia eadē uicia necessaria esse aliàs proposui: & utiq; per primos dies sorbitionibus eum sustinere paulatim: deinde cibis adijcere aliquid generis tamen eius, quod eodem loco præceptum est. si quando autem ex inflammatione pus in his oritur, ubi primum id apparuit incidendum est, ne anus ipse suppuret. neq; tamen ante properandum est. nam si erudum incisum est, inflammationis multum accedit: & puris aliquanto amplius concitatur. his quoque uulneribus lenibus cibis, hisdemq; medicamentis opus est.

### De condylomatum curatione.

**T**ubercula, quæ *νοδὺλώματα* appellantur, ubi induruerunt, hac ratione curantur. alius ante omnia ducitur. tum uolSELLA tuberculum apprehensum iuxta radices exciditur. quod ubi factum est eadem sequuntur, quæ supra post curationem adhibenda esse proposui. tantummodo si quid increscit squama aeris coercendum est. ora etiam uenarum fundentia sanguinem sic tolluntur. ubi sanguini, qui effluit, sanies adijcitur: alius acrius ducitur, quo magis oræ promoueantur. eoque fit, ut omnes uenæ, quasi capitula conspicua sint. tum si capitulum exiguum est, basimq; tenuem habet, astringendum lino paulum supra est, quam ubi cum ano committitur. imponenda spongia aqua calida est, donec id libeat. deinde aut ungue, aut scalpello supra nodum id exulcerandum est. quod nisi factum est, magni dolores subsequuntur. interdum etiam urinae difficultas. si id maius est, & basis latior, hamulo uno aut altero excipiendum est: paulumq; supra basim incidendum: neq; relinquendum quicquam ex eo capitulo: neq; quicquam ex ano demendum est. quod consequitur his, qui neq; nimium, neq; parum hamos ducit. qua incisum est, acus debet immitti: infraq; eam lino id capitulum alligari: si duo, triaue sunt, unum quodq; primum curandum est. si plura, non omnia simul, ne tempore eodem undiq; teneræ cicatrices sint. si sanguis profluit, excipiendus est spongia: deinde linamentum imponendum. ungenda foemina, & inguina, & quicquid iuxta ulcus est. ceratumq; superandum est. farina ordeacea calida implendusq; is locus est. sic deligandus est. postero die is desidere in aqua calida debet: eodemq; cataplasmate foueri. ac bis die, & ante curationem, & post eam ceruices, ac femina liquido cerato perungenda sunt: tepidoq; is loco continendus. interpositis quinque, aut sex diebus oriculario specillo linamenta edu-



tenda. si capitula simul non exciderunt, digito promouenda. tum lenibus medicamentis hisdemq; quæ alibi posui, ulcera ad sanitatem perducenda. finito uicio quemadmodum agendum esset, iã aliàs superius exposui.

## De uaricum curatione. Cap. XXXI.

**A** his ad crura proximus transitus est. inq; bus orti uarices non diffiali ratione tolluntur. huc autem & earum uenularum, quæ in capite nocent, & eorum uaricum, qui in uentre sunt, curationem distuli: quoniam ubiq; eadem est. igitur uena ois, quæ noxia est, aut adusta tabescit: aut manu exciditur. si recta est, si quamuis trãsuersa, tamen simplex: si modica est, melius aduritur. si curua est & uelut in orbes quosdam implicatur, pluresq; inter se inuoluuntur, utilius eximere est: adurendi ratio hæc est. cutis super inciditur. tum patefacta uena tenui, & retuso ferramento candente modice præmitur: nitaturq; ne plagæ ipsius oræ adurantur: quas reducere hamulis facile est. id interpositis ferè quaternis digitis per totum uaricem fit: & tum superimponitur medicamentum, quo adusta sanantur: at exciditur hoc modo. cute eadem ratione super uenam incisa hamulo oræ excipiuntur: scalpelloq; undiq; à corpore uena diducitur: caueturq; ne inter hæc ipsa lædatur: eiq; retusus hamulus subiicitur, interpositoq; eodem ferè spacio. quod supra positum est, in eadẽ uena idem fit, quæ quo tendat, facile hamulo extento agnoscitur. ubi iam idem, quacumq; uarices sunt, factum est, uno loco adducta per hamulum uena præciditur: deinde qua proximus hamus est, attrahitur, & euellitur: ibi rursus absconditur. ac sic undiq; uariabus crure liberato, tum plagarum oræ committuntur: & super emplastrum glutinans iniicitur.

## Curatio digitorum coherentium. Cap. XXXII.

**A** si digiti uel in utero protinus, uel propter communẽ exulcerationem postea coheserunt, scalpello diducuntur. dein separatim uterq; non pingui emplastro circumdatur. atq; ita per se uterq; sanescit. si uero sit ulcus in digito, posteaq; male inducta cicatrix curum eum reddit, primũ malagma tentandum est. dein si id nihil prodest, quod & inueteri cicatrice, & ubi nerui læsi sunt, euenire consuevit: uidere oportet nerui ne id uicium, an cutis sit. si nerui est, attingi non debet, neq; enim sanabile est. si cutis, tota cicatrix excidenda est: quæ ferè callosa efficit, ut extendi digitum non patiatur: tum rectus sic ad nouam cicatricem perducendus est.

Angrena inter ungues, alasq; aut inguina nasci: Et si quando medicamenta unctuntur, membrū præadi oportere, alio loco mihi dictum est. sed id quoq; cū periculo summo fit. nam sæpe in ipso opere, uel profusione sanguinis, uel animæ defectio ne moriuntur. uerum hic quoq; nihil interest an satis tutum præsidium sit: quod unicum est. igitur inter sanam, uitiatamq; partem incidenda scalpello caro usq; ad os est sic, ut neq; contra ipsum articulum id fiat. Et potius ex sana parte aliquid excidatur, quam ex ægra relinquatur. ubi ad os uentum est, reducenda ab eo sana caro, Et circa os subsecanda est, ut ea quoq; parte aliquid os nudetur: dein id ferrula præcidendum est, quam proxime sanæ carni etiam inhaerentis: ac tum frons offis, quam ferrula exasperauit leuanda est, supraq; inducenda cutis, quæ sub eiusmodi curatione laxa esse debet ut quæ maxime undiq; os contegat. quo cutis inducta non fuerit id linamentis erit contegendum, Et super id spongia ex aceto deliganda. cætera postea sic faciēda, ut in uulneribus, in quibus pus moueri debet, præceptum est.

## LIBER OCTAVVS.

De positu, Et figura totius humani corporis. Caput primum.

Vperest ea pars, quæ ad ossa pertinet. quæ quo facilius accipi possit, prius positus, figurasq; eorum in dabo. Igitur caluaria inapit ex interiore parte concinna, extrinsecus gibba, uirinq; leuis, Et qua cerebri membranam contegit. Et qua cute capillum gignente contegitur. eaq; simplex ab occipitio Et temporibus, duplex usque in uerticem à fronte est. ossaq; eius ab exterioribus partibus dura, ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt. interq; ea uenæ discurrunt, quas his alimentum subministrare credibile est. raro autem caluaria solida sine suturis est. locis tamen æstuosus facilius inuenitur. Et id caput firmissimum, atq; à dolore tutissimum est: ex cæteris, quo suturæ pauciores sunt, eo capitis ualetudo commodior est. neque enim certus earum numerus est, sicut ne locus quidem: ferè tamen duæ super aures, tempora à superiore capitis parte discernunt. tertia ad aures per uerticem tendens, occipitium à summo capite diducit. quarta ab eodem uertice per medium caput ad frontem

procedit, eaq; modo sub imo capillo desinit: modo frontem ipsam secans inter supercilia finitur. ex his ceteræ quidem futuræ in unguē committuntur. hæ uero quæ super aures transuersæ sunt, totis oris paulatim extenuantur: atq; ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. crassissimum uero in capite os post aurem est, quia capillus ut uerisimile est, ob id ipsum non gignitur. sub his quoq; musculis, qui tempora connectunt, os medium in exteriorem partem inclinatum positum est. at facies futuram habet maximam, quæ à tempore incipiens per medios oculos, naresq; transuersa peruenit ad alterum tempus: à qua breues duæ sub interioribus angulis deorsum spectant. et malæ quoq; in summa parte singula transuersas futuras habent. à medijsq; naribus, aut superiorum dentium gingiuis per medium palatum una procedit: aliaq; transuersa idem palatum secat. Et futura quidem in plurimis hæ sunt foramina autem intra caput maxima oculorum sunt: deinde narium, tum quæ in auribus habemus: ex his quæ oculorum sunt, recta, simpliciaq; ad cerebrum tendunt. narium duo foramina osse medio discernuntur. siquidem hæc primum à superalijis, angulusq; oculorum osse inchoantur ad tertiam ferè partem: deinde in cartilagine uersæ quo propius ori descendunt, eo magis caruncula quoq; molliuntur. sed ea foramina quæ à summis ad imas nares simplicia sunt, ibi rursus in bina itinera diuiduntur. aliaq; ex his ad fauces peruia spiritum et reddunt, et accipiunt: alia ad cerebrum tendunt. In ultima parte in multa, et tenuia foramina dissipantur, per quæ sensus odoris nobis datur: in aure quoq; primo rectum, et simplex iter procedendo flexuosum fit. quod ipsum iuxta cerebrum in multa et tenuia foramina diducitur, per quæ facultas audiendi est: iuxtaq; ea duo paruuli quasi sinus sunt. superq; eos finitur os: quod transuersum à genis tendens ab inferioribus ossibus sustinetur: iugale appellari potest ab eadem similitudine à qua id græci ζυγωδες appellant. Maxilla uero est molle os, eaq; una est, cuius eadem et media, et etiam ima pars mentum est: à quo utrinq; procedit ad tempora: solaq; ea mouetur. nam malæ cum toto osse, quod superiores dentes exigit, immobiles sunt. uerum ipsius maxillæ partes extremæ quasi bicornes sunt. alter proccensus intra latior uertice ipso tenuatur: longiusq; procedens sub osse iugali subit: et super id temporum musculus illigatur. alter breuior, et rotundior, et in eo sinus qui iuxta foramina auris est, cardinis modo fit: ibiq; huc, et illuc se inclinans, maxillæ facultatē motus præstat. duriores osse dentes sunt. quorum pars maxillæ, pars superiori ossi malarum hæret. ex his quaterni primi quia secant, τετράγωνοι à græcis nominantur. h. h. deinde



quatuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. ultra quos utrinque ferè maxillares quaterni sunt, præterque in his, in quibus tres ultimi, quæ sero gigni solent: non increuerunt. ex his priores singulis radiabus, maxillares utique binis, quidam etiam ternis, quaternis uel nituntur. Fereque longior radix breviorē dentem edit: rectique dentis recta etiam radix, cui flexa est: exque eadem radice in pueris nouus dēs subit: qui multo sæpius priorem expellit: interdum tamen supra, infra uel eum se ostendit. caput autē spina exapit. ea constat ex uertebreis quatuor et uiginti. septem in ceruice sunt: duodecim ad costas. reliquæ quinque sunt proximæ costis: hæ teretes, breuesque ab utroque latere processus duos exigunt. mediæ perforatæ, quæ spinæ medulla cerebro commissa descendit. circa quoque per duos processus tenuibus canis peruiæ, per quæ à membrana cerebri similes membranulæ deducuntur. omnesque uertebre exceptis tribus summis à superiore parte in ipsis processibus parum desidenti sinus habent: ab inferiore alios deorsum uersus processus tenuibus, cuius peruiæ per quæ à membrana cerebri similes membranulæ deducuntur. omnesque uertebre exceptis tribus summis à superiore parte in ipsis processibus parum desidentis sinus habent: ab inferiore alios deorsum uersus processus exigunt. summa igitur protinus caput sustinet, per duos sinus receptis exiguis eius processibus. quo fit, ut caput sursum deorsum uersum tuberibus exasperetur: secunda superiori parti inferiore. quæ ad arcuitum pertinet, pars summa angustiore orbe finitur. Itaque superior summæ arcundata, in latera quoque caput moueri sinit. tertia eodem modo secundam exapit: ex quo facilis ceruicæ mobilitas est. ac ne sustinere quidem caput posset, nisi utrinque recti, ualentesque nervi collum continerent: quos *ζεύγνται* græci appellant. siquidem horum inter omnes flexus alter semper intentus ultra prolabi superiora non patitur. iamque uertebra tertia tubercula quæ inferiori inferantur, exigit. cæteræ processibus deorsum spectantibus in inferiores insinuantur: ac per sinus quos utrinque habent, superiores accipiunt: multisque nervis, et multa cartilagine continentur. ac sic uno flexu modico in promptum dato, cæteris negocijs homo, et rectus insistit: et aliquid ad necessaria opera curuatur. infra ceruicem uero summa costa contra humeros sita est: inde undecim inferiores usque ad imum pectus perueniunt: hæque primis partibus rotundæ, et leniter quasi capitulatæ uertebrearum transversis processibus ibi quoque paulum insinuatim inhaerent. inde patefunt: et in exteriorem partem recuruatæ, paulatim in cartilaginem degenerant. eaque parte rursus in interiora leniter flexe committuntur cum osse pectoris. quod ualens, et durum à faucibus incipit, ab

utroq; latere lunatum, & à præcordijs iam ipsum quoq; cartilagina mollium terminatur. sub costis uero prioribus, quinq; quas rôas græci nominant, breues, tenuioresq; atq; ipsæ quoq; paulatim in cartilaginem uersæ, extremis abdominis partibus inhaerescunt. imaq; ex his maiore iam parte nihil nisi cartilago est. rursus à cervice duolata ossa utrinq; ad scapulas tendunt. nostri scapula operta, ὠμοπλάτης græci nominant. ea in summis uerticibus sinuata, ab his triangula, paulatimq; lateſcentia ad spinam tendunt: & quo latiora quoq; parte sunt hoc hebetiora, acq; ipsa quoq; in imo cartilaginosa posteriore parte uelut innatant, quoniam nisi in summo nulli ossi inhaerescant. ibi uero ualidis musculus, neruisq; constricta sunt. at à summa costa paulo interius quàm ubi ea media est, os excrescit: ibi quidē tenue, procedens uero quo propius lato scapularum ossi fit, eo plenius, latiusq; & paulatim in exteriora curuatum. quod propius, altera uerticis parte modice intumescens, sustinet ingulum. id autem ipsum recuruum, ac neque inter durissima ossa numerandum: altero capite in eo quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossis insidit, paulūq; motu brachij mouetur: & cum lato osse scapularum infra caput, eius neruis, & cartilagini connectitur. hinc humerus incipit extremis utrinq; capitibus tumidus, mollis, sine medulla cartilagnosus. medius teres, durus, medulloſus, leniter gibbus, & in priorem & posteriorem, interiorem & exteriorem partem. prior autem pars est quæ à pectore est, posterior quæ ab scapulis, interior quæ ad latus tendit: exterior quæ ab eo recedit. quod ad omnes articulos pertinere in ulterioribus patebit. superius autem humeri caput rotundius quàm cætera ossa, de quibus adhuc dixi, uerticillatis scapularum ossibus paruo excessu inferitur: ac maiore parte ex transitu neruis deligatur. at inferius duos processus habet: inter quos quod medium est, magis etiā extremis partibus sinuatur. quæ res sedem brachio præstat: quod constat ex ossibus duobus. radius, quam ῥαδιός græci appellant, superior, breuiorq; & primo tenuior rotundo, & leniter cauo, capite exiguum humeri tuberculum recipit: atq; ibi neruis, & cartilagine continetur. cubitus inferior, longiorq; & primo plenior in summo capite, duobus quasi uerticibus extantibus in sinu humeri, quem inter duos processus eius esse proposui, se inferit. primo uero duobus radijs brachij ossa iuncta paulatim dirimuntur: rursusq; ad manū cœunt modo crassitudinis mutato: siquidem ibi radius plenior, cubitus admodū tenuis est. dein radius in caput cartilagnosum consurgens, in uerticem eius sinuatur. cubitus rotundus in extremo, parte altera paulū procedit. ac ne sæpius dicendum sit, illud ignorari non oportet. plu-



rima ossa in cartilagine desinere: nullum articulum non sic finiri. neq; enim aut moveri posset, nisi leui inniteretur: aut cum carne, nervisq; coniungi, nisi ea media quaedam materia committeret. in manu uero prima palmarum pars ex multis, minutisq; ossibus constat, quorum numerus incertus est. sed oblonga omnia, & triangula structura quadam inter se connectuntur: cum inuicem superior alterius angulus, alterius planities sit: eoq; sit ex his unius ossis paulum in interiora concavi species. uerum ex manu duo exigui procerus in sinus radij coniunguntur. tum ex altera parte recta quinque ossa ad digitos tendentia palmarum explent, à quibus ipsi digiti oriuntur: qui ex ossibus ternis constant: omniumq; eadem ratio est. interior os in uerticem sinuatur: recipitq; exterioris exiguum tuberculum, nerviq; ea continent, à quibus orti ungues indurescunt. ideoq; non ossi, sed carni magis radicibus suis inherere. ac superiores quidem partes sic ordinatae sunt. imma uero spina in coxarum esse discedit, quod transversum, longeq; ualentissimum uulvam, uesciam, rectum intestinum tuetur, idq; ab exteriori parte gibbi ad spinam, resupinatum à lateribus, idest in ipsis coxis sinus rotundos habet: à quibus oritur os quod pectinem uocat. idq; super intestina sub pube transversum uentrem firmat rectius in uiris: recurvatum magis in exteriora in foeminis, ne partum prohibeat. inde foemina oriuntur: quorum capita rotundiora etiam quam humerorum sunt, cum illa ex ceteris rotundissima sint. infra uero duo os processus à priori, & à posteriore parte habent. dein dura, et medullosa, & ab exteriori parte gibba habent: rursus ab inferioribus quoq; capitibus intumescunt: superiora in sinus coxae sicut humeri in ea ossa, quae scapularum sunt, coniunguntur. tum infra introitus leniter intendunt, quo aequalius superiora membra sustineant. atq; in eo inferiora quoq; capita media sinuantur, quo facilius excipi à cruribus possint: quae commissura osse paruo molli cartilagineo tegitur: patellam uocant. haec super innatans, nec ulli ossi inherens, sed carne, et nervis deligata, pauloq; magis ad femoris os tendens, inter omnes crurum flexus iuncturam tuetur ipsum autem crus est ex ossibus duobus. & enim per omnia femur humero, crus uero brachio simile est. adeo ut habitus quoq; & decor alterius ex altero cognoscatur. quod ab ossibus incipiens, etiam in carne respondet. uerum alterum os ab exteriori parte supra positum est, quod ipsum quoque supra recte nominatur. id breuius, supraq; tenuius ad ipsos talos intumescit. alterum à priori parte positum, cui tibiae nomen est, longius, & in superiore parte plenius, solum cum femoris inferiore capite committitur: sicut cum humero cubitus. atq; ea quoq; ossa infra, supraq; coniun-



ita media ut in brachio dehiscunt. excipitur autē crus infra ossa ex transuerso talorum, idq; ipsum super os calcis situm est, quod quadā parte sinuatur: quadam excessus habet: & procedentia ex talo recipit: & in sinum eius inseritur. idq; sine medulla durum, magisq; in posteriorem partem proiectum teretem ibi figuram representat. cætera ossa pedis ad eorum quæ in manu sunt similitudinem instructa sunt. plantæ palmæ, digiti digitis, ungues unguibus respondens.

Ossa uiciata, & corrupta quibus signis cognoscantur: & qua ratione curentur. Cap. II.

¶ Hinc autem os ubi iniuria accessit, aut uiciatur, aut finditur, aut frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut loco mouetur. id quod uiciatum est, primo ferè pingue fit: deinde uel nigrum, uel cariosum: quæ super natis grauibz ulceribus, aut fistulis: hisq; uel longa uetustate, uel etiam cancro occupatis eueniunt. Oportet autem ante omnia os nudare ulcere exciso: & si latius eius uicium est, quàm ulcus fuit, carnem subsecare, donec integrum os undiq; pateat: tum id quod pingue est semel, iterum uel satis est admoto ferramento adurere, ut ex eo statim secedat: aut eradere donec iā aliquid cruoris ostendatur: quæ integrioris nota est. nam necesse est aridum sit id, quod uiciatum est. idem in cartilagine quoq; læsa faciendum est. siquidem ea quoq; scalpello radenda est, donec integrum id sit, quod relinquantur. deinde siue os, siue cartilago rasa est, nitro bene trito respersum est. neque alia facienda sunt ubi caries, nigrities uel in summo osse est. siquidem id uel paulo diutius eodem ferramento adurendum, uel radendum est. qui radit hæc, audacter imprimere ferramentum debet, ut & agat aliquid: & maturius desinat. finis est, cum uel ad album os, uel ad solidum uentum est. albo finiri ex nigritie uitium, soliditate quadam ex carie manifestum est: accedere etiam cruoris aliquid integro supra dictum est. si quando autem altius descenderit, utrumlibet dubium est: in carie quidem expedita cognitio est. specillum tenue in foramen demittitur. quod magis, minus uel intrando, uel in summo cariem esse, uel altius descendisse testatur. nigrities colligi quidem potest etiam ex dolore, & ex febre. quæ ubi mediocria sunt, illa alte descendisse non potest: manifestior tamen ad acta terebra fit. nam finis uitij est, ubi scobis nigra esse desit. igitur si caries. alte descendit, per terebram urgenda crebris foraminibus est: quæ altitudine uicium æquunt. tum in ea foramina demittenda candētia ferramenta sunt: donec inde sicum os ex toto fiat. simul enim post hæc & resoluetur ab infirioe osse quodcumq; uiciatū

est: & his sinus carne replebitur: & humor aut nullus postea feretur, aut mediocris. sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excidi. atque idem in carie quoque ad alteram partem ossis penetrante fieri potest. sed quod totum uiciatum, totum eximendum est. si inferior pars integra est, catenus quod corruptum est, excidi debet. item siue capitis, siue pectoris os, siue costae cariota est, inutilis uicio est: & excidendi necessitas est. neque audiendi sunt qui osse nudato diem tertium expectant, ut tunc excidant. ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. itaque quantum fieri potest eodem momento & cutis incidenda est, & os detegendum: et omni uicio liberandum est. longeque perniciosissimum est, quod in osse pectoris est: quia nix etiam si recte cessit, curatio uera sanitatem reddit.

Quomodo os excidatur, & de modiolis, & terebris feramentis ad id paratis. Cap. III.

Exciditur uero os duobus modis: si paruum est, quod leuissimum est, modiolis, quem *χοιρίδιον* graeci uocant. si spaciosus, terebris. utriusque rationem proponam. Modiolus feramentum concavum, teres est inus oris ferratum, per quod medium clauus ipse quoque interiore orbe cinctus demittitur. Terebrarum autem duo genera sunt: alterum simile ei quo fabri utuntur. alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subito latius fit: atque iterum ab alio principio paulo minus quam aequaliter sursum procedit. si uicium in angusto est, quod comprehendere modiolus possit, ille potius aptatur. & si caries subest, medius clauus in foramen demittitur. si nigrities, angulo scalpri sinus exiguus fit, qui clauum recipiat, ut eo insistente circumactis modiolus delabi non possit. deinde is habena quasi terebra conuertitur. estque quidam premendi modus, ut & foretur, & circumagatur. quia si leuiter imprimitur, parum proficiat. si grauiter, non mouetur. neque alienum est instillare paulum rose uel lactis, quo magis lubrico circumagatur. quod ipsum tamen si copiosius est, aciem feramenti hebetat. at ubi iam iter modiolis pressum est, medius clauus educitur: & ille per se agitur. deinde cum sanitas inferioris partis scobe cognita est, modiolus remouetur. at si latius uicium est, quam ut illo comprehendatur, terebra res agenda est. ea foramen fit in ipso sine uiciosi ossis atque integri: deinde alterum non ita longe. tertiumque donec totus is locus, qui excidendus est, his cauis cinctus sit. atque ibi quoque quatenus terebra agenda sit, scobis significat. tunc excorsus scalper ab altero foramine ad alterum malleolo ada-

Etus: id quod inter utrunq; medium est, excidit: ac sic ambitus similis ei fit, qui in angustiore orbem modiololo imprimitur. utro modo uero id circumductum est, idem exorsus scalper in osse corrupto planus summam quanq; testam læsit, donec integrum os relinquatur. Vix unquam nigrities integrum, caries per totum os perrumpit: maximeq; ubi uitiata caluaria est. Id quoq; signi specillo significatur, qui depressus in id foramen, quod infra solidam sedem habet: & ob id reuertens aliquid inuenit, & madens exit. si peruium inuenit, altius descendens inter os, & membranam nihil oppositum inuenit: educaturq; sians, non quo non subsit aliqua uitiosa sanies, sed quoniam ibi, ut in latiore sede diffusa sit. Sine autem nigrities, quam terebra detexit: siue caries, quam specillum ostendit, os transit: modiololi quidē usus ferē superuacuis est: quia latius pateat necesse est, quod iam alte processit. terebra uero ea, quam secundo loco posui utendum, eaq; non nimis incalescat, subinde in aquam frigidam demittenda est. sed tum maiore cura agendum est: cum iam aut simplex os dimidium perforatum est: aut in duplici, superius illud, spacium ipsum, hoc sanguis significat. ergo tum lentius ducenda habena: suspendaq; magis sinistra manus est, & sæpius attollenda: & foraminis altitudo consideranda: ut quandocunq; os perrumpitur sentiamus: neq; periclitemur, ne mucrone cerebri membrana lædatur: ex quo graues inflammationes cum periculo mortis oriuntur. factis foraminibus eodem modo media sæpe, sed multo circumspectius excidenda sunt: ne forte angulus scalpri eandem membranam uiolet: donec fiat aditus, per quam membranae custos immittatur: *μνηστροφῆλαινα* græci uocāt. lamina aenea est firma, paulum resina, ab exteriori parte laeuis, quæ demissa est, ut exterior pars eius cerebro propior sit. subinde ei subiicitur quod scalpro discutiendum est. ac si excipit eius angulum, ultra transire non patitur: eoq; & audacius, & tutius scalprium malleolo subinde medicus ferit, donec excisum undiq; os eadem lamina leuetur: tolliq; sine ulla noxa cerebri potest. Vbi totum os eiectum est, circum radendæ, leuandæq; sunt oræ: & si quid scobis membranae insedit, colligendum. ubi superiori parte sublata, inferior relicta est, nō ora tantum, sed os quoq; totum lauandum est: ut sine noxa postea cutis increseat. quæ aspero osse innascens protinus non sanitatem, sed nouos dolores mouet. patifacto cerebro qua ratione agendum sit, dicam, cum ad fracta ossa peruenero. si basis aliqua seruata est, superimponenda sunt medicamenta non pingua, quæ recentibus uulneribus accommodantur: supraq; imponenda lana succida oleo, atq; aceto madens. ubi tepus processit, ab ipso ore atro increscit, eaq; factum manu sinum cō



plet. si quod etiam os adustum est, à parte sana recedit: subitq; inter integram atq; emortuam partem articula: quæ quod abscissit, expellat. eaq; ferè quia testa tenuis, & angusta est: squama, idest ætis à græcis nominatur. Potest etiam euenire, ut ex ictu neq; findatur os, neq; perfringatur: sed summum tamē collidatur, exaspereturq;: quod ubi incidit, radi, & lauari satis est. hæc quauis maxime fiunt in capite, tamen cæteris quoq; ossibus communia sunt: ut ubicunq; idem incidet, eodem remedio sit utendum atq; cum ea fracta, fissa, forata, collisa sint: quasdam proprias in singulis generibus, quasdam communes in pluribus curationes requirunt. de quibus protinus dicam, initio ab eadem caluaria accepto.

## De caluariae curatione.

## Cap. IIII.

i Citur ubi ea pertusa, protinus requirendum est, num bilis homo uomuerit: num oculi eius obcæcati sint: num obmutuerit: num per nares, aures uel sanguis ei effluerit: num coniderit: num sine sensu quasi dormiens iacuerit. hæc enim non nisi osse fracto eueniunt. atq; ubi inciderunt, scire licet necessariam, sed diffiilem curationem esse. si uero etiam torpor accessit, si mens non constat, si nervorum uel resolutio, uel distentio secuta est: uerisimile est etiam cerebri membranam esse uiolatam: eoq; in angusto magis spes est. at si nihil horum secutum est, potest etiam dubitari an os fractum sit. & protinus considerandum est, lapide, an ligno, an ferro, an alio telo percussum sit. et hoc ipso leni, an aspero, mediocri, an uastiore: uehementer, an leniter. quia quo mitior ictus fuit, eo facilius os ei restitisse credibile est. sed nihil tamen melius est, quàm certiore id nota explorare. ergo qua plaga est, demitti specillum oportet, neq; nimis tenue, neq; acutum: ne cum in quosdam sinus naturales inciderit, opinionem fracti ossis frustra faciat: neq; nimis plenum, ne parum le rimulæ fallant. ubi specillum ad os uenit, nihil nisi lene, & lubricum occurrit: integrum id uideri potest. si quid asperi est, utique qua suturæ non sine, fractum os esse testatur. à suturis se deceptum esse Hippocrates memoriæ prodidit more scilicet magnorū uirorū, & si duciā magnarū rerum habentium. nam lenia ingenia, quia nihil habent: nihil sibi detrahunt. magno ingenio, multaq; nihilominus habituro conuenit etiā simplex ueri erroris confessio, præcipueq; in eo misterio quod utilitatis causa posteris traditur. ne qui decipiatur eadē rōne, qua quis ante deceptus est. sed hæc quidem alioquin memoria magni professoris uti interponeremus effect. potest autē futura eo no-

Le uident  
tib

nota de  
causis pri  
itinis

nota de  
contactu  
plage  
Hip. decept.  
in fracturis  
capitis.

mine fallere: quæ æque aspera est, ut aliquis hanc esset, etiam si rima est, existimet eo loco, quo subesse hanc uerisimile est. ergo eo nomine deapi non oportet: sed os aperire tutissimum est. nam neq; utique certa sedes ut supra posui, futurarum est: & potest idem, & natura liter commissum, & ictu fissum esse: iuxta uero aliquid fissum habere. Quin aliquid etiam, ubi ictus fuerit uehementior, quamuis specillo nihil inuenitur: tamen aperire commodius est. at si ne tum quidem rima manifesta est, inducendum super os attramentum scriptorium est: deinde scalp pro id detrahendum nigritiem enim continet si quid fissum est. solet etiam euenire, ut altera parte fuerit ictus, & os altera fiderit. itaq; si grauius aliquis percussus est, si mala inditia subsecuta sunt, neq; ea parte qua cutis disscissa est, rima reperitur: non incommodum est parte altera considerare, nunquid locus mollior sit, et tumeat: eumq; aperire. si quidem ibi fissum os reperietur. nec tamen magno negotio cutis sanescit, etiam si frustra detecta est. os fractum nisi suauisum est, grauius inflammationibus afficit: difficiliusq; postea tractatur. raro, sed aliquando tamen euenit, ut os quidem totum integrum maneat: intus uero ex ictu uena aliqua in cerebri membrana rupta, aliquid sanguinis mittat. isq; ibi concretus magnos dolores moueat: oculos quibus obceat. sed ferè contra id dolor est, & eo loco cute incisa pallidum os reperitur. ideoq; id quoq; os excidendum est. quacumq; autem de causa curatio hæc necessaria est, si nondum satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec quicquid læsum est, in conspectu sit. in quo ipso uidèdum est, nequid ex ipsa membrana, quæ sub cute caluariam cingit, super os relinquatur. si quidem hæc scalp, te rebris uero lacerata uehementes febres cum inflammationibus excitat. itaq; eam commodius est ex toto ab osse diduci. plagam, si ex uulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus. si manus facièda est, ea ferè commodissima est, quæ duabus transuersis lineis litteræ X. figuram accipit: ut deinde à singulis procedentibus lingulis cutis subsequatur. inter quæ si sanguis fertur, spongia subinde in aceto tincta cohibendus est: occupandusq; obiectis linamentis. & caput altius excitandum. neq; id uicium ullum metum, nisi inter musculos, qui tempora continent, affert: sed ibi quoq; nihil tutius fit. In omni uero fisso, fracto uero osse protinus antiquiores medici ad ferramenta ueniebant: quibus id exiderent. sed multo melius est, ante emplastra experiri, quæ caluariæ causa componuntur: eorumq; aliquid oportet ex aceto molitum per se super fissum, fractum uero os imponere. deinde super id aliquanto latius quam uulnus est, eodem medicamento illitam lintolam, & præterea suadam lanam aceto tinctam. tunc uulnus deligare, et quotidie



quotidie resolvere, similiterq; curare usq; ad diem quintum. à sexto die etiam uapore aquæ calidæ per spongiam fouere. cætera ex eadem facere. quod si caruncula increscere coeperit, & febricula, aut soluta erit, aut lenior & cupiditas abi reuerterit, satisq; somni accedet: in eodem medicamento erit perseverandum. Procedente deinde tempore emolliendum id emplastrum adiecto cerato ex rosa factum, quo facilius carnem producat. nam per se reprimendi uim habet. hac ratione sepe rimæ callo quodam implentur, estq; ea, ossis uelut cicatrix. & latius fracta ossa, si qua inter se non cohærebant, eodem callo glutinantur: estq; aliquanto melius uelamentum cerebro, quàm caro quæ exciso osse increscit. si uero sub prima curatione febris intenditur, breuesq; somni, & idem per somnia tumultuosi sunt, ulcus madet: neq; alitur: & in ceruicibus glandulæ oriuntur: magni dolores sunt: ubiq; super hæc fastidium increscit: tum demum ad manum, scalprumq; ueniendum est. duo uero sub ictu caluariæ pericula sunt, ne uel findatur, uel medium desinat: si fissum est, possunt oræ esse compressæ: uel quia altera super alteram excessit: uel etiam quia uehementer rursus se commiserunt. ex quo euenit ut humor ad membranam quidem descendat, exitum uero non habeat: ac sic eam irriter, & graues inflammationes moueat. ubi medium desedit, eandem cerebri membranam os urget. interdum etiam ex fractura quibusdā uelut aculeis pungentibus: his ita succurrendum est, ut tamen quam minimum ex osse dematur. ergo si ora alteri infedit, satis est id quod eminet plano scalpro excidere. quo sublato iam rima hiat quantum curationi satis est. at si oræ inter se comprimuntur, à latere eius interposito digiti spacio, terebra foramen faciendum est: ab eoq; scalper duabus lineis ad rimam agendus ad similitudinem. C. litteræ, sicut uertex eius à foramine basis ad rimas it: quod si rima longius patet, ab altero foramine rursus similis sinus fieri debet: & ita nihil latens in eo esse concatum est: abundeq; exitus datur intus lædentibus. ne si fractum quidem os desedit, totum excidi necesse est. sed siue totum perfractum est, & ab alio ex toto recessit, siue circumpositæ caluariæ inhaeret, exigua parte ab eo quod naturaliter se habet, scalpro diuidendum est. deinde in eo quod desedit, iuxta rimam quam fecimus, foramina addenda sunt. si in angusto noxa est, duo. si latius patet, tria, septaq; eorum excidenda: & tum scalper utrinque ad rimam agendus sic, ut lunatum sinum faciat: imaq; pars eius intus ad fracturam, cornua ad os integrum spectent. deinde si qua labent, & ex facili remoueri possunt, forfice ad id facta colligenda sunt, maximeq; ea quæ acuta membranam infestant: si id ex facili fieri non po-



test: subijcienda lamina est, quam custodem eius membranæ esse pro-  
 posui: & super eam quicquid spinosum est, & intus eminet, excide-  
 dum est, eadem lamina quicquid deorsum insedit, attollendum. hoc  
 genus curationis efficit, ut qua parte fracto ossa tamen inhaerent, soli-  
 dentur. qua parte abrupta sunt, sine ullo tormento sub medicamento  
 tempore excidant, spatiumq; inter hæc satis illi magnum ad extra=  
 hendam sanem relinquatur: plusq; in osse propugnaculi cerebrum  
 habeat, quam habiturum fuit eo exciso. his factis ea membrana acri  
 aceto respergenda est, ut siue aliquid sanguinis ex ea profluit, cohibe-  
 atur: siue intus concretus cruor remanet, discutiat. tum idem me-  
 dicamentum eodem modo, qui supra positus est, mollium ipsi mem-  
 branæ imponendum est. cæteraq; eodem modo facienda sunt, quæ ad  
 linteolum illitum, & lanam succidam pertinent collocandusq; in loco  
 intepido: & curandum quotidie vulnus, bis etiam æstate. quod si mē-  
 brana per inflammationem intumuerit, infundenda erit rosa tepe-  
 da si usq; eo tumebit, ut super ossa quoq; emineat: coercebit eam bene  
 trita lenticula, uel folia uitis contrita, & cum recenti uel butyro, uel  
 adipe anserino mixta, ceruixq; molliori debebit liquido cerato ex iri-  
 no facto. at si parum pura membrana uidebitur par modus eius em-  
 plastri, & mellis misendus erit, idq; superinfundendum, eiusq; con-  
 tinendi causa unum, aut alterum linamentum iniiciendum, & super  
 linteolo, cui emplastrum illitum sit, contegendum. ubi plus pura mem-  
 brana est, eadem ratione adijciendum emplastro ceratum, ut carnē  
 producat. quod ad abstinentiam uero & primos, ultioresq; cibos, po-  
 tionesq; pertinet. eadem quæ in uulneribus præcepi, seruanda sunt:  
 eo magis, quo periculosius hæc pars afficitur. quin etiam cum iā nō  
 solum sustineri, sed aliis his quoq; apparebunt: tamen erunt uitanda  
 quæcunq; mandenda sunt. item fumus, & quicquid excitat sternuta-  
 mentum. spem uero certam faciunt membrana mobilis ac sui coloris,  
 caro increfcescens rubicunda, facilis motus maxillæ, atq; ceruicis. mala  
 signa sunt. membrana immobilis nigra, uel liuida, uel aliter coloris  
 corrupti, dementia, acris uomitus, neruorum uel resolutio, uel disten-  
 tio: caro liuida, maxillarum rigor, atq; ceruicis. cæteraq; quæ ad so-  
 mnium, cibi desiderium, febrem, puris colorem attinent: eadem quæ  
 in cæteris uulneribus, uel salutaria, uel mortifera sunt: ubi bene res-  
 cedit, incipit ab ipsa membrana, uel si os eo loco duplex est, inde  
 quoq; caro increfcescere: eaq; id, quod inter ossa natum est, replet. non-  
 nunquam etiam super caluariam excrescit. quod si incidit, insper-  
 gēda squama aeris est, ut id reprimat, cohibeatq; ea carni superdā-  
 do quæ ad cicatricem perducant. omnibusq; ea locis commode induca-

nota

higima

nota

tur, excepta frontis ea parte, quæ paulum super id est, quod inter supercilia est. ibi enim uix fieri potest, ut non per omnem ætatem sit exulceratio, quæ linteolo medicamentum habente contenda sit: illa utiq; capite fracto seruanda sunt: ut donec iam ualida ciatrix erit soluenda, uidentur frequens balneum, maior uini modus.

De narium fracturarum curatione. Cap. V.

*i* Nnariibus uero & os, & cartilago frangi solet, et quidem modo aduersa, modo à latere: si aduersa fracta sunt, alterumue ex his, nares desidunt, difficulter spiritus trahitur. si à latere os fractum est. is locus cauus est. si cartilago, in altera partem nares declinantur. quicquid in cartilagine incidit, excitandū leniter est, aut subiecto specillo, aut duobus digitis utrinq; compressis. deinde in longitudinem implicata linamenta & molli pellicula annecta, circumfusaq; intus adijcienda sunt. aut eodem modo compositum aliquid ex arido penicillo. aut grandis pinna gummi, uel fabrili glutine illita, & molli pellicula circumdata, quæ desidere cartilagine non sinat. sed si aduersa ea fracta est, æqualiter utraq; naris implenda est. si à latere, crassius esse debet ab ea parte in qua natus iacet, ab altera tenuius in id quod inseritur. extrinsecus autem circumdanda habena est mollis media illita mixtis inter se similia, & turis fuligine. eaq; ultra aures ducenda, & fronti duobus capitibus agglutinanda est id enim corpori quasi gluten inhærescit: & cum induruit nares commodè continet sin quod intus inditum est, lædit: sicut maxime fit, ubi interior cartilago perfracta est, excitatæ nares eadem tantummodo habena continendæ sunt. deinde post quatuordecim dies id ipsum demendum est. resoluitur autem aqua calida: eaq; tum is locus quotidie fouendus est. sin os fractum est, id quoq; digitis in suam sedem reponendum est. atq; ubi aduersum, ut dictum est, utraq; naris implenda est. ubi à latere, ea inquam os impulsum est. imponendūq; ceratum, & paulo uehementius deligandum est: quia callus eo loco non ad sanitatem tantummodo, sed etiam ad tumorem increscit. à tertio die fouendum id aqua calida est: tantoq; magis, quanto propius esse sanitati debet. quod si plura erunt fragmenta, nihilominus extrinsecus singula in suas sedes digitis erunt compellenda: imponendaq; extrinsecus eadem habena, & super eam ceratum, neq; ultra fistula adhibenda est. at si quod fragmentum undique resolutum cum cæteris non glutinabitur, intelligitur quidem ex huius uore, qui multus ex uulnere feretur: uol fella uero extrahetur. fini-

tisq; inflammationibus imponetur aliquod medicamentum ex ijs, quæ leniter reprimunt. peius est ubi aut ossi, aut cartilagini fractæ cutis quoq; vulnus accessit. id admodum raro fit: si incidit, illa quidem nihilominus eadem ratione in suas sedes excitanda sunt. cuti uero super imponendum emplastrum aliquod ex his, quæ recentibus uulneribus accommodata sunt: sed insuper nullo uinculo deligandum est.

De aurium fractarum curatione. Cap. VI.

**I**N aure quoq; interdum rumpitur cartilago. quod si incidit, antequam pus oriat, imponendum glutinans medicamentum est. Sæpe enim suppurationem prohibet, & aurem cōfirmat. illud & in hac, & in naribus ignorari non oportet: non quidem cartilagnem ipsam glutinari, circa tamen carnem incrementum lidariq; eum locum. itaq; si cum cute cartilago rupta est, cutis utrinq; sutitur. nunc autem de ea dico, quæ cute ita frangitur. in ea uero si iam pus natum est, aperienda altera parte cutis: & ipsa cartilago cōtra lunata plaga excidenda est. deinde utendum est medicamento leniter supprimente, quale lycium est aqua dilutum, donec sanguis fluere desinat. tum imponendum linteolū cum emplastro sic, ut pingue omne uideatur: & à parte posteriore lana mollis auri subicienda est: quæ, quod est inter hanc & caput, compleat. tum ea leniter deliganda est: & à tertio die uapore, ut in naribus posui, fouenda. atq; in his quoq; generibus abstinentia primi temporis necessaria est, donec inflammatio finiatur.

De maxillæ fractæ curatione, deq; quibusdam ad omnia ossa pertinentibus. Cap. VII.

**B** his ad maxillam uenturus indicanda quedam puto communiter ad omnia ossa pertinentia, ne sæpius eadem dicenda sint. Omne igitur os modo rectum ut lignum in longitudinem finditur: modo frāgitur transuersum: interdum obliquum, atq; id ipsum nonnunquam retusa habet capita: nonnunquam aquata. quod genus pessimum est: quia neq; facile committuntur, quæ nulli retuso inittuntur, & carnem uulnerant: interdum neruum quoque, aut musculum: quin etiam aliquando plura fragmenta à fragmento fiunt. sed in alijs quidem ossibus ex toto sæpe fragmentum à fragmento recedit. Maxillæ uero semper aliqua parte, etiam uexata ossa inter se coherent. igitur in primis digitis duobus utrinq; prementibus, & ab ore, & ab cute omnino ossa in suam sedem compellenda sunt. deinde



inde si trasuersa maxilla fracta est, sub qua casu ferè dēs super proximi dentem excedit: ubi ea in suam sedem collocata est: duo proximi dentes, aut si hi labant, ultiores inter se seta deligandi sunt. id in alio genere fracturæ supernacuum est. ætera eadem facienda sunt. nam lintolum duplex madens uino, et oleo super inuicendum cum eadem simila, et eadem turis fuligine est. deinde aut fasciæ, aut mollis habena media in longitudinem morsa, ut utrinque mentum complectatur, et inde capita eius supra caput adducta ibi deligantur. illud quoque ad omnia ossa pertinens dictum erit: faciem primum esse necessariam: deinde à die tertio humidum cibum, sublata inflammatione paulo pleniorē: eumque qui carnem alat, per omne tempus uinum esse alienum. deinde tertio die resolui debere: foueri que per spongram uapore aquæ calidæ: eademque quæ primo fuerunt super dari. item die quinto fieri, et donec inflammatio finiatur: quæ uel octauo die, uel septimo ferè resoluitur. ea sublata, rursus ossa esse tractanda, ut si quod fragmentum loco suo non est, reponatur. neque id esse soluedum, nisi duæ partes eius temporis, intra quod quæque ossa conseruntur, transierint. fere uero intra quartumdecimum et unum et uigesimalium diem sanescunt maxilla, malæ, iugulum, pectus, latus, os scapularum, costæ, spina coxarum, os tali, calx, manus, planta. inter uigesimalium et trigesimalium diem crura, brachiaque: inter septimum et uigesimalium et quadragesimum humeri, et foemina. sed in maxilla illud quoque adiacendum est, quod humidus abusus diu assumendus est. atque etiam cum tempus processit, in lagano, similibusque alijs perseuerandum, donec ex toto maxillam callus firmarit. item utique primis diebus habendum silentium.

De iuguli fracti curatione. Cap. VIII.

iugulum uero si trasuersum fractum est, nonnunquam per se rursus recte coit: et nisi mouetur, sanari sine iunctura potest. nonnunquam uero, maximeque ubi motum est, elaboratur. ferèque id quod à pectore, sub id quod ab humero est, in posteriorem partem inclinatur. cuius ea ratio est, quod per se non mouetur: sed cum humeri motu consentit. itaque eo subsistente sub id humerus angitur. raro uero admodum in priorem partem iugulum inclinatur: adeo ut magni professores nunquam se uidisse memorie mandarent. sed locuples tamen eius rei auctor Hippocrates est. uerum ut dissimilis uterque casus est, sic quædam dissimilia requirit. ubi ad scapulas iugulum tendit, simul dextra manu planè propellendus in posteriorem partem humerus est, et illud in priorem attrahendum. ubi ad

pectus conuersum est: ipsum quidem retro dandum: humerus autem in priorem partem adducendus est. ac si is inferior est, non id quod à pectore est, deprimendum est, quia immobile est: sed humerus ipse attollendus. si casu superior est, id quod à pectore est, implendum lana: & humerus ad pectus deligandus est. si acuta fragmenta sunt, incidi contra cutis debet: ex ossibus ea, quæ carnem uulnerant, præcidenda sunt. tunc reclusa ossa cõmittenda sunt. si quod ab aliqua parte eminet, opponendum ei triplex linteolum est in uino, & oleo tinctum si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula facto canaliculo, eodemq; intus incerato, ne fasciâ diducatur. quæ iugulo composito circumdanda est sæpius, potius quàm ualentius. quod ipsum quoq; in omnibus ossibus fractis perpetuum est. à dextro uero iugulo, si id fractum est, ad alam sinistram: à sinistro ad dextram: rursusq; sub ala sua fasciari debet. post hæc si iugulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus. si in partem priorem, ad ceruicem deligandum est. supinusq; homo collocandus: ceteraq; eadem facienda, quæ supra comprehensa sunt. sunt uero plura ossa ferè immobilia uel dura, uel cartilaginosa, quæ uel franguntur: uel forantur: uel colliduntur: uel finduntur. ut malæ, pectus, latus, os scapularum, costæ, spina costarum, os tali, calx, manus, planta. horum omnium eadem curatio est, si supra uulnus est, id suis medicamentis nutriendum est. quo sanescente rimas quoq; ossis, aut si quod ferrumen est, callus implet. si cutis integra est, & os læsum esse ex dolore colligimus: nihil aliud, quàm quiescendum: imponendumq; ceratum est, & leniter deligandum, donec sanitate ossis dolor finiatur.

#### De costarum fracturarum curatione. Cap. IX.

Proprie tamen quædam de costa dicenda sunt: quia iuxta uiscera est: grauioribusq; periculis is locus expositus est. hæc quoq; igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars eius, quæ rara est, lædatur: interdum fit, ut eā totam is casus perruperit. si tota fracta nō est, nec sanguis expuitur: nec febricula sequitur: nec quicquam suppurat, nisi admodum rare, nec dolor magnus est: tactu tamen is locus leniter indolescit: abunde est eadem, quæ supra scripta sunt, facere: & à media fasciâ incipere deligare, ne in alterutram partem hæc cute inclinēt. ab uno uero & uigesimo die quo utiq; os esse debet glutinatum, id agendum: citius uberioribus est utendum, ut corpus quamplениssimū fiat: quo melius os uestiat. quod illo loco tenerū, adhuc iniuriæ sub tenui cute ex=



positum est. per omne autem tempus curationis uitandus clamor, sermo quoq; tumultus, ira, motus uehementior corporis, fumus, puluis: et quicquid uel tussim, uel sternutamentum mouet. ne spiritum quidem magnopere continere expedit. at si tota costa perfracta est, casus asperior est. nam & graues inflammationes, & febris, & suppuratio, & sepe uitæ periculum sequitur: & sanguis spuitur. ergo si uires patiuntur ab eo brachio, quod super eam costam est, sanguis mittendus est. si non patiuntur, alius tamen sine ullo acri ducenda est: diutiusq; inedia pugnandum. panis uero ante septimum diem non assumendus: sed una sorbitione uiuendum: imponendumq; ei loco ceratum ex lino factum: cui cocta quocq; resina adiecta sit: aut Polyarchi malagma, aut panacis ex uino, & rosa, & oleo: superq; imponenda lana succida, mollis, & duæ fasciæ à medijs orsæ, minimq; astricte. Multo uero magis omnia uitanda, quæ supra posui, adeo ut ne spiritus quidem sæpius mouendus sit. quod si tussis instabit, ad id potio sumenda erit, uel ex tryxagane, uel ex ruta, uel ex herba stychna de, uel ex cumino, & pipere. Grauioribus uero doloribus urgentibus cataplasma imponi quoq; conueniet, uel ex lolio, uel ex hordeo, cui pinguis fici tertia pars sit adiecta. & id quidem interdum superiacebit. noctu uero idem aut ceratum, aut malagma, aut pannus: quia potest cataplasma decidere. ergo quotidie quæq; resoluetur, donec iam cerato, aut malagmate pessimus esse contenti. & decem quidem diebus extenuabitur fame corpus. ab undecimo uero ali inapit ideoq; etiam laxior quamprimo fasciæ circumligabitur: ferèq; ea curatio ad quadagesimum diem perueniet: quæ si modus erit suppurationis, plus malagma quam ceratum ad digerendum proficiet. si suppuratio nihil erit neq; per quæ suprascripta sunt discuti potuerit, omnis mora uitanda erit, ne os infra uicietur. sed qua parte maxime tumebit, demittendū erit candens ferramentum, donec ad pus perueniat: idq; effundendum si nusquam caput se ostendit: ubi maxime pus subit, sic intellegimus: creta cimolia totum locum illinimus, & sicari patiemur. quo loco maxima humor in ea persuerauit, ibi pus proximum erit: eaq; uti debet. si latius aliquid abscedet, duobus aut tribus locis erit perforandum: demittendum erit linamentum, aut aliquid ex penicillo. quod summum lino sit deuinctum ut facile educatur. reliqua eadem, quæ in cæteris adustis facienda sunt. ubi purum erit ulcus, ali corpus debet, ne tabes perniosa futura id malum subsequatur. nõnunquam etiam leuius ipso osse affecto & inter initia neglecto, non pus, sed humor quidam nictis similis intus coit: mollescitq; contra tactis, in qua simili uestione utendum est.



## De spinæ curatione.

i N spina quoq; est quod proprie notemus. nam si id quod ex uertebra excedit, aliquo modo fractum est: locus quidē concavus fit: punctiones autem in eo sentiuntur, quia necesse est ea fragmenta spinosa esse. quo fit ut homo in interiorem partem subinde nitatur. hæc noscendæ rei causa sunt. medicamentis uero hisdem opus est: quæ plurima parte huius capitis exposita sunt.

De humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fracturâ, uel euulsorum, communibus curationibus. Cap. X.

Imiles rursus ex magna parte casus curationes quæ sunt humeris, & femoribus: communia etiam quedâ humeris, brachijs, femoribus, cruribus, digitis. siquidem ea minime periculose media fraguntur. quò propior fractura capiti uel superiori uel inferiori est: eò prior est. nam & maiores dolores affert: & difficilius curatur. ea maxime tolerabilis est simplex, transversa. peior ubi fragmenta, atq; ubi obliqua. pessimum ubi eadem acuta. nonnunquâ autem fracta in his ossa in suis sedibus remanent: multo sæpius excidunt: aliudq; super aliud effertur. idq; ante omnia cōsiderari debet. & sunt notæ certæ. si suis sedibus mota, resima, punctiōisq; sensum representant, tactu inæqualia sunt. si uero non aduersa, sed obliqua iunguntur, quod fit, ubi loco suo non sunt: membrum id altero latere breuius est: & musculi eius tument. ergo si hoc depressum est, protinus id membrum oportet extendere. nam nervi, musculiq; intenti per ossa contrahuntur: neq; in suum locum ueniunt: nisi illos per uim aliquis intendit. rursus si primis diebus id obmissum est, inflammatio oritur: sub qua & difficile, & periculose uis nervis adhibetur. nam distentio nervorum uel cæcer sequitur: uel certum, ut mitissime alatur, pus. itaq; si ante reposta ossa non sunt, postea reponenda sunt. intendere autem digitum, uel aliud quoq; membrum: si adhuc tenerum est, etiam unus homo potest, cum alteram partem dextra, alteram sinistra prendit. ualentius membrum duobus eget: qui in diuersa contendunt. si firmiores nervi sunt, ut in uiris robustis, maximeq; eorum feminibus, & cruribus euenit: habenis quoq; uel linteis fascijs utrinq; capita articularū deliganda, & per plures in diuersa ducenda sunt. ubi paulo longius quàm naturaliter esse debet membrum uis fecit. tū demum ossa manibus in suam sedem compellenda sunt: inditumq; ossi repositi est dolor sublatus. & membrum alteri parti æquatum inuolucrum duplicibus triplicis panni, & in uino, & oleo tinctis

quos linteos esse commodius est. ferè uero his sex opus est. prima breuissima adhibenda, quæ circa fracturam ter uoluta sursum uersum feratur, & quasi in coelea serpat: satisq; est eam ter hoc quoq; modo circuire. altera dimidio longiore, eaq; qua parte os eminet, ab ea si totum æquale est, undelibet super fracturam debet incipere priori aduersa: deorsumq; tendere, atq; iterum de fractura reuersa in superiore parte ultra priorem fasciam desinere. super has iniiciendum latio re linteo ceratum est, quod eas contineat. ac si qua parte os eminet, triplex ea pannus obijciendus eodem uino & oleo madens. hæc tertia fasciæ comprehendenda sunt: quartaq; sic, ut semper insequens priori aduersa sit: & tertia tantum inferiore parte tres in superiore faciant: quia satius est sæpius circuire, quam adstringi. siquidem id quod adstrictum est, alienatur: & cancro opportunè est: articulum autem quamminime uincire opus est. sed si iuxta hunc os fractum est, necesse est. deligatum uero membrum in diem tertium continendum est. eaq; iunctura talis esse debet, ut primo die nihil offenderit: non tamen laxa uisa sit: secundo laxior: tertio iam penè resoluta. ergo tunc rursum id membrum deligandum: adijciendaq; prioribus quinta fasciæ est: iterumq; quinto resoluendum est: & sexta fasciis inuoluendum sic, ut tertia & quinta infra ceteræ supra finiantur. quotienscunq; autem soluitur membrum, calida aqua fouendum est. sed si iuxta articulum fractura est: diu instillandum uinum est, exigua parte olei adiecta, eademq; omnia facienda donec adeo inflammatio soluat: uel lenius quoq; quàm ex consuetudine id membrum fiat: quod si septimus dies non dedit, certe nonus exhibet. tum facillime ossa tractantur. rursus ergo si parum commissa sunt, committi debent. si qua fragmenta eminent, in suas sedes reponenda sunt. deinde eodem modo membrum deligandum, ferulæq; super accomodandæ sunt: quæ fasciæ, circumpositæq; ossa in sua sede contineant: & in quam partem fractura inclinat, ab ea latior, ualentiorq; ferula imponenda est. easq; omnes citra articulum esse oportet resimas, ne hunc lædant: nec ultra astringi, quàm ut ossa contineat, & cum spatio laxentur: tertio quoq; die paulum habentis suis coartari: ac si nulla prurigo, nullus dolor est, sic manere donec duæ partes eius temporis quod quoq; os cõseruet, compleantur: postea lenius aqua calida fouere: quia primo di geri materiam opus est: tum exocari. ergo cerato quoq; liquido id plener est ungendum: perfricandaq; summa cutis est: laxiusq; id deligandum est. tertio quoq; die soluendum sic, ut remota calida aqua cetera eadem fiant. tantummodo singulæ fasciæ quotiens resolutæ fuerint, subtrahantur.



## De fracti humeri curatione.

**b** Acc communia sunt: illa propria. siquidem humerus fractus non sic, ut membrum aliud intenditur. sed homo collocatur alto sedili: medicus autem humiliore aduersus: una fascia brachium amplexa ex ceruice ipsius, qui laesus est, id sustineat. altera ab altera parte super caput data, ibi accipit nodum. Tertia iuncto imo humero deorsum demittitur, ibi quoque capitibus eius inter se iunctis: deinde ab occipito ipsius minister sub ea fasciam, quam secundo loco posui: correpto si dexter humerus ducendus est dextro: si sinister, sinistro brachio demissum inter femina eius, qui curatur, baculum tenet. medicus super eam fasciam de qua tertio loco dixi, planam iniicit dextram: si sinister, sinistram, si dexter humerus sumatur. si mulq; alteram fasciam minister attollit: alteram premit medicus. quo fit ut leniter humerus extendatur. fascijs uero, si medium aut imum os fractum est, breuioribus opus est: si summum, longioribus. ut ab eo sub altera quoque ala perfectus, & scapulas porrigantur. protinus uero brachium cum deligatur, sic inclinandum est, id quod afficit, ut ante fascias quoque sic figurandum sit, ne postea suspensum aliter aliter cum deligabatur, humerum inclinet. brachioque suspensio ipse quoque humerus ad latus leniter deligandus est: perque fit, ut minime moueatur: ideoque ossa sic se habent, ut aliquis composuit. cum ad ferulas uentum est, extrinsecus esse earum longissimae debent, a laterto breuiiores: sed sub ala breuissimae. saepiusque eae resoluendae sunt, ubi in uicinia cubiti humerus fractus est: ne ibi nervi rigescant: & inutile brachium efficiant. quotiens solutae sunt fractura manu continenda: cubitus aqua calida fouendus, & molli cerato perfricandus: ferulaeque: uel omnino non imponendae contra eminentia cubiti: uel aliquanto breuiiores sunt.

## De brachij fracti curatione.

**a** T si brachium fractum est, in primis considerandum est alterum os, an utrumque comminutum sit: non quo alia eiusmodi casu curatio admouenda: sed primum ut ualentius extendatur, si utrumque os fractum est: quia neasse est minus nervos contrahi altero osse integro, eosque intendente. deinde ut curiosius omnia in continendis ossibus fiant: si neuirum alteri auxilio est. nam ubi alterum integrum est, plus opis in eo, quam in fascijs, ferulisque est. deligari autem brachium debet paulum pollice ad pectus inclinato: siquidem is maxime brachij naturalis habitus sit: idque inuolutum scutella commodissime excipitur: quae latitudine ipsi brachio per angu-



sis capitibus collo iniicitur: atq; ita commode brachium ex cervice suspensum est: idq; paulum supra cubiti alterius regionē pendere oportet. quod si ex summo cubito id factum sit, glutinare id vinciendo alie num est. fit enim brachium immobile. ac si nihil aliud quam dolori ocursum est, idem qui fuit eius usus est.

De crurum femorumq; fractorum curatione.

**i** N crure æque ad rem pertinet alterum saltem os integrum manere: commune uero ei femoriq; est. quod ubi deligatum est, in canalem coniiciendum est. is canalis & inferiori parte foramina habet: per quæ si quis humor excesserit, descendat: & à planta moram, quæ simul & sustineat eam: et delabi non patiatur: & à lateribus cava, perq; loris datis mora quidem, crus, femurq; ut collocatum est, detineat. esse etiam is debet à planta si crus fractum est, circa poplitem. si femur, usq; ad coxam. si iuxta superius caput femoris sic, ut ipsa quoq; ei coxa sit. neq; tamen ignorari oportet si femur fractum est, fieri breuius: quia nunquam in antiquum statum reuertitur: summisq; digitis postea cruris eius insisti. sed multa tamē femori debilitas est: ubi fortunæ negligentia quoq; accessit.

De fracti digiti curatione.

Digitum satis est ad unum furculum post inflammationem deligari.

Communes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitosq; constrictos pertinentia.

**h** Is proprie ad singula membra pertinentibus, rursus illa cōmunia sunt, primis diebus fames: deinde tum cū iā incrementum calli oportet, liber aliud alimentum. longa à uino abstinentia: fomentum aquæ calidæ. dū inflāmatio est, liberale. cum ea desit, modicum. tum etiam longior ulterioribus et liquido cerato membris, et mollis tamen unctio. neq; protinus exercendū id membrum: sed ad antiquos usus reducendum est. grauius aliquanto est, cum ossis fracturæ carnis quoq; uulnus accessit: maximeq; si id musculi femoris, aut humeri senserunt. nam & inflammationes multo grauiores, & propiores caneros habent. ac femur qdem si ossa inter se cesserunt, fere præcidi necesse est. humerus uero quoq; in periculum uenit: sed facilius conseruatur. quibus periculis etiam magis id expositum: quod iuxta ipsos articulos ictum est. curiosius igitur agendum est: et musculus qdem per mediam plagam transuersus præcidendus. sanguis uero, si parū fluxit, mittendus. corpus in media extensandum: ac reliqua qdem

membra lentius intendenda: & lenius in his ossa in suam sedem re-  
 ponenda sunt. his uero neq; intendi nervos, neq; ossa tractari satis ex-  
 pediat. ipsiq; homini permittendum est, ut sic ea colloata habeat: quæ-  
 admodum manum ledunt. Omnibus autem his uulneribus imponen-  
 dum primo linamentum est uino madens: cui rosæ paulum admodum  
 adiectum sit. cætera eadem deliganda fasciis sunt, aliquanto quàm  
 uulnus latoribus, laxius scilicet, quàm si ea plaga non esset. quanto  
 facilius & alienari, & occupari cancro uulnus potest numero potius  
 fasciarum id agendum est ut laxè quoq; æque contineant. quod in se-  
 more, humeroq; sic fiet, si ossa forte recte concurrerint. sin aliter se  
 habebunt, eatenus circumdari fascia debet, ut impositum medicamē-  
 tum contineat cætera eadem quæ supra scripsi: facienda sunt: præ-  
 terquam quod neq; ferulis, neq; canalibus, inter quæ uulnus sanescere  
 non potest. sed pluribus tantummodo, & latoribus fasciis opus est:  
 ingerendumq; subinde in eas est calidum oleum, & unum: magisq;  
 in primo, fame utendo uulnus calida aqua foveendum: friguq; omni  
 ratione uitandum: & transeundum ad medicamenta, quæ puri mo-  
 uendo sunt: maiorq; uulneri quàm ossi cura agenda. ergo quotidie  
 soluendum, nutriendumq; est. inter quæ si quod parvulum fragmen-  
 tum ossis eminet, id si retusum est, in suam sedem dandum: si acutū,  
 ante acumen eius longius est præadendum: si breuius limandum: et  
 utrinq; scilicet pro limandum. tum ipsum recondendum est. ac si id ma-  
 nus facere non potest, uolsella, quali fabri utuntur, iniicienda est. recte  
 se habenti capiti ab ea parte, qua si ma est: ut ea parte quæ cebra est,  
 emanens os in suam sedem compellat. si id maius est, membranalusq;  
 anguntur, sinere oportet ea sub medicamentis resolui: idq; os, ubi iam  
 nudatum est, abscidere: quod maturius scilicet faciendum est: potestq;  
 ea ratione & os coire: & uulnus sanescere. illud suo tempore: hoc pro  
 ut se habet. nonnunquam etiam in magno uulnere euenit ut frag-  
 menta quedam uelut emoriantur: neq; cum cæteris coeant. quod hic  
 quoq; ex modo fluentis humoris colligitur. quò magis necessarium est,  
 sæpius ulcus resolvere, atq; nutrire. sequitur uero ut id os per se  
 post aliquot dies excidat: cum tam misera antea conditio uulneris  
 sit. tamen id interdum maius, diutiusq; facies. sepe enim integra cu-  
 tis osse atrumpitur: protinusq; prurigo, & dolor oritur. quæ solue-  
 re, si accidit, maturius oportet: & fovere aqua per æstatem frigida:  
 per hyemem egelida: deinde ceratum myrteum imponere. inter-  
 dum fractura quibusdam uelut aculeis carnem uexat: quo à prurigo-  
 ne, & punctiombus cognito, aperire id melius, eosq; aculeos præcede-  
 re necesse habet. Reliqua uero curatio in utroque hoc casu eadem

est: quæ ubi ictus protinus intulit puro iam ulcere. cibus hic quoque utendum est carnem producentibus: si breuius adhuc membrum est, & ossa loco suo non sunt, paxillus tenuis quàm leuissimi generis inter ea demitti debet sic, ut capite paulum supra ulcus emineat: uq; quotidie plenior adigendus est, donec par id membrum alteri fiat. tum paxillus remouendus, vulnus sanandum est: cicatrix inducta fouenda frigida aqua est, in qua myrtus, hederæ, aliæ uel similes uerbenæ sint: illinendumq; medicamentum, quod siccet: & magis etiam hic quiescendum, donec id membrum confirmetur. si quando uero ossa non cõferbuerunt, quæ sæpe soluta, sæpe mota sunt: in aperto deinde curatio est: possunt enim coire. si uetustus occupauit, membrum extendendum est, ut aliquid lædatur. ossa inter se manus diuidenda, ut concurrando exasperentur, ut si quid pingue est, eradatur: totumq; id quasi recens fiat. magna tamen cura habita, ne nerui, musculi uel lædantur. tum uino fouendum est, in quo malicorium decoctum sit: imponendumq; id ipsum oui albo mixtum. tertio die resoluendum, fouendūq; aqua, in qua uerbenæ, de quibus supra dixi, decoctæ sint. quinto die idem faciendum, ferulæq; circumdandæ. cætera & ante, & post eadē faciendæ, quæ suprascripsi. Solent tamen interdum diuersa inter se ossa conferuere: eoq; & breuius membrum, & indecorum fit: & si capita acutiora sunt, assiduæ punctiones sentiuntur. ob quam causam frangi rursus ossa, & dirigi debent. id hoc modo fit. calida aqua multa membrum id fouetur: & ex cerato liquido perfricatur: intenditurq; & inter hæc medicus peractans ossa, ut adhuc tenero callo manibus ea diducat: compellitq; id quod eminet in suam sedem. & si parum ualuit, ab ea parte in qua os se inclinat, inuolutam lanā regulā obijcit. atq; ita deligando assuescere iterum uetustæ sedi cogit. nonnumquam autem recte quidem ossa cœperunt. superincreuit uero nimis callus: ideoq; locus intumuit. quod ubi incidit, diu, leuiterq; id membrum perfricandum est ex oleo, & sale, & nitro: multumq; aqua calida salsa fouendum: & imponendum malagma quod digerat: astrictusq; alligandum: oleribusq; et prætereauomitu utendum. per quæ cum carne callus quoq; extenuatur. confertq; aliqd de sinapi quod cū ficu in alterum par membrum impositum, donec id paulum erodat, eoq; euocet materiam. ubi his tumor extenuatus est, rursus ad ordinem uitæ reuertendum est.

## De luxatis ossibus.

## Cap. XI.

**C** de fractis quidem ossibus hæcenus dictum sit. mouetur autem ea sedibus suis duobus modis. nã modo quæ iuncta sunt



inter se debiscunt: ut cum latum scapularum os ab humero recedit: & in brachio radius à cubito. & in crure tibia à sura: interdum à saltu: calcis os à talo: quod raro tamen fit. modo articuli suis sedibus excidunt. ante de prioribus dictam. quorum ubi aliquid incidit, protinus is locus canis est: depressusq; digitus sinum inuenit. deinde grauis inflammatio oritur: atq; in talis præcipua. siquidē febres quoq; & caneros, & nervorum uel distentiones uel rigores, qui caput scapulis annectunt: mouere consuevit. quorum uitandorum causa facienda eadem sunt, quæ in ossibus mollibus læsis aliquid ubi incidit protinus his locis proposita sunt: ut dolor, tumorq; per ea tollantur. nam diducta ossa nunquam rursus inter se iunguntur. & ut aliquid decoris eo loco sit, nihil usus admittitur. maxilla uero & uertebra, oēsque articuli cum ualidis nervis comprehendantur: excidunt aut uel expulsi, aut aliquo casu nervis, uel ruptis uel infirmatis: faciliusq; in pueris & adolescentulis quàm in robustioribus: hiq; elabuntur in priorem, & in exteriorem partem, quidam omnibus modis, quidam certis: suntq; quædam communia omnium signa: quædam propria sunt cuiusq; siquidem semper ea parte tumor est, in qua os prorumpit. ea sinus, à qua recessit. & hæc quidem in omnibus deprehenduntur, alia uero si in singulis. quæ simulatq; de quoq; dictam, proponenda erunt. sed ut excidere omnes articuli non possunt, sic non omnes reponuntur. caput enim nonnunquam compellitur: neq; in spina uertebra, neq; ea maxilla, quæ utraq; parte prolapsa anteq̃ reponeretur, inflammationem mouit. rursus qui nervorum uicio prolapsi sunt, compulsi quoq; in suas sedes iterum excidunt. at quibus in pueritia exciderunt, neq; reposita sunt: minusq; cæteri cresunt. omniūq; quæ loco suo nō sunt: atro ea increſcūt: magisq; in proximo membro, q̃ in ulteriore. ut puta si humerus loco suo nō est, maior in eo ipso fit, quàm in brachio: maior in hoc quàm in manus acie. tum pro sedibus & pro casibus qui inciderunt, aut maior, aut minor usus eius mēbri relinquitur: quoq; in eo plus usus superest, eo minus id extenuatur. quæ quid autem loco suo motum est, ante inflammationem reponendū est. si illa occupauit, dum conquiescat. tunc læssendum est. ubi finita est, tentandum est in his membris quæ id patiuntur. multum autem eò cōfert & corporis, et nervorum habitus. nam si corpus tenue, si humilidum est, si nervi infirmi, expeditius os reponitur. sed & primo facilius excidit: & postea minus fideliter continetur. quæ contraria his sunt, melius continēt. sed id quod expulsū est, difficulter admittunt. oportet autem ipsam inflammationem leuare, super succa dalana ex aceto imposita. à cibo si ualentioris articuli casus est, triduo: interdum

etiam quinq; diebus abstinere debet. bibere aquā calidā dū situm finiat. curiosiusq; hæc facere his ossibus motis, quæ ualidis, plenisq; musculis continentur. si uero etiam febris accessit, multo magis deinde ex die quinto fouere aqua calida: remotaq; lana ceratum imponere ex cyprino factum, nitro quoq; adiecto, donec omnis inflammatio finiat. tunc infractionem ei membro adhibere: cibis uti bonis: uti uino modice: iamq; ad usus quoq; suos id membrum promouere: quia motus ut in dolore pestifer, sic aliàs saluberrimus corpori est. hæc cōmunia sunt, nunc de singulis dicam.

## De maxillæ luxatæ curatione. Cap. XII.

*m* Axilla in priorem partem propellitur: sed modo altera parte, modo utraq; si alteram in contrariam partem, modo utraq; ipsa mentumq; inclinatur: dentes paribus non respondent: sed sub his qui secant canini sunt. At si utraq; totum mentum in exteriorem partem promouetur: inferioresq; dentes longius quàm superiores excedunt: intentiq; super muscoli apparent: primo quoq; tempore homo in sedili collocandus est sic, ut minister à posteriore parte caput eius contineat uel sic, ut iuxta parietem is sedeat, subiecto inter parietem, & caput eius scorteo puluino duro, eoq; caput per ministrum urgeatur, quo sit immobilius. tum medici digiti pollices lintolis, uel fascijs ne dilabenter inuoluti in os eius coniungendi: cæteri extrinsecus admouendi sunt. ubi uehementer maxilla apprehensa est, si una parte procidit: concutiendum mentum, & ad guttur adducendum est. tunc simul & caput apprehendendum, & exatato mēto maxilla in suam sedem compellenda, & os eius comprimendum est sic, ut omnia pene uro momento fiant. si in utraq; parte prolapsa est, eodem omnia facienda, sed æqualiter retro maxilla agenda est. reposito osse si cum dolore oculorum, & ceruicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. cum omnibus uero quorum ossa mota sunt, primo liquidior cibus conueniat, tum his præcipue, adeo ut sermo quoq; frequenti motu oris per neruos lædat.

## De capite luxato. Cap. XIII.

*c* Aput duobus processibus in duos sinus summæ uertebrae de missis super ceruicem contineri in prima parte proposui. hi processus interdū in posteriorem partē excidūt: quo fit ut nersus sub occipito extēdatur: mētū pectori agglutinetur, neq; bibere is,

## LIBER

neq; loqui possit: interdum sine uoluntate semen emittat, quibus celerime mors superuenit. ponendum autem hoc esse credidi, non quo curatio eius rei ulla sit, sed ut res inditijs cognosceretur: & non putarens sibi medicum defuisse si qui sic aliquem perdidissent.

### De spina luxata.

### Cap. XIII.

**i** Dem casus manet eos, quorum in spina uertebrae exciderunt. id enim non potest fieri, nisi ex medulla quae per medium, & duabus membranulis, quae per duos à lateribus processus feruntur: & nervis, qui continent ruptis. Excidunt autem & in posteriore partem, & in priorem, & supra septum transversum, et infra. si in utraq; partem exciderit, à posteriore parte uel tumor, uel sinus oritur. si super septum id incidit, manus resolvuntur: uentus, aut distentio nervorum insequitur: spiritus difficulter movetur: dolor urget: & aures obtusae sunt. si sub septo, foemina resolvuntur: urina supprimitur: interdum etiam sine uoluntate prorupit. ex eiusmodi casibus ut tardius quam ex capitis, sic tamen intra triduum homo moritur. nam quod Hippocrates dixit uertebra in anteriorem partem prolapsa, primum hominem collocandum esse, & extendendum: tum calce aliquem super ipsum debere consistere: id intus impellere: in his accipiendum est, quae paulum excesserunt: non in his, quae toto loco motae sunt. nonnunquam enim nervorum imbecillitas efficit, ut quantum non exciderit uertebra, paulum tamen in anteriorem partem promineat: id non iugulat. sed ab interiore parte non continet quidem posse: ab exteriori, si propulsum est, plerumq; iterum redit: nisi quod admodum rarum est: uis nervis restituta est.

### De humero luxato.

### Cap. XV.

**h** Vmerus autem modo in alam excidit. modo in partem priorem. si in alam delapsus est, et victus cubitus recedit ab latere, rursum iuxta eiusdem partis aurē cum humero porrigi non potest: longiusq; altero id brachium est. si in anteriorem partem summum quidem brachium extenditur, minus tamen quam naturaliter, diffialiusq; in anteriorem partem q̄ in posteriorem cubitus porrigitur. Igitur si in alam humerus excidit, & uel puerile adhuc est corpus, uel molle certe, & imbecillibus nervis intentum est, satis est collocare id in sedili: & ex duobus ministris alteri imperare, ut caput late scapularum ossibus leniter reducat alteri ut brachium extendat, ipsum



dat, ipsum posteriore parte residentem renum sub ala eius coire: si-  
mulq; & ille os & altera manu brachium eius ad latus impellere.  
At si uastus corpus, nerviue robustiores sunt, necessaria est spatula li-  
gnea: & quæ crassitudinem duorum digitorum habet, longitudine ab  
ala ad digitos pervenit. in qua summa capitulum est rotundum &  
leniter cavum, ut recipere particulam aliquam ex capite humeri pos-  
sit. in ea bina foramina tribus locis sunt inter se spacio distantibus,  
inq; ea lora mollia coniunguntur. eaq; spatha fascia inuoluta quo mi-  
nus tactu lædat ad alam à brachio dirigitur sic, ut caput eius sum-  
ma ala subiiciatur. deinde loris suis ad brachium deligatur: uno lo-  
co paulum infra humeri caput, altero paulum supra cubitum, tertio  
supra manum. cui rei protinus inter ualla tunc quoq; foraminum  
aptata sunt. sic brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradum  
trahitur, ita alte ut consistere homo ipse non possit. simulq; in alteram  
partem corpus demittitur: in alteram brachium intenditur. eoq; fit  
ut capite ligni caput humeri impulsum in suam sedem modo cum so-  
no, modo sine hoc compellatur. multas alias esse rationes scire facile  
est uno Hippocrate lecto, sed non alia magis usu comprobata est. at  
si in priorem partem humerus excidit, supinus homo collocandus est:  
fasciaq; aut habena media ala circumdanda est: capitaq; eius post ca-  
put hominis ministro tradenda, brachium alteri: præcipiendumq; ut  
ille habenam, hic brachium extendat. deinde medicus caput quidem  
hominis sinistra debet repellere: dextra uero cubitum cum humero  
attollere: & os in suam sedem compellere. faciliusq; id in hoc casu,  
quam in priore reuertitur. reposito humero lana ala subiicienda est.  
si interiore parte os fuit, ut ei opponatur. si in priore parte, ut tamèn  
commodius deligatur: tum fascia primò sub ala obuoluta, caput eius  
debet comprehendere: deinde profectus ad alteram alam: ab eaq;  
ad scapulas: rursusq; ad eiusdem humeri caput tendere. sæpiusq; ad  
eandem rationem circumagi, donec bene id teneat. uinctus hac ratio-  
ne humerus commodius continetur: si adductus ad latus sit. ad id  
quoq; fascia deligatur.

De cubiti luxati curatione. Cap. XVI.

IN cubito autem tria coire: ossa humeri, & radius, & cubiti  
i ipsius ex his, quæ prima parte huius uoluminis posita sunt,  
intelligi potuit. sed cubitus qui innexus humero est, ab hoc  
excidit. radius qui adiunctus est, interdum trahitur: interdum subse-  
sit. in omnes uero quatuor partes excidere cubitus potest. sed si in

priorem prolapsus est, extensum brachium est: neq; recuruatur. si in posteriorem, brachium curuum est, neq; extenditur: breuiusq; altero est. interdum febrem, uomitumq; bilis mouet. si in exteriorem, interioreme ue brachium porrectum est, sed paulum in eam partem à qua os recessit recuruatum, quicquid incidit, reponendi ratio una est. neq; in cubito tantum est: sed in omnibus quoq; membris longis, quæ per articulum longa testa iunguntur. utrunq; membrum in diuersas partes extendere donec spatium inter ossa liberum sit. Tum id os quod excidit ab ea parte in quam prolapsum est, in contrariam impellere. Extendendi tamē alia atq; alia genera sunt, prout nervi ualēt: aut ossa huc, illuc ue sederunt. ac modo manibus solis utendum est: modo quædam alia adhibenda. ergo si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duas manus: interdum etiā habenis iniectis satis est. deinde rotundum aliquid à lacerti parte ponendum est. Et super id repente cubitus ad humerum impellendus est. at in alijs casibus cōmodissimum est eadem ratione brachium extendere: quæ fracto cubito supraposita est, Et tum ossa reponere. reliqua curatio eadem est, quæ in omnibus. celerius tantum Et sæpius id resoluendum est: multoq; magis aqua calida fouendum: diutius ex oleo, Et nitro ac sale perfricandum. in cubito enim celerius quàm in ullo alio articulo. siue extra remansit, siue intus reuertit, callus circundatur: usq; si per quietem increuit, flexus illius postea prohibet.

## De manu luxata. Cap. XVII.

**M**ANUS quoq; in omnis quatuor partes prolabitur: si in posteriore partem excidit, porrigi digiti nō possunt: si in priorem, non inclinantur: si in alterutrum latus, manus in contrarium: id est aut ad pollicem, aut ad minimum digitum conuertitur. reponi non difficillime potest super durum locum Et renitentem ex altera parte intendi manus, ex altera brachium debet sic, ut prona sit. si in posteriorem partem os excidit, supina: si in priore, si in interiore, exterioreme ue, in latus. ubi satis nervi diducti sunt, si in alterutrum latus procidit manus, brachium in contrarium repellendum est. at his, quæ in priorem, posterioremue partem prolapsa sunt, superimponendum durum aliquid: idq; supra prominens os manu urgendum est: per quod uis adiecta facilius in suam sedem compellit.

## De palma. Cap. XVIII.

**I**N palma quoq; ossa interdum suis sedibus promouentur, modo in priorem partem, modo in posteriorem. in latus enim

moueri paribus offibus oppositis non possunt: signum id solum est, quod omnium commune est. tumor ab ea parte, in quam os uenit: sinus ab ea à qua recessit. sed sine intento digito, tantummodo bene pressum os in suam sedem reuertitur.

## De digitis.

## Cap. XIX.

**T** in digitis totidem ferè casus, eademq; signa sunt: quæ in manibus. sed in his extendendis non æque ui opus est, cum & articuli breuiores, & nerui minus ualidi sint. super mensam tantummodo intendi debent, qui uel in priorem uel in posteriorem partem exciderunt. tum iam palma compelli: atq; id quod in la-  
tus elapsum est, digitis restitui.

## De femore.

## Cap. XX.

**V**m de his dixerim: de his quoq; quæ in cruribus sunt, uideri possum dixisse. siquidem etiam in hoc casu quædam similitudo est femori, & humero, & tibie, & cubito, pedi et manui: quædam tamen separatim quoq; de his dicenda sunt. femur in omnes quatuor partes promouetur, sæpius in interiorem, deinde in exteriorem, raro admodum in priorem, aut posteriorem. si in interiorem partem prolapsum est crus, longius altero, et uestitus est. extra enim pes ultimus spectat. si in exteriorem, breuius, rariusq; fit, et intus inclinatur. Calx ingressu terram non contingit, sed planta ima, meliusq; id crus superius corpus quam in priore casu fert, minusq; baculo eget. si in priorem crus extensum est, implicariq; non potest, alteri cruri ad calcem par est sed ima planta minus in priorem partem inclinatur: dolorq; in hoc casu præcipuus est: & maxime urina supprimitur. ubi cum dolore inflammatio quieuit, commode ingrediuntur: totusq; eorum pes est. sed & si in posteriorem extendi non potest crus, breuiusq; est, ubi consistit: calx quoque terram non contingit. Magnum autem femori periculum est, ne uel difficulter reponatur: uel repositum rursus excadat. quidam iterum semper excidere contendunt. sed Hippocrates, & Diocles, & Philonimus, & Nileus, & Heraclides Tarentinus, clari admodum authores, ex toto se restituisse memorie prodiderunt. neque tot genera machinamentorum quoque ad extendendum in hoc casu femur Hippocrates, Andreas, Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraclides, Faber quoque quidam repperissint, si id frustra esset. sed ut hæc falsa opinio est: sic illud uerum est. cum ibi ualentissimi nerui, musculiq; sine, si suum robur habent, uix admittere: si non habent, postea



non contineri. Tentandum igitur est, & si tenerius membrum est, satis est habenam alteram ab inguine, alteram à genu intendi. si ualidius, melius adducunt, qui easdem habenas ad ualida bacula deligant: tumq; eorum fustum in eas partes oppositæ mire obiecerint: superioresq; ad se utraq; manus traxerint: etiamnum ualentius intenditur membrum super scannum, cui ab utraq; parte axes sunt: ad quos habenæ illæ deligantur. qui ut in torcularibus conuersi, rûpere quoq; si quis perseverauerit: non solum extendere nervos, & musculos possunt. collocandus autem homo super id scannum est, aut pronus, aut supinus, aut in latus sic, ut semper ea pars superior sit, in quam os prolapsus est: ea etiam inferior, à qua recessit. nervis extensis si in priorem os uenit, rotundum aliquid super inguen ponendum: subitq; super id genu adducendum est eodem modo, eademq; de causa, qua id in brachio fit: protinusq; si complicari femur potest, intus est. In cæteris uero casibus, ubi ossa per uim paulum inter se recesserunt, medicus debet id quod eminet retro cogere: minister contra inde coxam pro pellere. posito osse nihil aliud noui curatio requirit, quam ut diutius his in lecto detineatur: ne si motum adhuc nervus laxioribus femur fuerit, rursus erumpat.

De genu. Cap. XXI.

g Enu uero & in exteriorem, & in interiorem, & in posteriorem partem excidere notissimum est: in priorem non prolabi pleriq; scripserunt. potestq; id uero proximum esse, cum inde opposita patella, ipsa quoq; caput tibiæ contineat. Megethenem tamen eum cui in priorem partem excidisset, à se curatum esse memoria prodidit. in his casibus intendi nervi rationibus hisdem, quas in femore retuli possunt. & id quidem quod in posteriorem partem excidit, eodem modo rotundo aliquo super poplitem imposito, adductoq; eo crure, reconditur. cætera uero manibus simul tum ossa in diuersas partes compelluntur.

De talo. Cap. XXII.

t Alus in omnes partes prolabitur. ubi in interiorem partem excidit, ima pars pedis in exteriorem partem conuertitur. ubi huic contrarius talus contrarium etiam signum extat. si in priorem partem erumpit à posteriore, latus nervus durus, & insanus est: minusq; is opus est. si in posteriorem lanx penè conditur, plaga maior fit. Reponitur autem his quoq; per manus, prius in diuersa pede & crure diductis. & in hoc quoq; casu diutius in lectulo perseverandum.

perseuerandum est: ne his talus qui totum corpus sustinet, parum confirmatis nervis ferendo oneri cedat: rursusq; prorumpat. calcaamentis quoq; humilioribus primo tempore utendum, ne iunctura talum ipsum lædat.

## De planta. Cap. XXIII.

**P**lantæ ossa hisdē modis quibus in manu prodeunt, his, hisdemq; conduntur. fasciā tantūmodo calcem quoq; debet comprehendere: ne cum mediam plantam, inunq; eius uinari necesse est, liber talus in medio relictus, materiam pleniorē recipiat: ideoq; suppuret.


## De digitis. Cap. XXIIII.

**I**n digitis nihil ultra fieri debet: q̄ quod in his, qui sunt in manu, positum est. Potest tamen conditus articulus medius, aut summus canaliculo aliquo contineri. hæc faciendæ sunt in his casibus ubi sine vulnere ossa exciderunt. hic quoq; & ingens periculum est: & eo grauius quo maius membrum est: quo ue ualidioribus nervis, aut musculis continetur. ideoq; humeris, femoribusq; motus mortis est: ac si reposita ossa sunt, spes nulla est. Non repositis tamen, nonnullum periculum est. eoq; maior in utroq; timor est, quo propius vulnus articulo est. Hippocrates nihil tuto reponi posse: præter digitos, & plantas, et manus dixit. atq; in his quoq; diligenter esse agendum, ne præcipitent. Quidā brachia quoq; & crura reposerunt: & ne cancri, distentionesq; neruorum orirentur, sub quibus in eiusmodi casu fieret mors matura: sanguinem ex brachio miserunt. uerum ne digitus quidem, in quo minimum ut malum, sic etiā periculum est, reponi debet ante inflammationem: aut postea cum iā uetus res est. si quoq; reposito osse nerui distenduntur, rursus id protinus expellendum est. Omne autem membrum, quod cum vulnere loco motum, neq; repositum est: sic iacere conuenit, ut maxime cubantem innat, tantum ne moueatur: ne ue depēdeat. in omniq; tali morbo magnum ex longa fame præsidium est. deinde ex curatione eadem quæ proposita est ubi ossibus fractis vulnus accessit: si nudum os eminet, impedimento semper futurum est. id quod excedit, abscidendum est: imponendāq; super arida linamenta sunt, & medicamenta non pinguia, donec quæ sola esse in eiusmodi re sanitas potest, ueniat. nam & debilitas sequitur: & tenuis cicatrix induatur: quæ necesse est, facile noxæ postea pateat.

Lesm. Jo. Francisc.  
Judson Neg. et enas  
1665







Hæbe salutiferum quod pangimus affere carmen  
 Inuentumq; tuum prompto comitare fauore.  
 Tuq; potens artis, reduces qui tradere uitæ  
 Nosti: atq; in cælum manes reuocare sepultos.  
 Qui colis ægæū, qui pergama, quiq; epidaurum:  
 Qui quondam placida tectus sub pelle draconis

P

Tarpeias arces, atq; incluta templa petisti  
 Depellens tetros præsentī numine morbos  
 Huc ades: & quicquid cupido mihi sæpe rogatus  
 Firmasti, cunctum teneris expone papyris.  
 Membrorum series certo deducta tenore  
 Ut stet, & assimilis medicinae defluat ordo:  
 Principio celsa de corporis arce loquamur.

Capiti medendo.

BALSAMA si geminis instillans auribus addas,  
 Tum poteris alacrem capitis reparare vigorem.  
 Vel quæ septenis censentur gramina nodis  
 Vtiliter neces: uel corno ex arbore fertum,  
 Puleium'ue potens una super aure locabis.  
 Aut illud mixto coctum clementer aceto  
 Cauta nare trahes: seu uisco lintea nexo  
 Induces fronti: seu tritæ gramina mentæ.  
 Spongia cum tepidis annexa liquoribus imbris  
 Profuit: aut hedera ex oleo decocta uetusto.  
 Profuit: aut cochleis frontem tractare minutis.  
 Si nocuit cerebro uiolentia solis aperto  
 Sæpe chelidonia ex acido perducta liquore  
 Sanauit: profunt & amica papauera somno.  
 Si prius in lento madefacta terantur oliuo.

Hemicraneo medendo.

POTIO si capitis morbo tentetur acuto  
 Allia diuersam lana contexta per aurem  
 Inducta profunt: & eodem balsama pacto.  
 Allia uel ternis piperis terna addita granis  
 Trita līnes: certam dabit hæc tibi cura salutem.

Porrigini depellendæ.

EST insensibilis morbus, sed noxius formæ  
 Cum caput immensa pexum porrigine ningit,

Q. Serenus.

H



Q. SERENI

Copia farris uti frendentibus edita saxis:  
Hanc poterit malve radix decocta lenare.  
Aut tu foeniculum, nitrumq; & sulphura uina  
Contere. deinde caput permixtis ablue cunctis:  
Furfuribus'ne nouis durum miscebis acetum,  
Ut uarios crines tali des unguine puros.  
Prodest & tarda demptus testudine sanguis:  
Et prodest cedro demissus ab arbore suauis.  
Desinet interea glomerari farrea nubes:  
Cessabitq; grauis crebrae porriganis imber.  
Capillo tingendo.

QV O S pudet ætatis longæ, quos sancta senectus  
Offendit: cupiunt properos abscondere canos:  
Et nigrum crinem fūco simulare dolo.  
His prodest acri contrita cupressus aceto,  
Vel frons lentisci, uel tristia poma sabuci:  
Lumbrici quoq; terrestres miscentur oliuo:  
Et iuuenem præstant rediuino flore capillum.  
Præterea niueum poterit depellere crinem  
Rhesina ex facili cæra, uiscoq; coacta:  
Ad rutilam speciem nigros flauescere crines  
Vngento caneris prædixit Tullius auctor.  
Si prægnans artus captiui sororis edit,  
Dicuntur foetus nigrantia lumina fingi.  
Phibiriæsi arandæ.

NOXIA corporibus quædam de corpore nostro  
Progeniuit natura uolens abrumpere somnos  
Sensibus: & monitis uigiles intendere curas.  
Sed quis non pauet pherecidis fata tragædi,  
Qui nimio sudore fluens animalia tetra  
Eduxit: turpi miserum quæ morte tulerunt.  
Sylla quoq; infelix tali languore peresus  
Corruit: & foedo se uidit ab agmine uinci.  
Sæpius ergo decet mordax haurire sinapi:  
Vel nitro, ac sale permixtis, acidoq; liquore  
Laxatis, ut sine simul allia tangere corpus:  
Aut lachrymis hederæ, aut succo perducere cedri.  
Quin etiam furfur mixto medicatur aceto.  
Vnda maris lendes capiti deducit iniquas:  
Et quicquid crebri defendit silua capilli.

Prurigni,

Prurigni, papulis, & scabiei arcendis.

ILLOTVS sudor, uel copia nobilis escæ  
 Sæpe graui scabie correptos asperat artus.  
 Ergo lutum prodest membris adhibere frictis:  
 Quod facit ex asino siccatus corporis humor.  
 Nec pudeat tractare finum quem bucula fudit.  
 Stercoris ex porco cinerem confundito lymphis:  
 Sic pauidum corpus dextra parcente foueto.  
 Proderit ex oleo pulvis, quem congerit alte  
 Dulcibus ex latebris patiens formica laborum.  
 Conuenit hinc tepido lita tradere corpora soli.  
 Feruentes papulas oleo curato liquenti:  
 Aut acido baccho miscebis farra lupini:  
 Atq; hinc in calido percurres membra lauacro.  
 Pruritus autem salfos leuat humor aceti:  
 Sine mari lauidus sudor, cochleæq; minutæ:  
 Quarum contactu perimetur acerba libido.

Frenesi, ac capiti purgando.

EX uitio cerebri frenesis furiosa mouetur,  
 Amissasq; refert frendens amentia uires:  
 Sine calens febris iactatos exedit artus:  
 Sine meri gustus, seu frigoris efficit aura.  
 Conuenit hic calidis pecudum pulmonibus apte  
 Tempora languentis medica redimire corona.  
 Illotis etiam lanis suffire memento:  
 Ceritum sæpe horrendi medicantur odores:  
 Atq; ideo insanos etiam curarier est par.  
 Purgatur cerebrum mansa radice pyretri.  
 Vngitur & succis, dederit quos parua sabucus,  
 Expressusq; hederæ mandatur naribus humor.  
 Aut mixtum rutæ crebro instillatur acetum.  
 Non semper præsens dolor est sanabilis: ergo  
 Cura magis prodest uenturis obuia morbis.

Fluori capillorum, & maculis capitis tollendis.

DEFLUIT expulsus morbo latitante capillus  
 Si raro lauitur: seu uis epota ueneni est:  
 Seu salamandra potens, nullusq; obnoxia flammis  
 Eximium capitis tactu deiecit honorem.  
 Nonnunq; uariant maculæ: paruisq; parumper  
 Orbibus aspersum ducit noua uulnera tempus.

Vipereæ pellis cineres his addito rebus,  
Roboreasue pilas, ursino'ue ungi'to seuor:  
Vel testudineo mage permulceto cruore.

Frigori sedando.

SAEPE ita peruadit uis frigoris, ac tenet artus,  
Vt uix quæsito medicamine pulsa recedat.  
Si ranam ex oleo decoxeris, abijce carnem:  
Vnguine membra foue: parili ratione ualebit  
Vrticæ semen: percepta q; frigora uincet:  
Et ceruina potest mulcere medulla rigorem.  
Decoctum raphani semen cum melle uorabis:  
Sine fel ursinum tepesacta dilue lymp'ha  
Proderit hoc potu: seu cassis ostrea testis  
Vsta dabit cinerem: qui pro sale sumptus in escis,  
Deutiet gelidum tepesacto uertice uirus.  
Nonnullus liquidum summit, mulsu' m q; sinapi q;  
Atq; palato agitat pariter, retinens q; mouens q;  
Allia nonnulli mandunt: olei'ue liquore  
Perfundunt calido cerebrum, nasi q; latebras.  
Quidam lactucæ credunt prodesse sapes.  
Curandi modus hic & suauis, & utilis idem est.

Elephantiasis propellendæ.

EST Elephas morbus tristis quoq; nomine dirus,  
Non solum turpans infandis ora papillis,  
Sed at'a præcipitans funesto fata ueneno.  
Huic erit aduersus cedri de cortice suauis,  
Mustellæ q; cinis: uel fusus sanguis ab illa.  
Nonnulli dixer' serum, prodesse bibendo.  
Mentastri folium potu, appositu q; salubre est.  
Nec frustra bulbos, & sulphura iungis aceto,  
Qui cupis horribiles ad pristina reddere uultus.  
Præterea nitrum debes cum melle iungat'um  
Spargere lacte bouis: uarias sic ungere frontes.  
Cerusam, & chartam, quam gens ægyptia mittit  
Thure simul misce atq; oleo, quod flore rosarum  
Conditum est: line sic faciem, sic redde salutem.

Cutis, & faciei uitij's propellendis.

INUIDA si maculet faciem lentigo decoram,  
Nec prodesse ualent naturæ dona benignæ,  
Erucam, atq; acidum laticem simul illine malis.

Proderit



Proderit & bulbus mellis dulcedine uictus,  
 Crudæ ne dulcedo miscetur cepa liquori:  
 sanguine uel leporis morbus delebitur oris.  
 Frons salicis cum flore suo contrita medetur.  
 sæpiolæ cineres ex ossibus omnia tollunt.  
 Cygneos adipēs hilari misceto lyæo:  
 Omne malum propere maculoso ex ore fugabis.  
 Horrebit si liuor atrox, aut nigra cicatrix,  
 Attrito sapone genas purgare memento.  
 Rugarum sulcos lentisci mastice tendes.  
 Si uero uitium est, quod ducat ab impete nomen  
 Hoc matutina poteris cohibere salina:  
 Seu folio platani, quod mansum mane domabis.  
 Fœda fluunt curui quæ purgamenta cameli  
 Vrentur, cineremq; dabunt: iungentur aceto  
 Mascula thura simul: diuinaq; cura ualebit.

Aurium uitijis suaturrendis.

CVM senus teneras dolor alte sauciat aures,  
 Fraxinea in flammis fundit, quem talea suauim  
 Infilles: siue obscænos ex uirgine rores:  
 Aut suauim ex folio dederit, quem populus alba.  
 Sæpe chelidonie rabidum sociatur acetum,  
 Adiunctoq; nitro procedit cura salubris.  
 Mentastri liquor expressus conducere fertur.  
 Infectum uiolis oleum bene consulit auri.  
 Annosa rubros si legeris arbore uermes  
 Ex oleo tere: sic tepidos infunde dolenti.  
 Si uero obstrusa sensus morietur in aure,  
 Lumbricos terræ, senumq; ex ansere rauco  
 Excoque: sic ueterem poteris depellere morbum.  
 Felq; bonis surdis etiam prodesse loquuntur:  
 Si iungas olidæ graue quod mænere capellæ.  
 Si uero in autas animal penetrauerit aures  
 Proderit admixto pauidi fel muris aceto.  
 At si lymphæ nocens peruasërit: anseris aptus  
 Immittetur adeps ceparum non sine succo.  
 Qui grauis est oculis sensum tamen auribus auget.  
 Vis & phœbigenæ diuinam discere curam:  
 Sitq; uel annosis confecta doloribus auris:  
 Allia tum septem numero, septemq; lupinos

Q. Serenus.

Cretaceam dabis in testam: tum delphica frondis  
 Addatur: mixto totum feruescat aceto:  
 Doctus eris tepidos illinc immittere rores.

Oculorum dolori mitigando.

SVMMA boni est, alacres homini contingere uisus.  
 Quos quasi custodes, defensoresq; pericli  
 Prospiciens summa natura locauit in arce:  
 Sic tamen ut nullos paterentur desuper ictus:  
 Atq; supercilio pauidi tegerentur opaco.  
 Sed dolor immeritum lumen si forte laessit,  
 Lana madens oleo noctu connectitur apte,  
 Viuentis'ue nepæ lumen gestatur amicum:  
 Ex folio caulis cineres, confractaq; thura,  
 Et laticem bacchi foetæ cum lacte capellæ  
 Desuper induces: atq; una nocte probabis.  
 Hyblæi mellis succi cum felle caprino  
 Subueniunt oculis dira caligine pressis.  
 Vetonice mansus siccabit lumina suatus.  
 Si tenebras oculis obducit pigra senectus  
 Expressæ marathroguttæ cum melle liquenti  
 Detergere malum poterunt: uel uulturis atri  
 Fella, chelidoniæ fuerint quis gramina mixta:  
 Hæc etiam annosis poterunt suauerrere morbis.  
 Fel quoq; de gallo mollitum simplicè lymp̃ha  
 Exacuet pueros dempta caligine uisus.  
 Siue columbarum finus admiscetur aceto:  
 Seu fel perditis parili cum pondere mellis:  
 Vina chelidoniæ simili ratione iugantur,  
 Efficiuntq; suo præclaros unguine uisus.  
 Aspera quinetiam mulcent, & rupta reducunt.  
 Si genus est morbi miserum quod lumen adurit,  
 Hic calor infuso mitescat lacte canino:  
 Anguib; ereptos adipēs æruginē misce:  
 Hi poterunt ruptas oculorum iungere partes.  
 Si uero horrendum ducent glaucomata peplum:  
 Spiritus alterius prodest: qui grana cumini  
 Pallentis madens uisus exalat in ipsos.  
 Si tumor infestat, rufos & gliscat in orbes,  
 Turgentes oculos uili circumline cœna.

Dentium

Dentium vitio, & oris fautori medendo.

HAVD facile est acrem dentistolerare dolorem:

Quo magis est æquum medicam pernoscere curam:

Cum baccho uiolas decoxeris, ore teneto.

Mansus item prodest succis oleaster acerbis.

Hinc obscædo fugit: lingue quoq; vulnera cedunt.

Cum uino piper, & nitrum tepido inde dolenti.

Sæpe chelidonie succo, uel lacte capellæ

Sanescunt dentes: aut tauri felle iuuantur.

Aut acidi latices clauso uoluntur in ore

Manditur apta rubus gingiuis, & bona labris

Lentiscus, myrtusq; emendant oris odorem.

Quod uero assumpsit nomen de dente fricando

Ceruino ex cornu canis est: aut ungula porcæ

Torrida: uel cinis ex cuius, sed non sine uitro:

Muricis aut tosti: uel bulbi extincta fauilla:

Ambitiosa putas: sunt ista salubria cunctis.

Exesos autem dentes si forte quereris,

Vre finum muris, patulusq; & hiantibus adde.

Vel cinerem dentis ceruini extinguere aceto

Conuenit: atq; canis immittere partibus apte.

Prodest & pulvis lumbrici corpore tosto.

Ora ambusta cibo sanabis lacte canino.

Sæpe etiam gelida gingiuas collue lymphæ:

Dentibus ut firmum possis seruare uigorem.

Si uero infandum proserpit ad intima uulnus,

Permiscto salem parili cum pondere thuris:

Hinc tractato locum: miram experiere medellam.

Aut tu sume pilam, quæ caudis hæret ouinis:

Hæc siata dabit molles, & fracta farinas.

Huius & attritu tetrum mulcebitur ulcus.

Vuæ fauibus, & quæ mollienda sunt medendis.

EGRESCVNT teneræ fauces, cum frigoris atri

Vis subiit: uel cum uentis agitatilis ær

Vertitur: atq; ipsas flatus grauis inficit undas:

Vel rabidus clamor fracto cum forte sonore

Planum radii iter: sic est Hortensius olim

Absumptus: causis etenim confectus agendis

Obticit: cum uox domino uiuente periret:

Et nondum extincti moreretur lingua disertæ.



## Q. SERENI

Ergo omni studio quæres inhibere dolorem:  
 Simplicibus lymphis confunditur acrium mel:  
 Additur ex cussus nivea simula gine fur fur:  
 Decocta hæc clauso simul exercentur in ore.  
 Præterea fauces extrinsecus ungere prodest  
 Vrsino & tauri senu, cæruq; remissis:  
 Omnia quæ geminis æquabis lanabis ante.  
 Disce etiam miram ex humili medicamine curam:  
 Actiæo melli iungas agreste papauer,  
 Decoctumq; simul mandes, mansumq; uorabis.  
 Crinitæ porri radices quinq; coquantur:  
 Hinc aqua non feruens uoluatur fauce sonora:  
 Nec tamen in stomachum descendat gutta patentem.  
 Si uero afflictam langor deiecerit uiam,  
 Tunc horas aliquot pronus recubare memento:  
 Aut illam pulvis tosti releuabit aneti,  
 Aut cinis ex cochlea: uel torrida brassica flammis.  
 Verum angina sibi mistum sale poscit acetum.  
 Quod prodest clauso uersatum agitare palato.

De rigore ceruicis.

AT SI ceruicis, duratq; colla rigebunt,  
 Mira loquar: geminus mulcebitur unguine poples:  
 Hinc longos pariter nervos medicina sequetur:  
 Anseris aut pingui torpentia colla fouebis:  
 Illitur & ualido multum lens cocta in aceto  
 Aut capræ finus & bubuli, aut ceruina medula  
 Hoc etiam immotos flectes medicamine nervos.  
 Quos autem uocitant colles attingere dextra  
 Debebis, qua Gallus erit pressante peremptus.

Tussi, & coleribus medendis.

NOXIA si penitus colerum sentire uenena  
 Perspicias, cocta lactucæ fronde leuabis.  
 Proderit & caules assumere sæpe madentes.  
 Interdum fauces tussi quatuntur atroci:  
 Allia tum sumes & cocta, & melle peruncta:  
 Semina uel raphani permixto dulcia melle:  
 Aut si fraxinea semen de fronde reuellis:  
 Interiora uora, uetitus contingere dente.  
 Omum melle teres, domitum feruentibus undæ,  
 Marrubium uel potens: hæc faucibus optima sumes,

Frenabisq;

Frenabisq; grauem facili medicamine tussim.

Digestioni, & stomacho.

QVI stomachum regem totius corporis esse  
 Contendunt, uera niti ratione uidentur.  
 Huius enim ualidus firmat tenor omnia membra:  
 At contra eiusdem franguntur cuncta dolore.  
 Quin etiam nisi cura iuuat, uitare cerebrum  
 Fertur, & integros illinc auertere sensus.  
 Lactucæ semen nigræ, quod lignea pila  
 Triuerit: admixto ieiunus sumito melle.  
 Sed cochlear trinum gustu tibi sufficit uno:  
 Aut tritum semen raphani, mulsumq; iuuabit:  
 Siue duæ partes absinthii, ac tertia rutæ  
 Decoctis potantur aquis, siliquæq; madentes:  
 Semina uel marathri foetæ cum lacte capellæ:  
 Puleium quoq; decoctum curabit amice:  
 Et potu, & fotu stomacho conducit anetum:  
 seu cochleas undis calefactas, ac propè iunctas  
 Suppositis torrens prunis: uinoq; geroq;  
 Perfusas cape: sed prodest magis esse marinas.  
 At male digestis si crapula seuiet escis,  
 Ex pipere, & calida florem de rore marino  
 Ebibe: seu salibus piper adde, & tenue cummum:  
 Quæ coctis tanges epulis, ac rapta uorabis:  
 Aut cubitum pergens suauem cape tristis aneti.  
 Venterculum Mergit sale iacto contere nalde  
 Tosto pane super piperis quæ puluere multo  
 Miscentur: capies diuinum munus in istis.  
 Grana peregrini piperis diffundito quinq;  
 Niliaco melli: quæ mane inserta capeffes.  
 Proderit hoc stomacho, uictas & conquoquet escas:  
 Felli uomitu, uel phthisi arcendis.

LVTEA si crescant, præcunctis noxia fella:  
 Allia parua nouem, piperis tot permole grana:  
 Quæ cyatho diluta gari mandesq; bibesq;  
 Hæc iterum septena capis post deniq; quina.  
 Præterea caulem, frondet si parua sabucus,  
 Decocto sale permiscet: ac iungis olino:  
 Tunc capis, ac tali auxilio fella horrida purgas.  
 Profunt & pelagi latices, quos pondere iusto

Q. SERENI

Dulabus associas lymphis, nulliq; liquenti:  
 Et niueus prodest ex ubere suauis asellæ:  
 Si tepido uino infundas, ac mella, piperq;  
 At uomitum radix narossi pota mouebit.  
 Si uero phthisis annoso sedet improba morbo,  
 Inuitas uino cochleas hausisse iuuabit.  
 Proderit & ueteris seni pila sumpta suilli:  
 Quæ capulas quoq; producat medicina salubris.  
 Mammis sanandis, uel stringendis.

VBERA facundo multum lactantia succo  
 Sæpe sibi noxæ nimium manando fuerunt.  
 Fecit igitur ualida duri reprimuntur aceti.  
 Post partum tumidas iniuste assurgere mammas  
 Interdum aspiciens: harum mala commemoratur  
 Murinus finis ex pluuiio sedare liquore.  
 Sin autem clausas penitus dolor angit acerbus,  
 Lumbricis terræ turgentes unge corymbos.  
 Si castigatas studium est præstare papillas,  
 Ex hederæ fertis ambas redimire memento:  
 Protinus, & raptas flammis mandare coronas:  
 Anseris aut senum pariter cum lacte tepente:  
 Aut ouum illinito tulerit quod garrula perdidit.  
 Præterea pluuiio decocta papauera rore  
 Hærescant multis post absoluenda diebus.  
 Vis & phœbigenæ cœlestia sumere dona,  
 Vbera cum tetræ laniata doloribus horrent:  
 Nauis ramentum, & quæ nomine præssion herba est:  
 Et quæ uulgarî sermone insana uocatur:  
 Græcus δεινὸν ἄνθος propria scit dicere lingua:  
 Necnon & calami radix, lapathiq; legumen  
 Mixta dabunt miras experto crede medelas.

Reiectioni cibi, aut sanguinis abstinendæ.

SI stomachus nondum concitatus expuit escas,  
 Sed magis atq; magis uitium reuomendo ualescit:  
 Allia cedemus, crebrumq; trahemus odorem.  
 Sin etiam rutulus fertur de pectore sanguis,  
 Sorbitum mentæ, raphanus uel æcta iuuabit.  
 Sæpe lapis teritur: specularem nomine dicunt:  
 Et mixtis hauritur aquis: sistiq; cruorem.  
 Vritur interdum raptus de subere cortex:



Et cinis ex calido prodest epota lyæo.

Ouorum cinis, aut colearum, aut deniq; pellis.

Aut cinis è salicum ramis prodesse putatur:

Aut platani pilulas acri infundemus ætæo:

Nullus erit sanguis, quem non abus iste moretur.

Iecoris, & lateris uitijis medendis.

SI mollis iecoris fibras dolor hauriet acer,

Protinus ex malsa potanda eleliphæos herba est:

Sumitur & semen: quod fraxinus alta profudit:

Vulturis atq; iecur: uel ius perdisis apricæ.

Præterea simili dragma pix dura, piperq;

Franzuntur: sic in mollito puluere iuncta

Egelidis miscentur aquis: recreantq; bibentem.

Abscinchi quoq; decocti potabitur humor.

Si latus immeritum morbo tentatur acuto,

Accensum extingues lapidem stridentibus undis:

Hinc bibis: aut aceris radicem tundis, & unâ

Cum uino capis: hoc præsens medicamen habetur.

Quid referam multis composita philonia rebus:

Quid loquar antidotum? uanus quis ista requirat?

At nos pauperibus præcepta feramus amica.

Necnon & iecoris quæretur fibra lupini:

Iungenturq; simul costum, poliumq; piperq;

Quæ diluta mero dantur potanda lyæo.

Est & uis morbi, quod telum commemoratur:

Cum subito dolor insanus fuerit incitus ictu:

Persicus huic potum è nucleo dabit interiore:

Quæ mihi cura satis casu monstrante probata est.

spleni curando.

QUANDO lyen tumido circumligat ilia uinclo,

Et plenum splenis demonstrant membra rigorem,

Mollibus ex hedera tornantur pocula ligni:

Hinc trahet assuetos æger quoscunq; liquores:

Aut uiridis coctorum olerum potabitur unda.

Proderit exuncto fluminalis hirudo cruore:

Sive mirica potens: seu ros cum pane marinus:

Aut hederae suavis potu, appositusq; iuuabit.

Necnon intactam ferro, quam uideris alnum,

Huic liber eripitur, ferro sine decoquiturq;

Donec uictarum pars tertia subsit aquarum.

## Q. SERENI

Hinc medico potu pulsus dolor omnis abibit.  
 Nonnulli memorant consumi posse lienem,  
 Erum si semper ieiuno sumpserit ore.  
 Arida ficus item feruente domatur aceto:  
 Et trita illinitur: uel splen apponitur hædi.  
 Marrubium in uino potum prodesse loquuntur.  
 Præterea piper, ac nepete cum flore, & anetum,  
 Capparis, atq; Apium, buglossaq; iungitur una:  
 Horum decoctos latices potare salubre est.  
 Puleium, abrotanum nitida cum mastice coctum,  
 Ac thymbræ speciem, quam commemorant cephaloten:  
 Prædixit spleni deus idem posse mederi.  
 Dulcia Plautus ait, grandininus apta lien:  
 Splen tumidus nocet: & risum tamen addit ineptum:  
 Ut mihi sardois uideatur proximus herbis:  
 Irrita quæ miseris permiscet gaudia fatis.  
 Diatur exectus faciles auferre cichinos,  
 Perpetuoq; æuo frontem præstare seueram.

Præcordijs sanandis.

LANGUIDA si duro turgent præcordia morbo,  
 Misceatur mulse farris sextarius unus:  
 Necnon & lini tunsam, siliquaq; legumen:  
 Hæc decocta simul, nondumq; repentia nectis:  
 Aut quæ poma cydon creteis misit ab oris  
 Cocta lines: durum ut possis mollire tumorem.  
 Ocima præterea, bulbine linuntur amari.  
 Proderit & lymphis corpus mersare marinis.  
 Quin etiam catulum lactantem apponere membris  
 Conuenit: atq; malum transcurrere fertur in illum:  
 Cui tamen extincto munus debetur humandi.  
 Ne iunctus uitium duat de coniuge coniunx.  
 Quod superest styraei iunges ramenta carinæ.  
 Quodq; decem ex rebus decatartyma rite uocatur.  
 Mastice addentur cum puluere mollia farræ:  
 Talibus auxilijs præcordia tuta resident.

Lumbis, & renibus sanandis.

CVM seuit penitus hærens iniuria lumbis,  
 Igne lapis candens datur exultantibus undis:  
 Hoc poteris potu tristem superare dolorem.  
 Aut pice cum molli nitrum, sulphurq; & acetum

Hinc medico potu pulsus dolor omnis abibit.  
 Proderit hanc ægris erebro perducere membris.  
 Aut caput asparagi cum uino simeuetusto:  
 Seu manus appone: modus conducit uterque.  
 Aut adipi mixtum lumbis inducito sulphur:  
 Sæpe chelidonium cum succo palladis addes,  
 Farræq; quæ tremulis profunt sudantia flammis.  
 Fertur amigdalinae succus nucis esse bibendus:  
 Pinsitur, & tepidis sorbebitur addita lymphis.  
 Aut tres ex uino cochleas feruescere coges:  
 Cumq; suis domibus franges, piperis quoq; grana  
 Ter quinq; adicies: poti q; inuaberis illo.  
 Fursur item parca fuerit cum feruidus unda,  
 Post oleo madidus succis immittitur aptis:  
 Quæ uix passurus urentia iungito membris.  
 Prodest ceruinæ medicans natura medullæ.  
 Nec nocuit ciceris cocti potasse liquorem:  
 Aut mistam teneris mandisse lilis facta maluis:  
 Contritumq; simul cum mastice confer anetum.  
 Quodq; decem rebus componi ex nomine clarum est:  
 His continge locum. deus hæc mihi certa probauit.

Ventris dolori mitigando.

SI DOLOR insanus tota desauit in aluo,  
 Heministibus in lymphæ ualidam quoque rutam,  
 Aut apium: donec pars duplex desit aquarum.  
 Potus erit medicus non detrectante palato.  
 Præterea niuei sterilis testa uritur oui,  
 Quæ postquam in tetram fuerit conuersa farinam,  
 Ex calidis potatur aquis: & pota medetur.  
 Necnon iungenda est utero noua uirga miricæ  
 Illæsa hæc ferro, terraq; intacta geratur:  
 Aut medio uentris prodest aspergere terram:  
 Quam signauerunt uestigia pressa rotarum.  
 Proderit & puluis facili sub cardine raptus.  
 Quin etiam & lymphis coctum potare cuminum  
 Conueniet, quod iam nobis documenta probarunt.  
 Menta quoque hoc pacto medicos dabit hausta saporis.  
 Cœliacos autem recreabis pane salubri,  
 Quem madido farre efficies, ac mollibus ouis:  
 Quorum testa ferro prius euanescet aceto.



## Q. SERENI

Refert & teretes bulbos mollire terendo:  
 Cūq; his leni clarum potare fluentum.  
 Hydropisi depellendæ.

CORRVPTI icoris uitio, uel splenis acerno  
 Crescit hydrops: aut cum siccata febre medullæ,  
 Atq; auidæ fauces gelidum traxere liquorem.  
 Tum lymphæ intercus uitio gliscente tumescit,  
 Secernens miseram proprio de uiscere pellem.  
 Conueniet teneræ radix decocta sabua  
 In geminis calidi cyathis potanda lyæi.  
 Fraxineum semen cum bacchi rore bibendum est.  
 Aut calido filicis radicem mollit iaccho,  
 Qui subito raptos uentos, sucosq; reuellit.  
 Nec non appposito curantur dropacæ membra:  
 Vngvine quo frangit uirus langoris aquosi.  
 Necnon in tepidis conuolues corpus arenis.  
 Apposituq; leues Nepetæ, gustuq; innabunt.  
 Sæpe & scyllino pelluntur noxia baccho.  
 Helleboro bene purgatur lymphaticus error.  
 Aut huius uice quod fert semen lenta genista  
 Miscetur: mulsis coctusq; educatur undis.  
 Est qui præualidum nitro sale miscet acetum:  
 Atq; olei suco refricat turgentia membra.

Ventri molliendo.

SAEPE cibi specie, uitio uel corporis ipso  
 Potibus, aut duris restricta morabitur aluus.  
 Vincetur talis mora gramine mercuriali,  
 Cuius aquam cocti minimo cum melle bibemus.  
 Prunaq; conueniunt quæ mittit clara Damascus.  
 Multos præterea medici componere sucos  
 Assuerunt: preciosa tamen cum ueneris emptum  
 Falleris: frustra q; immensa nonasmata fundes.  
 Quin age, & in tenui certam cognosce salutem.  
 Aut igitur tectum lana supponis alumen:  
 Aut edis in patinis teneræ decocta saluci:  
 Vel salsum mulsam capræ cum lacte capissis.  
 Crede tamen potum meliorem lactis equini:  
 Dicitur & ualidos asinæ lac uincere sucos.  
 Syluestris fici lachrymam prodesse loquuntur:  
 Quodq; satis melius uerbis dicamus Horati.

» Mitulus & uiles pellent obstantia conchæ:  
 » Sed choleas prius urtica, aut fursure pasci  
 » Purior hinc gustus noxa sine mouerit aluum.  
 Sæpe thalassomeli iunctum cumulauius hymbri.  
 Hæc purgant parili fuerint si pondere mixta.  
 Solutioni uentris, & dysenteriae compescendæ.

T A M uarij casus mortalia sæcla fatigant  
 Ut sint diuersis obnoxia corpora morbis.  
 Sæpe etenim nimio cursu fluit impetus alui:  
 Frenat commixto cum feruet brassica uino:  
 Aut cerasi uictum longo iam tempore pomum.  
 Suauis amineæ uitis cum pane medetur:  
 Mel bene permixtum calido potatur aceto.  
 Vile quidem facili factum, tamen utile opinor,  
 Si lentent medicata data purgatori dextra,  
 Adiecto piperis medicatur puluere calda.  
 Sin autem longo decurrent intima fluxu,  
 Atq; immane malum multo iam tempore gliscit,  
 Torridus ex uino cortex potabitur oui.  
 Ramentum nisei credunt prodesse Elephanti.  
 Arbore pyramæa cortex direpta medetur  
 Axe sub atrito pix nigro mixta lyæo.  
 Immensum poterit potu retinere fluorem:  
 Numinis aut iussu cedrum cum mastice misces:  
 Mollitamq; picem, & rasum de nauibus unguen  
 Languida quo fidens medicamine membra fouebis.  
 Proderit & pueris quos dentis origo fatigat  
 Castaneas coxisse nuces, & sorba uetusta,  
 Atq; apium, caulesq; rubus quos fundit acuta:  
 Potio quæ fluidam consumpta morabitur aluum.

Lumbricis, & tineis purgandis.

Q U I D non aduersum miseris mortalibus addit  
 Natura? interno cum uiscere tinea serpens,  
 Et lumbricus edax uiuante inimica creentq;.  
 Quod genus assiduo laniat præcordia morsu.  
 Sæpe etiam scandens oppletis faucibus hæret:  
 Obsessaq; uias uitæ concludit hanelæ.  
 Ergo cinis cornu ceruini proderit haustus:  
 Vel nepetæ tritum ex uino, uel lacte capellæ:  
 Necnon & succus medici potatu saceti.

Q. SERENI

Prodest prætereacum baccho persica frondis:  
Democritus memorat mentæ conducere potum.  
Sumitur abrotanum, necnon & uile melanthum:  
Allia per sese sanant: aut ius coriandri.  
Quin & marrubium decoctum, haustumq; innabit,  
Puleium'ue potens, & agreste iugatur anetum.  
Synthesis hæc prodest unda mollita calenti.

Colo sedando.

CVM COLVS inuisum morbi genus intima carpie  
Mande galeritam uolucrem, quam nomine dicunt:  
Aut pauidi leporis madefacta coagula pota:  
Sine apio tritas nepetas cum mastice iunges.  
Necnon & species ambas redolentis aneti,  
Quarum decoctos patiens haurito liquores.

Vesicæ, & calculo purgando: & urinæ prouocandæ.

SI CUI uesicæ tardus cunctabitur humor  
Hæc mora rumpetur uiuo peruicta uetusto.  
Prodest & paruos acidos potare sabuci.  
Aut hederæ suatum: aut lachrymosi trita synapi.  
Necnon resinas ex oricia terebinto  
In speciem eruiiliæ paruos glomerabis in orbes:  
Quos ternos tepida mixtos hausisse medella est.  
Quondam etiam nimio præceps urina fluento  
Irrigat exunias, obscænoq; inficit hymbri.  
Ergo cinis nepetæ suatus uel proderit haustus:  
Et uiuo tritus datur, aut cum lacte capellæ  
Tum leporis cerebrum ex uiuo potare decebit.  
Si dolor internam uesicæ concoquit aluum  
Subueniet radix & frons epota cupressi:  
Puleium'ue potens donatum feruentibus undis.  
Si uero in lapides densus conuertitur humor  
Qui retinet cursus, gemitumq; dolore frequentat,  
Saxifragam, seu sarxeiphagon: succurrere credunt.  
Præterea semen myrti syluestris iaccho,  
Atq; oleo mixtum bibitur: nec desit acetum:  
Vinaq; sumantur fricta condita ammino.  
Sine palumborum capitur finus acriorum  
Dulcacidis sparsus sucus, trituq; solutus.  
Necnon obscænus capræ potabitur humor:  
Obruit hic morbum, labefactus saxa remittit.

De conceptione,



De conceptione, & partu. -

IRRITA coniugij sterilis si munera languens,  
Nec sobolis spes, multos iam uana per annos  
Foemineo fiat uitio res: nec ne silebo.

Hoc poterit magni quartus monstrare Lucreti.  
Sed natura tamen medicamine uicta potenti  
Sæpe dedit foetus studio curante paratos.

Aut igitur leporis consumit foemina uuluum:  
Aut ouis in stabulis fractas cum ruminat herbas  
Pendentem spumam molli deducit ab ore,

Atq; illam meminit mixto potare falerno:  
Mercurialis item capitur communiter herba:  
Sic cubitum noctu coniunx festinat uterq;.

Ast ubi iam certum spondet prægnatio foetum,  
Vt facili uigeat seruata puerpera partu,  
Dictamnnum bibit: & cochleæ manduntur edules.

At si per menses minus octo moratus in aluo  
Irrumpit thalamos: & nexus soluit inertes,  
Pulei bene purgati tunc conuenit hymber,

Cuius opem ueram casus mihi sæpe probarunt.  
Quin etiam sterco supponunt uulturis atri:  
Sentiat ut minime partus qui proximus urget.

Oua etiam rutæ, & fragili miscentur anetho:  
Quæ diluta simul uino, atq; exhausta medentur.  
Profluvio cuiusq; sanguinis, & matrici.

SI modicus pleno manat de corpore sanguis  
Subuenit: at nimius cum uita funditur ipsa.  
Quapropter multo naris completa cruore

Cum fluit, attritus cimex conducit odore:  
Lana oleo madefit, sed nondum lota rosato:  
Hæc datur in nares, uel claudit densius aures.

Contritis prodest cochleis obducere frontem:  
Aut galli cerebro, uel sanguine mitte columbæ.  
Quod nisi supprimitur, sanguis potandus & ipse est.

Præterea pharys caput emetire papyris:  
Detrahe quod superest, aliò genitalia nocte.  
Foemineas prodest illinc uincire mamillas.

Menstruus immenso si profluit impete sanguis,  
Succida lana malos remoratur subdita cursus.  
Mortua quin etiam producit corpora partu.

Q. Serenus.

Q. SERENI

Sed quæcunq; fluit uis immoderata cruoris,  
 Subernus cortex calidis potatur in undis,  
 Ante minutatim studio uincente terendus.  
 Sed si forte cruor clausa cunctabitur aluo,  
 Puleij calido purgatur foemina potu.  
 Aut molles nepetæ, aut rutæ quæcunq; bibentur.  
 At si puniceos fundit uestica liquores,  
 Marrubium ex passo tritum perfunditur undis:  
 Hi poterunt haustus rutilum purgare liquorem.  
 Reliquias partus dictami detrahit herba.  
 Quod si foeminei properabit sanguinis hymber,  
 Est qui frustra molæ percussu decutit uno:  
 Quorum aliquod lanis tectum ad præcordia neffit  
 Hæc simul inatantans sisti debere cruorem,  
 Ut lapis ille uix solitus iam desistit orbes.

Pilis qbuscunq; internecadis, quæ oculos impediunt.

NOBILIS hirsutas horret lasciuia setas,  
 Et gaudet rapto nudari flore pilorum:  
 Sed bona nonnunquam uellendi causa uidetur,  
 Corpora cum releuat ratio manifesta salutis.  
 Nanq; oculos infesta pilorum tela laceffunt:  
 Quodq; illis dederat nullum natura tuendis  
 Inde inimica seges proprios desecuit in orbes.  
 Ergo locum crinis uulsi continge cruore,  
 Quem dat anis tremulis simulat quæ pellibus alas:  
 Sanguine uel Ricini, quem nigro de cane uelles.  
 Præterea quasq; uoles auertere setas,  
 Atq; in perpetuum rediuiua obcludere tela,  
 Corporibus uulsi saniem perducato ranæ.  
 Sed quæ parua situ est, & rauco garrula questu,  
 Necnon quæ stagnis assantibus hæsit Hirundo  
 Sumitur, & uiuens sama torretur in olla:  
 Hæc acidis ungit permixta liquoribus artus,  
 A uulsaq; uetat rursus percrecere syluam.

Omnibus obsœnis medendis.

DICENDVM & quæ sit membris medicina pudendis.  
 Languidus antiquo purgatur penis iaccho:  
 Ac super illinitur foecundæ felle capellæ:  
 Mane nono myrti frondes commandere prodest.

Qui dolet, atq; illas in vulnus despuat ipsum.  
 Fecit etiam vini genitalia lauta leuantur:  
 Et tumidos testes necreia lymphæ cohercet.  
 Vel bulbi ex mulso, vel cera immista cupresso:  
 Aut faba cum tepidis baccho decocta fluentis  
 Ramicis immensum fertur cohibere tumorem.  
 Far madidum lymphis: medicæ cum fronde cupressi:  
 Vnde etiam potu frons hæc memoratur amica.  
 Sin autem existit durum tibi glandibus inguen,  
 Proderit induci coelheas cum melle minutas.  
 Obscenos si ponè locos nona vulnèra carpent,  
 Horrentum mansa curantur fronde ruborum.  
 Aut si iam ueteri succedit fistula morbo,  
 Mustellæ anere immisso purgabitur ulcus.  
 Sanguine tum ricini, quem bos gestauerit ante  
 Herba chelidoniæ fertur cum melle mederi:  
 Herbaq; cum seuo folijs de mille uocata.

Scies, & articulari morbo.

S A E P I V S oculus uicta coxendice morbus  
 Persurit, & gressus diro languore moratur:  
 Populus alba dabit medicos de cortice potus:  
 Necnon & teneræ gracili de fronde genistæ.  
 Arreptos caules, acidoq; liquore madentes  
 Sumere conueniet, rubiæ quoq; ducere potum:  
 Aut ex irino cochleas haurire lyæo.  
 Si uero articulos tabes inimica per omnes  
 Hæserit: ex ficu betas ac melle ligabis  
 Vel pelagi latices, simul & baccheia dona  
 Sumere curabis: nimio sed parato uino.  
 Ennius ipse pater dum pocula siccant iniqua,  
 Hoc uitio tales fertur meruisse dolores.

Furunculo medendo.

C V M sanguis nimius puri commistus atroci  
 Aestuat: & papulas alte sustollit acutas,  
 Resinam misces, & saxi ordea fracta  
 Conspersa hæc tepidis apponere conuenit undis:  
 Vis & hyoscyami cæræ, seuq; iugatum  
 Neciter: non minus hæc poterit medicina iuuare,  
 Prætereaq; finum ex gallo, quem legeris albo,  
 Imbribus ex acidis fidens appone dolenti.



Q. SERENI

Auribus aut pecudum molles expromito sordes:  
Vnguine quo fotis dabitur mediana papillis.  
Carboni medendo.

HORRENDVS magis est, perimit qui corpora arbo  
Vrit hic inclusus, vitalia rumpit acerbus.  
Hunc veteres quondam varijs pepulere medelis  
Tertia namq; titi, simul & centesima liui  
Charta docet ferro talem candente dolorem  
Exectum: aut potoraparum semine pulsum.  
Ni fieret dicens uix septem posse diebus  
Vitam produci, tanta est uiolentia morbi.  
Dulciadum, laticemq; cumini semine iunges:  
Atq; finum pariter paphiae compone columbae:  
Hinc line duratas partes: & clausa uenena.  
Præterea triti referant adoperta lupini.  
Nonnullus calcem uinam dissoluit aceto:  
Fumantemq; niuem papulis apponit acerbis.  
Est qui gallinae perducit stercore corpus:  
Allia uel piperi parce commixta linuntur  
Pythagoræ cognata leui condita cumino  
Proderit, & madida fermentum polline turgens.  
Pani, uomica, & strumæ depellendis.

SVNT alij, quos dura mouet natura tumores  
Non minus horrendi, sed non ita perniciosi:  
Vomica qualis erit: uel eidem proxima quædam.  
Simplice resina miscentur hordea tunsa:  
Et mulsos amnes: & purgamenta columbae:  
His bene decoctis languentia membra fouentur.  
Mollis odorato faba iungatur coriandro  
Proderit appositum: mollitq; aperitq; tumorem.  
Aut de phasgano radix decocta palustri:  
Quæ salis admixto tondetur condimento.  
Proderit & mansum, quod traxeris arbore uiscum.  
Gramen Hyoscyami ceræ, seuq; uetusto  
Concilia: mixtisq; locos perduce dolentes.  
Exercere etiam corpus medicina potens est.  
Ouum defundis in fictile, deinde putamen  
Marrubij succo implebis, post melle liquenti:  
Omnia consociata tepenti prospera potu  
sumuntur, referantq; malum, purgantq; lenantq;.

Igni

Igni sacro medendo.

EST etiam morbi species, quæ dicitur ignis:  
 Languida quo multo torrentur membra calore.  
 Vel tu vicino serum bouis igne remittis,  
 Mollitumq; lines: dederis uel fotibus oua:  
 Sed non cocta dabis: sic torrida membra fouebis.  
 Lumbricus terræ mixto inducetur aceto:  
 Aut parili noua Ruta modo: sed iungis oliuum:  
 Ouaq; cum betis profunt super illita iritis.  
 Allia dant anerem sociandum oleoq; garoq;:  
 Vngvine quo gliscens deponet flamma furorem.  
 Sæpe chelidonie pars candida iungitur oui,  
 Quæ medico potu, sed uili trita capesses:  
 Admiscere memor lymphas, amnemq; falerni.

Podagræ depellendæ.

QUAEDAM sunt rabidæ medicamina summa podagræ  
 Cui ter tricenæ species epidaurius ipse  
 Dixit inesse deus: requiem tamen huic dare morbo  
 Faserit: & tristem saltem mulcere dolorem.  
 Ergo age, & arreptam salicis frondemq; librumq;  
 Cum uino tere: sic contractos perline neruos:  
 At cum prima mali sese ostentabit origo,  
 Feruida non timidis tolera cauteria plantis:  
 Seminecis' ue hirci referato pectore calces  
 Inse: sic diræ reprimes primordia pestis:  
 Aut si corruptus perfederit altius humor:  
 Trita cupressus ibi baccho iungetur acerbo,  
 Panibus & teneris cohibebunt addita questus.  
 Parua sabucus item est hircino collita seuo:  
 Triticæq; acido manantes amne farine:  
 Aut nitidum ranæ decoctum uiscus oliuo:  
 Sine chelidonie succus sale mixtus aceto.  
 Sunt quibus apposita siciatur hirudine sanguis:  
 Non audita mihi sit fas, sed lecta referre.  
 Hoc quidam rabidus morbo per tempora missis  
 Vicino plantas frumenti pressit acervo:  
 Euasitq; grauem casu medicante dolorem.

Vulneribus ferro, aut uerberibus factis.

NATURAE uitij medicas obiecinus artes:  
 Nunc & fortunæ iaculis obsistere par est.

Q. Serenus.

Q. SERENI

Si cui forte lapis teneros violauerit artus,  
Necte adipēs vituli, simul & tritam chamuciffon.  
Nec pudeat luteæ sterqus producere porcæ.  
Sī autem seuo est laceratum uerberē corpus,  
Tum lexina cinis ceras dissoluit, & cūa:  
Admixtoq; oleo uibices comprimit atrox.  
Si uero infrenus manat de uulnere sanguis,  
Purpura torretur conchili perlita succo:  
Huius & atra cinis currentem detinet undam  
Verrucæ quoq; defectæ frenare cruorem  
Dicitur ambustus tyrio de uellere puluis.  
Præterea nimios referati uulneris amnes  
Feniculi cinis astringit, uel fimbria porri:  
Siue finus manni cum testis uritur oui,  
Et reprimat fluidos miro medicamine cursus.

Vulneribus quibuscunq; casibus actis.

C V M magna humanæ sint pondera conditionis:  
Tam multæ innumeri species mihi uulneris adsunt.  
Vt nequeam proprijs cunctis adscribere curas.  
Iisdem igitur monitis casus sanabimus omnes  
Sic tamen, ut nullus medicinam eluserit error.  
Ergo modus quicunq; obtingit uulneris atri,  
Contritus cum melle dabit medicamina bulbus:  
Herbaq; quæ folijs nomen de mille recipit.  
Apposita prodest adipi permixta uetusto  
Succida cum tepido nectetur lana lyæo:  
Ambustus uel cinis complebit uulneris ora.  
Concludit uero, uel frons, uel ramus ab ulmo.  
Vt succis hederæ pulchrescit foeda cicatrix.

Ab homine, uel simia morsis.

S I V E homo, seu similis turpissima bestia nobis  
Vulnera dente dedit: uirus simul intulit atrum  
Betoniam ex puro prodest assumere baccho.  
Necnon & raphani cortex decocta medetur:  
Si trita admorsis fuerit arcum lita membris.

Serpenti morsibus, & ueneris pellendis.

C V S P I D E non quisquā, longe neq; cade larissæ  
Fulmine non gladij, nolucris nec felle sagittæ,  
Quam cita uipereo potis est affligier ictu.  
Quare aptam dicamus opem, succosq; mudentes.

Cui



Cui noxuit serpens, fertur caput illius apte  
 Vulneribus iungi: sanat quæ sauciat ipsa  
 Ut larissæa curatus Telephus hasta.  
 Proderit & caulem cum uino haurire sabud:  
 Aut coctum raphani librum, tritumq; ligare:  
 Siue etiam excelsa folium de mole cupressi  
 Mandabit lactens caprifici succus opellam:  
 Aut tithymalus atrox vulnus contrita perungit.  
 Carduus est nondum doctis fullonibus aptus,  
 Ex illo radix tepido potatur in amni.  
 Ceruino ex foetu commixta coagula uino  
 Sumuntur: quæ res membris agit atra uenena.  
 Aut ferulæ radix potatur in hymbre lyæi  
 Betonicæ uel leues, gallinæ aut iura uetustæ.  
 Si uero horrendum vulnus fera iecerit assis,  
 Urinam credunt propriam conducere potu.  
 Varronis fuit ista senis sententia: necnon  
 (Plinius ut memorat) sumpti iuuat hymbæ aceti.  
 Dicendum & quæ sit præcorx medicina timenti:  
 Cautio namq; potest diros peruertere morsus.  
 Si iecur exectum tardo de uulture portes  
 Erucis, uel si totos perduxeris artus,  
 Quas prius attritas uehementi spargis aceto:  
 Aut tu ceruina per noctem in pelle quiescis:  
 Aut genere ex ipso dentem portabis amicum.  
 Toxicæ præterea quæ sint pellenda medela  
 Expediam: sanguis poterit prodesse caninus:  
 Qui facili potu antidotos imitatur honestos.  
 Vis & mirificos catulus prædisserere odores:  
 Aænsis quibus arcetur teterrima serpens,  
 Aut styracem torres: aut duri uulturis alam:  
 Vel nepetam: aut frondem rigidæ, strpemq; miricæ.

Ichibus Scorpj, & morsibus Muris cæci, uel Araneis

S V N T minimæ species: sed diræ uulnere pestes.  
 Quæ magis in tenui latitantes corpore fallant:  
 Scorpions ut grauis est, & araneus hæc mala semper  
 Captant securos multa iam nocte sopores,  
 Et documenta dedit nobis prostratus orion,  
 Magna quod exiguis perimantur membra uenenis.

Q. SERENI

At qui uulnus atrox incussit scorpius ardens  
 Continuo capitur: tunc digna cæde retusus,  
 Vulneribusq; actus fertur reuocare uenenum:  
 Aut calidis pelagi lymphis loca læsa fouentur:  
 Siue meri potu dissoluitur improba pestis.  
 Ad cunctos autem morsus, ictusq; minorum:  
 Caseus aptus erit pauide de lacte capellæ:  
 Cunq; hoc assumi debet origanus herba:  
 Hæc duo mirificis curabunt icta medelis.  
 Necnon feniculo calidum annectatur anethum  
 Aut uinum sulphur siccæ cum fece lyæi:  
 Exiguo piperis cerebrum conspergito galli:  
 Quo lita sanescunt depulso membra dolore.  
 Sin autem muris nocuit uiolentia cæci,  
 Quæ sola signauit uoluendis orbita plaustris,  
 Illine: mira datur uili de puluere cura.

Subitaneo dolori, febri, atq; ostæopo.

NON nunq̃ existit subiti noua causa doloris:  
 Cuius origo latet, uerus reprimenda medellis.  
 Nanq; chelidonium mixto salenectere prodest:  
 Velleræq; infuso recalentia sulphure sanant.  
 Ostæopon lento conducit melle perungi.  
 Sin autem calidæ depascent corpora febres,  
 Tunc apij suauis leni sociatur oliuo:  
 Membra lines: fortisq; ferus mulcebitur ignis.  
 Nec spernendus adeps, dederit quem bestia Melus.  
 Semineis cerui lachrymam miscere liquori  
 Conuenit: atq; artus illinc mulcere calentes:  
 Febribus at longis galli des iura uetusti.

Ad Typum quartanæ.

NEC tu crede leuem dilato tempore febrem:  
 Quæ spacium sibi dat magis, ut assando caleseat  
 Lentato quæ crassatur quartana calore:  
 Ni medicas adhibere manus discamus & herbas,  
 Allia non pudeat terno cum amice trita,  
 Et diluta mero medijs haurire diebus.  
 Aut facilem iecoris murini ducere fibram.  
 Quatuor & duri iungantur scrupula bacchi:  
 Mira est absinthii cum simplice potio lymphæ.  
 Summe tribus digitis apprehensum semen anethi,

Tantumdem

Tantumdem marathri, nulum nec desit aceto,  
In cuius cyatho prædicta salubriter hauris.  
Ilia quinetiam spartum suppone tumentis.  
Aut leporis trepidi diluta coagula trade.  
Prodest & potus sed mulsus doridis humor.  
Quidam etiam miranda ferunt ueniente calore  
Iurantes ludum ueneris, munusq; petendum.  
Sed prius est oleo partus feruescere ranæ  
In trinijs, illoq; artus perducere succo.

Ad Typum tertianæ.

EST etiam alternis febris rediuiua diebus:  
Tempora discernens quasi iustæ pondera libræ:  
Ut possis igitur talem prohibere furorem,  
Tu uolues cera sine caudis grana cumini,  
Puniceaq; indes pelli, colloq; ligabis.  
Pulei ramus lanæ uelatus amictu  
Tempore suspecto medicos præbebit odores.  
Præterea amex potatur tritus in ouo,  
Horridus attractu, sed gustu commodus apte.

Ad Typum quotidianæ.

AT qui continuis non cessat adire diebus,  
Sed tantum certus morbus discriminat horas,  
Triticum metuit granum (si credere dignum est)  
Quod latitans fracto fuerit sub pane repertum.  
Nec non ossa iuuant septis inuenta domorum:  
Conuenit hæc tereti pendentia subdere collo.  
Multaq; præterea uerborum monstra silebo:  
Nam febrem uario depelli carmine posse  
Vana superstitio credit, tremulæq; parentes.

Hemitritæo depellendo.

MORTI ferum magis est, qd̄ græcis hemitritæum  
Vulgatur uerbis: hoc nostra dicere lingua  
Non potuere ulli: puto nec uoluere parentes.  
Inscribis chartæ quod dicitur abra ca bra  
Sæpius, & subter repetis, sed detrahe sumam:  
Et magis atq; magis desint elementa figuris:  
Singula quæ semper rapies, & cætera figes,  
Donec in angustiam redigatur littera conum.  
His lino nexis collum redimire memento.  
Nonnulli memorant adipem prodesse leonis.



Q. SERENI

Corallum uero, si collonectere uelles:  
Ne dubites illo ueros miscere smaragdos.  
Talia languentis conducent uincula collo:  
Letalesq; abiget miranda potentia morbos.  
Fracturis, & luxis sanandis.

INFANDVM dictu cunctis procul absit amicis:  
Sed fortuna potens omen conuertat in hostes.  
Vis indigna nouo si sparserit ossa fragore,  
Conueniet cerebrum blandi canis addere fractis:  
Lintea deinde, superq; inductasnectere lanas:  
Sapius & succos conspargere pinguis oliui:  
Bis septem credunt coalescere cuncta diebus:  
Aut ueteri baccho capræ finus inde petulcæ:  
Hoc aperit clausum, trahit hærens, sanat apertum.  
Sin uero caput infestus colli serit ictus,  
Ex oleo necti uestis debet arachnes:  
Nesciet hæc illinc, nisi cum sanarit, abire.  
Quod si luxa suo decedent membra tenore,  
Vrere foemineos crines, ac iungere seuum  
Congruet, ac tali medicamine mota ligare.  
Aut maluam ex pingui tritam apposuisse iunabit:  
Aut si conclusum seruauit tibia uulnus.  
Stercus ouis placide iunges, adipeshq; uetustos:  
Pandere quæ poterunt ulcus, patuloq; mederi.

Neruis incis, & dolentibus, atq; contractis.

H A V D quisquam credet disiectos uulnere neruos  
Ad solitum rursus reuocari posse uigorem:  
Sed prodest tetræ lumbricos indere tritos:  
Quis uetus, & rancens sociari axungia debet.  
Si uero occultus neruos dolor urit inertes,  
Vulturis excisos adipeshq; remitte:  
Aut ceram, & tali recreabis languida fotu.  
Conuenit & pelagi calidis persudier undis.  
Carica cum betis lento uel melle iugatur:  
Aut baccho madefacta ceres cum fronde cupressi:  
Quo poteris potu recreare rigentia membra.  
Sin autem subito replicantur corpora morbo,  
Contractos reuocat neruos caro sumpta columbæ.

Aegris somno asciscendo.

NON solum miseros teterrima febris adurit:

Sed super optato pergit uiduare sopore:  
 Ne profit placidi cœlestia munera somni.  
 Charta igitur, varijs quam pinxit littera uerbis  
 Vritur, inde cinis calido potatur in amni.  
 Prodest puleium capiti subternere sæpe.  
 Proderit & mixtam lymphis potare cupressum  
 Palladijs itidem succis, quos flore rosarum  
 Iungis, & immisces madidum, tritumq; papauer;  
 Quo lita frons facilem præbebit nocte quietem.  
 Necnon mandragoræ gustu sopor additur altus.  
 Dilue prætere aglomeratam quam gerit intus  
 Lanam aries inter geminæ coxendias umbras:  
 Inde soporati ducentur gutture potus.

*Lethargiæ expellendæ.*

DIXI mus hanc sortem miseris mortalibus esse,  
 Vt sint sæpe mala inter se contraria morbi,  
 Deniq; nonnunq; somno sic membra grauantur,  
 Vt coniungantur letho sopor altus acerbo.  
 Ergo leui flamma torrentur cornua capræ:  
 Quo nidore grauem depellent lumina somnum.  
 Aut ueneris labrum, quæ dicitur herba bibetur:  
 Quæ teritur prius: & uino confusa liquecit.  
 Conueniunt acidis euphorbia mixta fluentis:  
 Gramina uel rutæ, gemina si nare trahuntur.  
 Quidam dira inbent septeno cimice trito  
 Vt utiantur aquæ, cyathusq; bibatur earum:  
 Hæc potiora putant, quam dulci morte perire.

*Comiciali morbo medendo.*

EST subiti species morbi, cui nomen ab illo est,  
 Quod fieri nobis suffragia iusta recusant.  
 Sæpe etenim membris atro languore caducis:  
 Consilium populi labes horrenda diremit.  
 Ipse deus memorat dubiæ per tempora lunæ  
 Conceptum, talis quem sæpe ruina profundit.  
 Prodest cum ueteri baccho fel uulturis atri,  
 Sed cochlear plenum gustu tibi sufficit uno:  
 Aut cruor ex prognæ mixtus cum polline thuris:  
 Aut apium elixum: aut conditum melle fel agni:  
 Marrubiumue pari confusum pondere mellis:

Q. SERENI

Cui tu terna dabis gustu cochlearia in uno.  
 Aptus mustelæ cinis est, et hirundinis unda.  
 Præterea plumias hominis quas calua supina  
 Excepit proiecta sinu, consumere prodest:  
 Aut lapis ex nido uaga quem congeffit hirundo  
 Vellitur: ex nexu fouet, attollitq; iacentem.  
 Pellitur (ut fama est) gustu quoq; langor anethi.  
 Regio morbo pellendo.

REGIUS est uero signatus nomine morbus:  
 Molliter hic quoniam celsa curatur in aula:  
 Huic rubia ex mulsâ fertur conducere lympa.  
 Allia trita dabis uino madefacta calenti.  
 Vellera cum uino suffiri sulphure prodest.

Detibus, uel strigis inquietatis infantibus.  
 NVDDVM hoïem primū mūdi natura profudit:  
 Insuper excruciat, nuneis cum dentibus armat.  
 Collo igitur molli dentes neclentur equini,  
 Qui primi fuerint pullo crescente caduca.  
 Aut teneris cerebrum ganguis illine porci:  
 Aut leporis nuneo bibitur cum lacte caprino.  
 Præterea si forte premit stryx atra puellor,  
 Virosa immulgens exertis ubera labris,  
 Allia præcepit Titini sententia neclti:  
 Qui ueteri claras expressit more togatas.

Combusturis igne, uel frigore factis.  
 SVNT diuersa quidem mala frigoris, atq; caloris:  
 Sed tamen amborum simili nocet ulcere uirus.  
 Illa quoq; usta putas, quæ sunt niue læsa rigente.  
 Conuersa in cinerem platani pila curat utrunq;  
 At uero ambustum flammis qui candidus oui  
 Suauis inest: penna inductus sanare ualebit.  
 Aut tu fractosæ cinerem perducto lanæ:  
 Aut uinam ex oleo ueteri composito calæm:  
 Ordea uel franges, atq; cui candida iunges:  
 Adsit adeps porcæ: mira est hæc forma medelæ.  
 Iunge chelidonij, ac sic line uulnera succis:  
 Quodq; recens uestit glacies, axungia simplex  
 Mulat: et ex facili grata est medicamine cura.  
 Venenis prohibendus.

VT tutus fias infestæ fraude nouercæ,



Vel quicumq; tuo carpetur liuidus auctu,  
 Non expectatis eat obuia cura uenenis.  
 Ante cibos igitur inglandis foetus edatur.  
 Prosunt electri uariantia pocula uirus.  
 Præterea coctæ querno cum cortice lymphæ  
 Conueniunt potu: demersa'ue ficus oliuo.  
 Sæpe etiam rhaphanum prædixit numen edendum.  
 Antidotus uero multis mithridatia fertur  
 Consociata modis: sed Magnus scrinia regis  
 Cum raperet uictor, uilem deprehendit in illis  
 Synthesin, & uulgata satis medicamina risit.  
 Bis denuum rutæ folium salis & breue granum,  
 Inglandesq; duas, terno cum corpore ficus  
 Hæc oriente die parco conspersa lyæo  
 Sumebat, metuens, dederat quod pocula matri.  
 Venenis datis.

SI nequit insandum præuerrere cautio uirus,  
 Proximus ille gradus data pocula pellere cura.  
 Lac asinæ, placidæq; bonis prodesse loquuntur.  
 Betonicam ex paruo sumunt pleriq; lyæo  
 Quod si hederæ succos, quæ truncos implicat altos  
 In stilles paruis, poterunt haud ulla nocere  
 Pocula, quæ quisquam seuis uitiauerit herbis.  
 Si quis Hyoscyamum gustarit lacte capellæ  
 Exhausto rabidos poterit mulcere furores.  
 Vulneribus, & rei dubiæ curandis.

VVLNERA tabescunt spacio uitiata dierum:  
 Curaq; nil prodest, nec ducitur ulla cicatrix:  
 Sed tamen herbarum tam mira potentia pollet,  
 Vlceris annosi sinus ut coalescere possit:  
 Marrubium si tu recoquas. illoq; liquore  
 Vulnus atrox foueas, cineres uel hirundinus alte  
 Inducas: leporis'ue aspersa coagula uino:  
 Aut hederam baccho decoctam, & semen anethi:  
 Aut cineres alni tardo cum melle ligentur.  
 Lumbrici terræ poterunt conducere uulnus:  
 Aut facilis lapathi coma latior ulcera purgat:  
 Et comixtus adeps, sed nonnullo sale tactus.  
 Pineæ præterea uino cum sulphure cortex:  
 Et picæ cum spissa iam perditæ membra reponit.

Q. SERENI

Et pice cum spissa iam perditā membra reponit.  
Verrucis tollendis.

INTERDVM existit turpi verruca papilla  
Hinc quondam fabio uerum cognomen adhæsit:  
Qui solus patræ cunctando restituit rem.  
Id poterit uitium sanguis curare lacertæ:  
Aut urina canis cum terra inducta madenti:  
Aut herbæ succus, quæ fertur nomine lichen.  
Est tithymalus item tali satis apta medellæ,  
Si rupta immensos fundit uerruca cruores,  
Purpureo tritice cinere de uellere profunt,  
Quod fuerit uero conchyli sanguine tinctum.  
Hæmorrhoidis medendis.

EXCRV ciant turpes anum si forte papillæ,  
Agrestis prodest radix super addita porri:  
Ne uiolet, sana, in inglandis fragmine clausum.  
Sal niueum sumus, bethicum quem nomine dicunt,  
Dulcia cumq; nigra iunges fuligine mella,  
Apponesq; super: pellit medicina dolorem.

Sequuntur. XXVI. uersus, qui in alijs impressis  
codicibus desiderantur.

Paralysi depellendæ. primo die ita agendum.

HVNC quicumq; cupis citius depellere murbum,  
Protinus antidotum studio tu perfice mirum:  
Salcet ut ualeas languenti ferre medelam.  
Castoreas siliquas bis sex perquirere cura:  
Tristis item digitis lympham mittere duobus.  
Deniq; tunc capies phyalam, quæ iustior extat:  
Aut equidem flammæ. sed prunas subijce sollers.  
Proderit interea tepidum potantibus illud:  
Ieiunis sed enim potius præbere memento.

Secunda ita medendum est.

CVNQVE secunda dies orbi peruenerit omni  
Haud alijs rebus prudens adiungere cures.  
Castoris, atq; nouem siliquas appendito statim:  
Atq; duos semis digitos mittere memento.  
In calice atq; proto lympham miscere duobus  
Qui patitur tepidum languens hinc sorbeat ipse.

*Tertia die ita curandum est.*

GRATIOR atq; dies terminus cum uenerit imo,  
Rursus in ægroto constanter fer medicamen,  
Castoreas siliquas iterum quæ pondere sint sex:  
Hinc etenim binos digitos metire memento  
De lymphâ liquida sed enim subiungere cura  
Et simili debes tepidum præbere modo tunc.

*Ita peragendum est à quarta die usq; ad sextam;  
& à septima usq; ad nonam, à decima usq; ad  
duodecimam, & mirificæ prodest.*

*Quid quarta die, & reliquis peragendum sit.*


QUARTVS & ille dies consentit. nec ne priori  
Quintus & est similis percellens nanq; secundo.  
Sextus itemq; simul concordat deniq; tertio:  
Septimus usq; nonum percurritur ordine primo:  
Sic decimas currens conscenditur ad duodenum.

\* a b c d e f g h i k l m n o  
p q r s t u x.  
Omnes sunt quaterniones, præter t. duernionem.

VENETIIS IN AEDIBVS ALDI, ET AN-  
DREAE ASVLANI SOCERI MENSE  
MARTIO. M. D. XXVIII.







8 ft. 4 in., 164 ft. 4 in.  
L. 10



COUNTWAY LIBRARY OF MEDICINE

R

127

C3

1528

RARE BOOKS DEPARTMENT

